

Tilladelsesindehaver:

CIECH Sarzyna akcieselskab; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Tlf.: +48 17 24 07 111;
Fax: +48 17 24 07 122; E-mail: sarzyna@ciechgroup.com

CHWASTOX-KOMPLEX 260 EW

Dette produkt er beregnet til brug for professionelle brugere.

Aktiv ingrediensindhold: MCPA (et stof fra
phenoxycarboxylsyregruppen) – 200 g/l (18,23%)
Clopyralid (et stof fra gruppen af pyridincarboxylsyrederivater) - 20 g/l (1,82%)
Fluroxypyr (et stof fra gruppen af pyridincarboxylsyrederivater) - 40 g/l (3,65%).

Godkendelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R-35/2017 af

15.03.2017, senest ændret ved Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters afgørelse nr. R-558/2018d af 10.10.2018.



Opmærksomhed

H315 - Forårsager hudirritation.

H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH 401 - Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305 + P351 + P338 – VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylningen.

P332 + P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P337 + P313 - Hvis øjenirritation fortsætter: Søg lægehjælp.

P391 - Opsaml spildt materiale.

BESKRIVELSE AF ARBEJDSMETODE

Chwastox Complex 260 EW er et flydende herbicid til fremstilling af en vandig emulsion (olie-i-vand-emulsion) til bladpåføring, beregnet til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vinterhvede samt på græsplæner, sportsbaner og golfbaner.

Ifølge HRAC-klassificeringen er de aktive ingredienser klassificeret i gruppe O. Produktet er beregnet til brug med selvkørende eller traktormonterede marksprøjter og håndsprøjter (herunder rygsprøjter).

Foranstaltninger mod ukrudt

Chwastox Complex 260 EW er et selektivt, systemisk herbicid. Det absorberes gennem bladene og transporteres til rødderne, hvor det forårsager deformation, væksthæmning og i sidste ende ukrudtets død. De første symptomer viser sig hos modtagelige ukrudtsplanter 1-2 dage efter påføring. Ukrudtsvæksten hæmmes, og ukrudtet dør efter cirka 3-4 uger. Produktet er mest effektivt til at bekæmpe ukrudt i dets tidlige udviklingsstadier.

Vejrforhold, der fremmer plantevækst, forstærker produktets herbicide effekt.

Dosering 2,0 – 3,0 l/ha

Følsomme ukrudtsorter: Almindelig fuglegræs, purpur-dødnælde, duftløs kamille, engvalmue, marktidse, Ager-ærenpris, kløverblad, agersnerle, agerkamille, almindelig kamille, hyrdetaske.

Moderat følsomt ukrudt: Agerstedmoderblomst.

Dosering 2,5 l

Følsomme ukrudtsplanter: Ribwort-vejbred, Almindelig fuglegræs, Storblomstret fuglegræs, Markranunkel, Engranunkel, Høgeurt, Hvidkløver, Lillekløver, Rødkløver, Marktidse, Grøn kattehale, Ruhovedet storkenæb, Canadisk emmer, Kløverbladet fuglegræs, Markpadderokke, Krøllet siv, Marksyre, Bredbladet siv, Almindelig siv, Hyrdetaske, Smalbladet vikke.

Moderat følsomt ukrudt: ribwort-plantain, bynke, rød døde nælde, mælkebøtte medicinsk.

Resistente ukrudtsorter: jordvedbend, almindelig røllike, brændenælde, agersnerle Mark-ærenpris, persisk ærenpris, germader-ærenpris.

Dosering 3,5 l

ha: Følsomme ukrudtsorter: Ribwort-vejbred, Vejbred, Bynke, Fugleurt, Almindelig Fugleurt, Markranunkel, Eng-ranunkel, purpur-dødnælde, lodden høgeurt, hvidkløver, småhovedet kløver, rødkløver, mælkebøtte, marktidse, almindelig siv, brændenælde, grovbladet storkenæb, ager-ærenpris, canadisk emmer, kløverblad, almindelig fuglegræs, agerpadderokke, krøllet siv, agersyre, bredbladet siv, almindelig syreskov, hyrdetaske, smalbladet vikke.

Moderat resistente ukrudtsorter: Almindelig røllike, persisk ærenpris.

Resistent ukrudt: jordvedbend, agersnerle, ærenpris.

EN MEDDELELSE:

Følsomme ukrudtstyper efter påføring af produktet i en dosis på 3,5 l/ha og 2 behandlinger i løbet af vækstperioden: jordvedbend, lille storkenæb og agersnerle.

KOMMISSÆRENS ANSØGNING

Vinterhvede

Påføringstidspunkt: Behandlingen bør udføres om foråret efter starten af vækstperioden, fra begyndelsen af skudfasen indtil 2. knude stadium (BBCH 21-32).

Maksimal dosis for en enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Anbefalet dosering til en enkelt anvendelse: 2,0 – 3,0 l/ha.

Anbefalet vandmængde: 200 - 300 l/ha.

Anbefalet spraymængde: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Græsplæner, sportsbaner, golfbaner

Anvendelsesperiode: Produktet bør anvendes fra forår til tidligt efterår under gunstige vejrforhold for plantevækst, når lufttemperaturen er over 10°C. Det kan anvendes enten på hele græsplænen eller kun på ukrudtsbefængte områder.

Maksimal dosis for en enkelt anvendelse: 3,5 l/ha.

Anbefalet dosering til en enkelt anvendelse: 2,5 – 3,5 l/ha.

Ved ukrudt i ældre udviklingsstadier og i tilfælde af kraftig ukrudtangreb, især ukrudt som: vejbred, lille storkenæb, bynke, purpur-dødnælde, brændenælde, ærenpris og hornurt, bør den højeste af de anbefalede doseringer af produktet anvendes.

I tilfælde af kraftig ukrudtsangreb kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.

Behandlingsinterval: mindst 56 dage.

Anbefalet vandmængde: 200 - 500 l/ha.

Anbefalet spraymængde: mellemstore dråber.

Instruktioner: 1. Slå ikke græsplænen i 3 dage før påføring af produktet (for at sikre, at det behandlede ukrudt er så stort som muligt) og i mindst 3 dage efter påføring af produktet (for at give produktet mulighed for at trænge ned til rødderne).

2. Græs, der er blevet slået tre gange i træk på en græsplæne, hvor der er blevet påført et komposteringsmiddel

Den må ikke bruges, hvis den har været brugt tidligere, eller hvis den er beregnet til at dække afgrøder, pryddplanter, buske eller træer.

3. Ved sprøjtning af græsplæner i nærheden af afgrøder, træer og buske skal man være forsigtig med at sikre, at sprayen ikke kommer i kontakt med afgrøder, trækroner og buske (især ikke-træagtige dele). Kontakt mellem sprayen og jorden i nærheden af buske og under trækroner bør minimeres. 4. Produktet må ikke anvendes på unge græsplæner.

eller dem med dårligt etablerede planter.

PLANTESUCCES: Den

Produktet nedbrydes i jorden i vækstsæsonen og udgør ingen risiko for efterfølgende afgrøder. Skulle en behandlet afgrøde blive ødelagt på grund af frost, sygdom eller skadedyr, kan alle afgrøder plantes efter passende forberedelse før såning.

FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER TIL BRUG I FORBINDELSE MED DOKUMENTERET PRAKSIS landbrug

1. Behandlede planter må ikke anvendes som dyrefoder.

2. Produktet må ikke anvendes:

– i perioder med tørke, – før forventet

kraftig nedbør, – på syge, beskadigede eller våde planter, – ved temperaturer under 10 °C og

over 25 °C, – før frost, – i vinde, der kan få

sprøjtemidlet til at drive over på tilstødende områder.

Nyttige planter.

3. Følgende bør undgås ved brug af produktet:

• Drift af arbejdsvæsken på tilstødende dyrkede arealer, især

Tokimbladede planter,

Overlappning af arbejdsvæsken ved samlingerne mellem behandlingsstriberne og forageren.

FORBEREDELSE AF DET BRUGBARE

VÆSKE Før du begynder at tilberede den brugbare væske, skal du bestemme den nøjagtige mængde, der er nødvendig.

For at undgå utilsigtet kontaminering med andre pesticider, vask sprøjten med en 10% opløsning af sodavand eller aktivt kul.

Hæld den afmålte mængde produkt i en sprøjtetank, der er delvist fyldt med vand (med omrøreren tændt). Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og tilsæt skyllevandet til sprøjtetanken med arbejdsvæsken. Fyld derefter med vand til den ønskede mængde. Efter at produktet er tilsat sprøjtetanken, blandes arbejdsvæsken mekanisk i tanken uden at bruge den hydrauliske omrører. Brug arbejdsvæsken umiddelbart efter tilberedningen. Hvis sprøjteprocessen afbrydes, blandes arbejdsvæsken grundigt i sprøjtetanken, før arbejdet genoptages.

Håndtering af brugbare væskerester og rengøring af udstyret

Restvæsker, der er tilbage efter behandling, skal behandles på en sådan måde, at risikoen for forurening af overfladevand og grundvand minimeres i overensstemmelse med vandlovgivningen og

Regler for jordforurening

minimeret, dvs.: – efter fortynding, hvis muligt, brug på den overflade, hvor behandlingen skal udføres
blev udført

eller – at bortskaffe dem ved hjælp af tekniske processer, der muliggør bionedbrydning af de aktive ingredienser i

Sørg for, at plantebeskyttelsesmidler bortskaffes korrekt, eller – bortskaf dem på anden
måde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Rengør udstyret grundigt efter brug, især hvis du har til hensigt at bruge sprøjten til andre planter end dem, der anbefales.

Vandet, der bruges til at rengøre udstyret, skal behandles på samme måde som resten af væsken; det samme personlige værnemiddel skal anvendes.

Betingelser for sikker brug af produktet

Før produktet tages i brug, skal alle interessenter, der kan blive udsat for sprøjtetågen, og som har anmodet om relevante oplysninger, informeres.

Forholdsregler for personer, der bruger produktet:

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Bær beskyttelseshandsker, øjen- eller ansigtsbeskyttelse og arbejdstøj under tilberedning af arbejdsvæsken.

Brug beskyttelseshandsker, en hat (med skygge), beskyttelsestøj til at beskytte mod pesticidernes virkninger og passende fodtøj under behandlingen.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå at forurene vandveje med pesticidet eller dets emballage.

Rengør ikke udstyr i nærheden af overfladevand.

Undgå forurening af vandveje fra dræningsgrøfter fra landbrugsdrift.
og gader.

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at etablere en 1 m bred beskyttelseszone omkring reservoirer og vandløb.
at identificere.

For at beskytte planter og leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at etablere en beskyttelseszone med følgende bredde:
for at angive bredden:

10 m fra ubrugt landbrugsjord eller

5 m væk fra ubrugt landbrugsjord, samtidig med at der anvendes teknikker, der reducerer afdriften af arbejdsvæsken under behandlingen med 50 %.

Perioden fra påføring af produktet til den dag, hvor mennesker og dyr har tilladelse til at betræde det område, hvor produktet blev påført (forebyggelsesperiode): Betræde ikke området, før væsken på planteoverfladen er helt tørret.

Ventetid fra sidste påføring af produktet til høstdagen (ventetid): Ikke relevant.

Ventetiden fra sidste anvendelse af produktet på foderplanter indtil den dag, hvor dyr må fodres med disse planter (tilbageholdelsestid for foder): Planter behandlet med produktet må ikke anvendes som foder.

Betingelser for opbevaring og sikker bortskaffelse af konserveringsmidlet PLANTER OG EMBALLAGE

Uden for rækkevidde

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares: – på steder eller i faciliteter, hvor der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte mod miljøforurening og adgang for tredjeparter, – i originalemballagen, således at kontakt med fødevarer, drikkevarer eller andre stoffer forhindres.

Mad

- i tæt lukkede beholdere, - ved en temperatur på -0-30°C.

Det er forbudt at bruge tomme emballager fra pesticider til andre formål.

Ubrugte produkter skal afleveres til et anlæg, der er godkendt til indsamling af farligt affald.

Returner den tomme emballage, der indeholder farlige pesticider, til sælgeren.

FØRSTEHJÆLP

Modgift: ingen, behandling er symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Ved hudkontakt: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre.

Fortsæt skylning. Ring omgående til en giftinformationscentral/læge. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. konsultere.

Gyldighedsperiode – 3 år

Produktionsdato -

Nettoindhold -

Batchnummer -