

Allegato n. 1 alla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 558/2018d del
10.10.2018 che modifica l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R -35/2017 del 15.03.2017.

Titolare del permesso:

**Società per azioni CIECH Sarzyna; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Tel.: +48 17 24 07
111; Fax: +48 17 24 07 122; E-mail: sarzyna@ciechgroup.com**

CHWASTOX-KOMPLEX 260 EW

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali.

**Contenuto di principio attivo: MCPA (una
sostanza del gruppo degli acidi fenossicarbossilici) – 200 g/l (18,23%)
Clopiralide (una sostanza del gruppo dei derivati dell'acido piridinico carbossilico) - 20 g/l (1,82%)
Fluroxipir (una sostanza del gruppo dei derivati dell'acido piridinico carbossilico) - 40 g/l (3,65%).**

Approvazione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R-35/2017 del
15.03.2017, modificato da ultimo dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-558/2018d del 10.10.2018.



Attenzione

H315 - Provoca irritazione cutanea.
H319 – Provoca grave irritazione oculare.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

P280 - Indossare guanti/protezione per gli occhi/protezione per il viso.
P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti.
Togliere le lenti a contatto se presenti e facili da togliere. Continuare a sciacquare.
P332 + P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

DESCRIZIONE DEL METODO DI LAVORO

Chwastox Complex 260 EW è un erbicida liquido per la preparazione di un'emulsione acquosa (emulsione olio in acqua) per applicazione fogliare, destinato al controllo delle infestanti a foglia larga nel grano invernale nonché nei prati, nei campi sportivi e nei campi da golf.

Secondo la classificazione HRAC, i principi attivi sono classificati nel gruppo O. Il prodotto è destinato all'uso con irroratrici semoventi o montate su trattore e con irroratrici manuali (incluse le irroratrici a zaino).

Misure contro le erbacce

Chwastox Complex 260 EW è un erbicida selettivo e sistemico. Viene assorbito attraverso le foglie e trasportato alle radici, dove causa deformazione, inibizione della crescita e, infine, la morte delle infestanti. I sintomi iniziali compaiono nelle infestanti sensibili 1-2 giorni dopo l'applicazione. La crescita delle infestanti viene inibita e le infestanti muoiono dopo circa 3-4 settimane. Il prodotto è particolarmente efficace nel controllo delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo.

Le condizioni meteorologiche che favoriscono la crescita delle piante potenziano l'effetto erbicida del prodotto.

Dosaggio 2,0 – 3,0 l/ha

Erbacce sensibili: erba stella comune, ortica morta viola, camomilla inodore, papavero dei prati, cardo dei campi, Veronica dei campi, erba cipollina, convolvolo dei campi, camomilla dei campi, camomilla comune, borsa del pastore.

Erbacce moderatamente sensibili: Viola del pensiero.

Dosaggio 2,5 l/ha

Erbacce sensibili: Piantaggine, Centocchio comune, Centocchio a grandi fiori, Ranuncolo dei campi, Ranuncolo dei prati, Pilosella villosa, Trifoglio bianco, Trifoglio minore, Trifoglio rosso, Cardo dei campi, Tifa verde, Geranio rugoso, Farro canadese, Mannaie, Centocchio comune, Equiseto dei campi, Romice arricciata, Acetosella dei campi, Romice a foglie larghe, Romice comune, Borsa del pastore, Veccia a foglie strette.

Erbacce moderatamente sensibili: piantaggine, artemisia, ortica rossa, tarassaco medico.

Erbacce resistenti: edera terrestre, achillea millefoglie, ortica comune, convolvolo dei campi
Veronica dei campi, veronica persiana, veronica del germano reale.

Dosaggio 3,5 l/ha

ha: Erbacce sensibili: Piantaggine lanceolata, Piantaggine, Artemisia, Stellaria media, Stellaria comune, Ranuncolo dei campi, Ranuncolo dei prati, ortica viola, pilosella villosa, trifoglio bianco, trifoglio a piccole teste, trifoglio rosso, tarassaco, cardo dei campi, canna comune, ortica, geranio ruvido, veronica dei campi, farro canadese, ganja, erba stella comune, equiseto dei campi, romice riccio, acetosella dei campi, romice a foglie larghe, acetosella comune, borsa del pastore, veccia a foglie strette.

Erbacce moderatamente resistenti: Achillea millefoglie, Veronica persiana.

Erbacce resistenti: edera terrestre, convolvolo dei campi, veronica del camedrio.

AVVISO:

Infestanti sensibili dopo l'applicazione del prodotto alla dose di 3,5 l/ha e 2 trattamenti durante il periodo vegetativo: edera terrestre, geranio e convolvolo dei campi.

DOMANDA DEL COMMISSARIO

grano invernale

Epoca di applicazione: Il trattamento va effettuato in primavera dopo l'inizio del periodo vegetativo, dall'inizio della fase di accestimento fino allo stadio del 2° nodo (BBCH 21-32).

Dose massima per singola applicazione: 3,0 l/ha.

Dosaggio consigliato per singola applicazione: 2,0 – 3,0 l/ha.

Volume d'acqua consigliato: 200 - 300 l/ha.

Quantità di spruzzo consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Prati, campi sportivi, campi da golf

Periodo di applicazione: Il prodotto deve essere applicato dalla primavera all'inizio dell'autunno in condizioni meteorologiche favorevoli alla crescita delle piante, quando la temperatura dell'aria è superiore a 10 °C. Può essere applicato su tutto il prato o solo sulle aree infestate da erbe infestanti.

Dose massima per singola applicazione: 3,5 l/ha.

Dosaggio consigliato per singola applicazione: 2,5 – 3,5 l/ha.

Per le erbacce in stadi di sviluppo più vecchi e in caso di forte infestazione, in particolare per erbacce come: piantaggine, geranio, artemisia, ortica morta viola, ortica, veronica e ceratofillo, si deve usare il dosaggio di prodotto più elevato tra quelli raccomandati.

In caso di grave infestazione da erbe infestanti, potrebbe essere necessario ripetere il trattamento.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo di trattamento: almeno 56 giorni.

Volume d'acqua consigliato: 200 - 500 l/ha.

Quantità di spruzzo consigliata: gocce medie.

Istruzioni: 1. Non tagliare il prato per 3 giorni prima dell'applicazione del prodotto (per garantire che le erbacce da trattare siano le più grandi possibile) e per almeno 3 giorni dopo l'applicazione del prodotto (per consentire al prodotto di penetrare fino alle radici).

2. Erba tagliata tre volte di seguito su un prato su cui è stato applicato un agente compostante

Non può essere utilizzato se è stato precedentemente utilizzato o è destinato alla pacciamatura di colture, piante ornamentali, arbusti o alberi.

3. Quando si spruzza il prodotto su prati in prossimità di colture, alberi e arbusti, è necessario prestare attenzione a non far entrare il prodotto a contatto con colture, chiome degli alberi e arbusti (in particolare le parti non legnose). Il contatto del prodotto con il terreno in prossimità di arbusti e sotto le chiome degli alberi deve essere ridotto al minimo. 4. Il prodotto non deve essere utilizzato su prati giovani.

o quelli con piante poco sviluppate.

SUCCESSO DELL'IMPIANTO: II

Il prodotto si decompone nel terreno durante la stagione di crescita e non rappresenta un rischio per le colture successive. Qualora una coltura trattata dovesse essere distrutta a causa di gelate, malattie o parassiti, tutte le colture possono essere trapiantate dopo un'adeguata preparazione prima della semina.

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER L'USO IN CONNESSIONE CON LA PRATICA PROVATA agricoltura

1. Le piante trattate non devono essere utilizzate come mangime per animali.

2. Il prodotto non deve essere utilizzato:

– durante i periodi di siccità, – prima

delle previste forti piogge, – su piante malate, danneggiate o bagnate, – a temperature inferiori

a 10 °C e superiori a 25 °C, – prima dell'avvicinarsi

del gelo, – con venti che potrebbero far sì che lo spray si disperda nelle

aree vicine.

Piante utili.

3. Quando si utilizza il prodotto, si deve evitare quanto segue:

• Deriva del fluido di lavoro sulle aree coltivate adiacenti, in particolare

Piante dicotiledoni,

Sovrapposizione **del fluido di lavoro nei punti di giunzione delle fasce di trattamento e delle capezzagne.**

PREPARAZIONE DEL MATERIALE UTILIZZABILE

LIQUIDO Prima di iniziare a preparare il liquido utilizzabile, determinare la quantità esatta necessaria.

Per evitare contaminazioni accidentali con altri pesticidi, lavare l'irroratore con una soluzione al 10% di soda o carbone attivo.

Versare la quantità misurata di prodotto in un serbatoio di irrorazione parzialmente riempito d'acqua (con l'agitatore acceso).

Sciacquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e aggiungere l'acqua di risciacquo al serbatoio di irrorazione contenente il fluido di lavoro. Quindi riempire con acqua fino al volume richiesto. Dopo aver aggiunto il prodotto al serbatoio di irrorazione, miscelare meccanicamente il fluido di lavoro nel serbatoio senza utilizzare l'agitatore idraulico. Utilizzare il fluido di lavoro immediatamente dopo la preparazione. In caso di interruzione del processo di irrorazione, miscelare accuratamente il fluido di lavoro nel serbatoio di irrorazione prima di riprendere il lavoro.

Gestione dei residui liquidi utilizzabili e pulizia dell'attrezzatura

I liquidi residui rimanenti dopo il trattamento devono essere trattati in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee in conformità con le normative sulla tutela delle acque e con le Normativa sulla contaminazione del suolo

minimizzato, vale a dire: – dopo la diluizione, se possibile, utilizzare sulla superficie dove deve essere effettuato il trattamento è stato effettuato

oppure – smaltirli utilizzando procedimenti tecnici che consentano la biodegradazione dei principi attivi del

Assicurarsi che i prodotti fitosanitari siano smaltiti correttamente oppure smaltirli in altro modo, nel rispetto delle normative sui rifiuti.

Dopo l'uso, pulire accuratamente l'attrezzatura, soprattutto se si intende utilizzare l'irroratore per piante diverse da quelle consigliate.

L'acqua utilizzata per la pulizia dell'attrezzatura deve essere trattata allo stesso modo del resto del liquido; devono essere utilizzati gli stessi dispositivi di protezione individuale.

Condizioni per l'uso sicuro del prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario informare tutti gli interessati che potrebbero essere esposti alla nebbia di spruzzo e che hanno richiesto informazioni pertinenti.

Precauzioni per le persone che utilizzano il prodotto:

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Durante la preparazione del fluido di lavoro, indossare guanti protettivi, protezioni per gli occhi o il viso e abiti da lavoro.

Durante il trattamento indossare guanti protettivi, un cappello (con tesa), indumenti protettivi per proteggersi dagli effetti dei pesticidi e calzature adatte.

Misure di protezione ambientale: evitare di contaminare i corsi d'acqua con il pesticida o il suo imballaggio. Non pulire le attrezzature in prossimità di acque superficiali. Evitare l'inquinamento dei corsi d'acqua causato dai fossi di drenaggio delle attività agricole e strade.

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario istituire una zona di protezione larga 1 m attorno ai bacini idrici e ai corsi d'acqua. per identificare.

Per proteggere le piante e gli artropodi non bersaglio, è necessario stabilire una zona di protezione con la seguente larghezza: per indicare la larghezza:

10 m da terreni agricoli inutilizzati o

5 m di distanza dai terreni agricoli inutilizzati, utilizzando contemporaneamente tecniche che riducono del 50% la deriva del fluido di lavoro durante il trattamento.

Periodo dall'applicazione del prodotto fino al giorno in cui è consentito a esseri umani e animali di accedere all'area in cui è stato applicato il prodotto (periodo di prevenzione): non accedere all'area finché il liquido sulla superficie della pianta non si è completamente asciugato.

Periodo di attesa dall'ultima applicazione del prodotto fino al giorno della raccolta (periodo di attesa): Non applicabile.

Periodo di attesa dall'ultima applicazione del prodotto alle piante foraggere fino al giorno in cui gli animali possono essere nutriti con queste piante (periodo di sospensione del mangime): le piante trattate con il prodotto non devono essere utilizzate come mangime.

Condizioni per la conservazione e lo smaltimento sicuro del conservante IMPIANTI E IMBALLAGGI

Fuori portata

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare: – in luoghi o strutture in cui siano state adottate misure idonee per la protezione dall'inquinamento ambientale e dall'accesso da parte di terzi, – nella confezione originale, in modo da evitare il contatto con alimenti, bevande o altre sostanze.

Cibo

- in contenitori ermeticamente chiusi, - a una temperatura di -0 -30°C.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei pesticidi per altri scopi.

I prodotti non utilizzati devono essere consegnati a un impianto autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Restituire al venditore gli imballaggi vuoti contenenti pesticidi pericolosi.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, il trattamento è sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le lenti a contatto se presenti e facili da togliere.

Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un centro antiveleni/un medico. In caso di irritazione cutanea: consultare un medico. consultare.

Periodo di validità: 3 anni

Data di produzione -

Contenuto netto -

Numero di lotto -