

Tillståndsinnehavare:

CIECH Sarzyna Joint-Stock Company; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111; Fax: +48 17 24 07 122; E-post: sarzyna@ciechgroup.com

CHWASTOX-KOMPLEX 260 EW

Denna produkt är avsedd för professionella användare.

Aktiv substansinnehåll: MCPA (ett ämne från fenoxikarboxylsyragruppen) – 200 g/l (18,23 %)

Klopyralid (ett ämne från gruppen pyridinkarboxylsyra-derivat) - 20 g/l (1,82 %)

Fluroxypyr (ett ämne från gruppen pyridinkarboxylsyra-derivat) - 40 g/l (3,65 %).

Godkännande av jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-35/2017 av

15.03.2017, senast ändrad genom beslut nr R-558/2018d av ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling av den 10.10.2018.



Uppmärksamhet

H315 - Orsakar hudirritation.

H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH 401 - För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ut kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

P332 + P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P337 + P313 - Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

P391 - Samla upp spillt material.

BESKRIVNING AV ARBETSMETOD

Chwastox Complex 260 EW är ett flytande herbicidmedel för framställning av en vattenhaltig emulsion (olja-i-vatten-emulsion) för bladbekämpning, avsett för bekämpning av bredbladiga ogräs i höstveten samt på gräsmattor, idrottsplatser och golfbanor.

Enligt HRAC-klassificeringen klassificeras de aktiva ingredienserna i grupp O. Produkten är avsedd att användas med självgående eller traktormonterade fältsprutor och handsprutor (inklusive ryggsprutor).

Åtgärder mot ogräs

Chwastox Complex 260 EW är en selektiv, systemisk herbicid. Den absorberas genom bladen och transporteras till rötterna, där den orsakar deformation, tillväxthämning och slutligen ogräsdöd. De första symtomen uppträder hos känsliga ogräs 1–2 dagar efter applicering. Ogrästillsväxten hämmas och ogräset dör efter cirka 3–4 veckor. Produkten är mest effektiv för att bekämpa ogräs i deras tidiga utvecklingsstadier.

Väderförhållanden som främjar växttillväxt förstärker produktens herbicidala effekt.

Dosering 2,0–3,0 l/ha

Känsliga ogräs: Vanlig vallmo, nässla, doftlös kamomill, ängsvallmo, åkertistel,
Åkersenapelsin, köttysa, åkervinda, åkerkamomill, vanlig kamomill, herdeväska.

Måttligt känsliga ogräs: Åkerpensé.

Dosering 2,5 l

Känsliga ogräs: Groblad, Vanlig våtmark, Storblommig våtmark, Åkersmörblomma, Ängsmörblomma, Hökört, Vitklöver, Dvärgklöver,
Rödklöver, Åkertistel, Grönkaveldun, Strävrana, Kanadensisk svärm, Klyver, Vanlig våtmark, Åkerfräken,
Lockigt svärm, Åkersvans, Åkersira, Vallsira, Vanlig svärm, Herdeväska, Smalbladig vicker.

Måttligt känsliga ogräs: näbbgroblad, gråbo, röd dödnässla, maskros
medicinsk.

Resistenta ogräs: murgröna, rölleka, nässla, åkervinda
Fältöring, persisk öring, germanderöring.

Dosering 3,5 l

ha: Känsliga ogräs: Ribwort-groblad, Groblad, Gråbo, Vallört, Vanlig Vallört, Åkersmörblomma,
Ängsmörblomma, purpurdödnässla, hårig hökört, vitklöver, småklöver, rödklöver, maskros, åkertistel,
vass, brännässla, näva, åkeröra, kanadensisk emmer, köttysa, vanlig fågel, åkerfräken, lockslända, åkersyra,
bredbladig slända, vanlig syra, herdeväska, smalbladig vicker.

Måttligt resistenta ogräs: Rölleka, persisk ärepris.

Resistenta ogräs: murgröna, åkervinda, vallmo.

ETT MEDDELANDE:

Känsliga ogräs efter applicering av produkten med en dosering på 3,5 l/ha och 2 behandlingar under vegetationsperioden: murgröna, näva och åkervinda.

KOMMISSIONÄRENS ANSÖKAN

Vintervete

Appliceringstid: Behandlingen bör utföras på våren efter att vegetationsperioden börjat, från början av rotbildningsfasen till det andra nodstadiet (BBCH 21-32).

Maximal dos för en engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Rekommenderad dosering för engångsbehandling: 2,0–3,0 l/ha.

Rekommenderad vattenmängd: 200–300 l/ha.

Rekommenderad spraymängd: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Gräsmattor, idrottsplatser, golfbanor

Appliceringsperiod: Produkten bör appliceras från vår till tidig höst under väderförhållanden som är gynnsamma för växttillväxt, när lufttemperaturen är över 10 °C. Den kan appliceras antingen på hela gräsmattan eller endast på ogräsangripna områden.

Maximal dos för en engångsbehandling: 3,5 l/ha.

Rekommenderad dosering för engångsbehandling: 2,5–3,5 l/ha.

För ogräs i äldre utvecklingsstadier och vid kraftig ogräsangrepp, särskilt för ogräs som: groblad, liten näva, gråbo, röd nässla, brännässla, ärenpris och hornört, bör den högsta av de rekommenderade doserna av produkten användas.

Vid kraftig ogräsangrepp kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Behandlingsintervall: minst 56 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 200–500 l/ha.

Rekommenderad spraymängd: medelstora droppar.

Instruktioner: 1. Klipp inte gräsmattan i 3 dagar innan du applicerar produkten (för att säkerställa att ogräset som behandlas är så stort som möjligt) och i minst 3 dagar efter applicering av produkten (för att låta produkten tränga ner till rötterna).

2. Gräs som har klippts tre gånger i rad på en gräsmatta där ett komposteringsmedel har applicerats
Den får inte användas om den har använts tidigare, eller är avsedd för att täcka grödor, prydnadsväxter, buskar eller träd.

3. Vid sprutning av gräsmattor nära grödor, träd och buskar måste man vara försiktig så att sprayen inte kommer i kontakt med grödor, trädkronor och buskar (särskilt icke-vedartade delar). Sprayens kontakt med jorden nära buskar och under trädkronor bör minimeras. 4. Produkten får inte användas på unga gräsmattor.

eller de med dåligt etablerade växter.

VÄXTFRAMGÅNG: Den

Produkten bryts ner i jorden under växtsäsongen och utgör ingen risk för efterföljande grödor. Om en behandlad gröda måste förstöras på grund av frost, sjukdom eller skadedjur, kan alla grödor planteras efter lämplig förberedelse före sådd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED BEVISAD PRAXIS lantbruk

1. Behandlade växter får inte användas som djurfoder.

2. Produkten får inte användas:

– under torka, – före förväntat

kraftigt regn, – på sjuka, skadade eller våta växter, – vid temperaturer under 10 °C

och över 25 °C, – före annalkande frost, – i

vindar som kan få sprayen att driva över till angränsande områden.

Användbara växter.

3. Följande bör undvikas vid användning av produkten:

• Drift av arbetsvätskan till angränsande odlade områden, i synnerhet

Tvåhjärtbladiga växter,

Överlappning av arbetsvätskan vid skarvarna mellan behandlingsremsorna och vändtegen.

FÖRBEREDELSE AV DET ANVÄNDBARA

VÄTSKA Innan du börjar tillreda den användbara vätskan, fastställ den exakta mängden som behövs.

För att undvika oavsiktlig kontaminering med andra bekämpningsmedel, tvätta sprutan med en 10% lösning av soda eller aktivt kol.

Håll den uppmätta mängden produkt i en spruttank som är delvis fylld med vatten (med omröraren påslagen). Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och tillsätt sköljvattnet till spruttanken som innehåller arbetsvätskan. Fyll sedan på med vatten till önskad volym. Efter att produkten har tillsatts i spruttanken, blanda arbetsvätskan mekaniskt i tanken utan att använda den hydrauliska omröraren. Använd arbetsvätskan omedelbart efter beredning. Om sprutprocessen avbryts, blanda arbetsvätskan noggrant i spruttanken innan arbetet återupptas.

Hantering av användbara vätskerester och rengöring av utrustningen

De återstående vätskorna efter behandlingen måste behandlas på ett sådant sätt att risken för förorening av yt- och grundvatten minimeras i enlighet med vattenlagens föreskrifter och

Regler om markförorening

minimeras, d.v.s.: – efter utspädning, om möjligt, använd på ytan där behandlingen ska utföras

genomfördes

eller – att göra sig av med dem med hjälp av tekniska processer som möjliggör biologisk nedbrytning av de aktiva ingredienserna i

Säkerställ att växtskyddsmedel kasseras på rätt sätt, eller – kassera dem på annat sätt i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Rengör utrustningen noggrant efter användning, särskilt om du tänker använda sprutan för andra växter än de som rekommenderas.

Vattnet som används för att rengöra utrustningen måste behandlas på samma sätt som resten av vätskan; samma personliga skyddsutrustning måste användas.

Villkor för säker användning av produkten

Innan produkten används bör alla intressenter som kan komma att exponeras för sprutdimman och som har begärt relevant information informeras.

Försiktighetsåtgärder för personer som använder produkten:

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Använd skyddshandskar, ögon- eller ansiktsskydd och arbetskläder vid tillredning av arbetsvätskan.

Använd skyddshandskar, hatt (med brätte), skyddskläder för att skydda mot bekämpningsmedels effekter och lämpliga skor under behandlingen.

Miljöskyddsåtgärder: Undvik att förorena vattendrag med bekämpningsmedlet eller dess förpackning.

Rengör inte utrustning nära ytvatten.

Undvik förorening av vattenvägar från dräneringsdiken från jordbruksverksamhet och gator.

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att upprätta en 1 m bred skyddszon runt reservoarerna och vattendrag, att identifiera.

För att skydda växter och leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att upprätta en skyddszon med följande bredd: för att ange bredd:

10 m från oanvänd jordbruksmark eller

5 m från oanvänd jordbruksmark, samtidigt som tekniker används som minskar driften av arbetsvätskan under behandlingen med 50 %.

Perioden från applicering av produkten till den dag då människor och djur får vistas i området där produkten applicerades (förebyggande period): Beträd inte området förrän vätskan på växtytan har torkat helt.

Väntetid från sista appliceringen av produkten till skördedagen (väntetid): Ej tillämpligt.

Väntetiden från den sista appliceringen av produkten på foderväxter till den dag då djur får utfodras med dessa växter (karenstid för foder): Växter som behandlats med produkten får inte användas som foder.

Förhållanden för förvaring och säkert avfallshantering av konserveringsmedlet VÄXTER OCH FÖRPACKNINGAR

Utom räckhåll

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara: – på platser eller i anläggningar där lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda mot miljöföroreningar och åtkomst av tredje part, – i originalförpackningen, så att kontakt med livsmedel, drycker eller andra ämnen förhindras.

Mat

- i tätt förslutna behållare, - vid en temperatur på
-0-30°C.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar från bekämpningsmedel för andra ändamål.

Oanvända produkter ska lämnas till en anläggning som är auktoriserad för insamling av farligt avfall.

Returnera den tomma förpackningen som innehåller farliga bekämpningsmedel till säljaren.

FÖRSTA HJÄLPEN

Motgift: inget, behandlingen är symptomatisk.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt skölja. Kontakta omedelbart Giftinformationscentralen/läkare. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
rådfråga.

Giltighetstid – 3 år

Produktionsdatum -

Nettoinnehåll -

Batchnummer -