

Tilladelsesindehaver:

CIECH Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tlf.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail:
sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX EXTRA 300 SL

Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere.

Indhold af aktivt stof:

MCPA (en forbindelse fra phenoxysyregruppen) - 300 g/l (26,5%)

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Landdistriktsudvikling nr. R-77/2010 af

08/10/2010, senest ændret ved Ministeriet for Landbrug og Landdistriktsudviklings afgørelse nr. R-481/2017d af 26/09/2017.



Opmærksomhed

H302 – Farlig ved indtagelse.

EUH 401 – Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

P264 – Vask hænderne grundigt efter brug.

P280 – Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301 + P312 – VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

P330 – Skyl munden.

BESKRIVELSE AF

FUNKTIONEN Chwastox Extra 300 SL er et herbicid i flydende form til fremstilling af en vandig opløsning, der påføres bladmæssigt, og som er beregnet til at bekæmpe etårige tokimbladede ukrudtsplanter i forårs- og vintersæd.

I æbledyrkning bekæmper Chwastox Extra 300 SL, brugt i en blanding med Agrosar 360 SL eller Glifoherb 360 SL, blandt andet generende flerårige ukrudtssorter som padderokke og kvikgræs.

INDSATS MOD UKRUDS

Midlet absorberes primært af ukrudtsblade, hvilket får dem til at deformeres, efterfulgt af hæmmet vækst og plantedød. Midlet er mest effektivt til at bekæmpe ukrudt i 2-6-bladsstadiet.

Følsomme ukrudtsorter: almindelig gåsefod, hvid gåsefod, mark-lærkespore, grof fasanfod, hundetos, almindelig hyrdetaske, markbundter.

Moderat følsomt ukrudt: kornblomst, markvalmue.

Mellem resistent ukrudt: almindelig fuglemigej, markforglemmigej, snerle, grov amarant.

Resistent ukrudt: agerstedmoderblomst, lilla nælde, agerkrage, duftløs kamille, persisk ærenpris, ager ærenpris, kløverblad, plettet pileurt, agerkamille, korngyvel.

Chwastox Extra 300 SL i en dosis på 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL i en dosis på 5,0 l/ha eller

Chwastox Extra 300 SL i en dosis på 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL i en dosis på 5,0 l/ha

Følsomme ukrudtsorter: lille geranium, stallgræs, fuglegræs, purpur-nælde, hvid gåsefod, mælkebøtte, kvikgræs, canadisk emmer, almindelig pileurt, gammelvækst, markpadderokke, almindelig hyrdetaske, enårig engrapgræs, kirtelpilurt.

ANVENDELSE AF AGENTET

Midlet er beregnet til brug med selvkørende eller traktormonterede marksprøjter eller frugtplantagesprøjter udstyret med en herbicidbom.

Vårhvede, vårbyg, vårtriticale, havre, vinterhvede, vinterbyg, vintertriticale, rug

Maksimal/anbefalet dosis til en enkelt anvendelse: 3,0 l/ha

Påføringsdato: Udfør behandlingen om foråret, fra begyndelsen af kornets skudfase til slutningen af denne fase.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1

Bemærk:

Tillad ikke landbrugsdyr, især malkekvæg, at komme ind i det behandlede område i 21 dage efter behandling.

Æbletræ

Maksimal/anbefalet dosis til en enkelt anvendelse: 1) Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL 5,0 l/ha eller 2) Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/

ha + Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha Brug midlet fra forår til efterår på grønt

ukrudt under dets intensive vækst.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1

Bemærkninger: 1. Fjern mekanisk alle rodskud fra frugttræer før sprøjtning.

2. Sprøjt sikkert, helst med sprøjter med afdækning eller net, så dråber af sprøjtevæsken ikke kommer på blade, skud og ikke-træagtig bark på træer på grund af risikoen for at beskadige planterne.

PLANTESUCCESSION

Hvis det er nødvendigt at fjerne plantagen behandlet med Chwastox Extra 300 SL (på grund af frostskaader, sygdomme eller skadedyr) efter dyrkning

Andre planter kan dyrkes før såning, undtagen arter, der er særligt følsomme over for dette stof, f.eks. tomater, rødbeder.

Når Chwastox Extra 300 SL bruges i en blanding med andre herbicider, skal du følge anbefalingerne for plantesuccesion for herbicider, der anvendes i kombination med Chwastox Extra 300 SL.

FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER FOR BRUG I FORBINDELSE MED GOD LANDBRUGSPRAKSIS 1.

Produktet må ikke anvendes:

- i perioder med tørke, - på syge, beskadigede eller våde planter,
- ved temperaturer under 10°C og over 25°C, - når nattemperaturen er lavere end 5°C, - før frost og regn nærmer sig, - i blæsende vejr, hvilket kan få væsken til at drive over på naboplanter.

dyrket.

2. Undgå at bruge produktet: _____

- afdrift af arbejdsvæsken på tilstødende afgrødeplantager, især tokimbladede planter, • overlapning af arbejdsvæsken ved krydsninger mellem behandlingsstriber og forager, • indtrængning af midlet i det vand, der bruges til vanding af planterne.

TILBEREDNING AF BRUGSBARE VÆSKE Tilbered

den brugbare væske umiddelbart før brug.

Før du begynder at forberede arbejdsvæsken, skal du bestemme den nøjagtige mængde, der er nødvendig. Hæld den afmålte mængde væske i en delvist fyldt sprøjtetank med vand (med omrøreren tændt). Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og hæld skyllevæsken i sprøjtetanken med arbejdsvæsken. Efterfyld med vand til den ønskede mængde, og bland grundigt. Efter at væsken er hældt i sprøjtetanken, skal sprøjten, hvis den ikke er udstyret med en hydraulisk omrører, omrøres mekanisk. Hvis sprøjtningen afbrydes, skal arbejdsvæsken i sprøjtetanken omrøres grundigt, før arbejdet genoptages.

Når midlet anvendes i blandinger med andre midler, skal anbefalingerne for tilberedning af den brugbare væske af disse midler nøje følges.

HÅNDTERING AF RESTER AF BRUGBAR VÆSKE OG RENGØRING AF Udstyr Rester af brugbar væske efter behandlingen skal håndteres på en måde, der begrænser risikoen for forurening af overflade- og grundvand i henhold til vandlovgivningen og jordforurening, dvs.: – efter forudgående fortynding, anvendelse på den

overflade, hvorpå behandlingen blev udført, hvis der er det er muligt eller

- bortskaffes ved hjælp af tekniske løsninger, der sikrer biologisk nedbrydning af de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller – bortskaffes på anden måde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Vask udstyret grundigt efter arbejdet.

Behandl vandet, der bruges til at rengøre udstyret, på samme måde som den resterende væske, og brug det samme personlige værnemiddel.

Når udstyret vaskes med rengøringsmidler, der er beregnet til dette formål, skal de resulterende skylninger håndteres i overensstemmelse med den medfølgende anvisning til rengøringsmidlet.

Bemærk:

På grund af nogle afgrøders meget høje følsomhed over for selv små mængder af midlet, er det meget vigtigt at vaske sprøjten grundigt efter behandling, især før den bruges på andre afgrøder end dem, der anbefales på etiketten.

BETINGELSER FOR SIKKER BRUG AF PRODUKTET Før

produktet tages i brug, skal alle interesserede parter, der kan blive udsat for afdrift af arbejdsvæsken, og som har anmodet om sådanne oplysninger, informeres om dette.

Forholdsregler for personer, der bruger produktet:

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Undgå øjenkontaminering.

Ved kontakt med øjnene, skylles straks med rigeligt vand og søges lægehjælp.

Brug beskyttelseshandsker, ansigts- eller øjenbeskyttelse og beskyttelsestøj for at beskytte mod virkningerne af plantebeskyttelsesmidler under tilberedning af arbejdsopløsningen og under behandlingen.

Ved indtagelse, søg straks lægehjælp og vis emballagen eller etiketten.

Miljømæssige forholdsregler:

Forurens ikke vand med plantebeskyttelsesmidlet eller dets emballage.

Vask ikke udstyr i nærheden af overfladevand.

Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter fra landbrug og veje.

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb

med en bredde på: ≥ 10 m for vinterkorn - vinterbyg, vinterhvede, tritcale
vinter, rug,

≥ 1 m for vårkornafgrøder - vårhvede, vårbyg, vårtritcale, havre.

For at beskytte ikke-målede landplanter er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Når Chwastox Extra 300 SL anvendes i en tankblanding med andre herbicider, skal der tages hensyn til og overholdes de begrænsninger, der er angivet i etiketterne for de plantebeskyttelsesmidler, der er inkluderet i en sådan blanding.

Perioden fra påføring af midlet til den dag, hvor mennesker og dyr må betræde det område, hvor midlet blev påført (forebyggelsesperiode): mennesker - må ikke betræde området, før arbejdsvæsken på planteoverfladen er helt tørret, landbrugsdyr, især malkekvæg - må ikke betræde området i 21 dage efter behandlingen.

Periode fra sidste anvendelse af midlet til høstdagen (tilbageholdelsesperiode): ikke relevant

Perioden fra den sidste påføring af produktet på afgrøden indtil den dag, hvor den følgende afgrøde kan sås eller plantes: PLANTESUCCES skal tages i betragtning.

OPBEVARINGSBETINGELSER OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER OG EMBALLAGE Opbevares

utilgængeligt for

børn. Opbevar

plantebeskyttelsesmidler: ≥ 1 i

originalemballagen, ≥ 1 på en måde, der forhindrer kontakt med fødevarer, drikkevarer eller foder,

miljøforurening og adgang for tredjeparter, ≥ 1 ved en temperatur mellem 0°C og 30°C.

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle farligt affald.

Det anbefales at returnere tomme beholdere til en forhandler af plantebeskyttelsesmidler eller behandle dem som husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal bortskaffe beholderne, skal du kontakte din forhandler af plantebeskyttelsesmidler.

FØRSTEHJÆLP Modgift:

ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Ved indtagelse: Ring til en giftinformationscentral eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

Gyldighedsperiode - 3 år

Produktionsdato -

Netindhold -

Batchnummer -