

Titolare del permesso:

CIECH Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail:
sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX EXTRA 300 SL

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali.

Contenuto di sostanza attiva:

MCPA (un composto del gruppo degli acidi fenossi) - 300 g/l (26,5%)

Autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R-77/2010

dell'08/10/2010, modificata da ultimo dalla decisione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R-481/2017d del 26/09/2017.



Attenzione

H302 – Nocivo se ingerito.

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

P264 – Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P301 + P312 – IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P330 – Sциacquare la bocca.

DESCRIZIONE

DELL'OPERAZIONE Chwastox Extra 300 SL è un erbicida in forma liquida per la preparazione di una soluzione acquosa, applicata per via fogliare, destinata al controllo delle infestanti dicotiledoni annuali nei cereali primaverili e invernali.

Nella coltivazione delle mele, Chwastox Extra 300 SL, utilizzato in miscela con gli erbicidi Agrosar 360 SL o Glifoherb 360 SL, combatte, tra le altre, le erbacce perenni fastidiose come l'equiseto e la gramigna.

AZIONE SULLE ERBACCE

L'agente viene assorbito principalmente dalle foglie delle infestanti, causandone la deformazione, seguita da un arresto della crescita e dalla morte della pianta. L'agente è più efficace nella distruzione delle infestanti nello stadio di 2-6 foglie.

Erbacce sensibili: fumaria comune, piede d'oca bianco, speronella dei campi, piede di fagiano ruvido, piede di cane, borsa del pastore comune, fasci di campi.

Erbacce moderatamente sensibili: fiordaliso, papavero campestre.

Erbacce mediamente resistenti: erba stella comune, nontiscordardime dei campi, convolvolo, amaranto ruvido.

Erbacce resistenti: viola del pensiero, ortica viola, collo di corvo dei campi, biancospino inodore, veronica persiana, veronica dei campi, sanguinella, poligono del prato, camomilla dei campi, ginestra dei cereali.

Chwastox Extra 300 SL alla dose di 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL alla dose di 5,0 l/ha oppure

Chwastox Extra 300 SL alla dose di 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL alla dose di 5,0 l/ha

Erbacce sensibili: geranio piccolo, gramigna, stellaria, ortica viola, piede d'oca bianco, tarassaco, gramigna, farro canadese, poligono comune, erba secolare, equiseti dei campi, borsa del pastore, poa annua, epilobio ghiandolare.

RICHIESTA DELL'AGENTE

L'agente è destinato all'uso con irroratrici semoventi o montate su trattori o irroratrici per frutteti dotate di barra erbicida.

Frumento primaverile, orzo primaverile, triticale primaverile, avena, frumento invernale, orzo invernale, triticale invernale, segale

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 3,0 l/ha

Data di applicazione: effettuare il trattamento in primavera, dall'inizio della fase di accostamento del cereale fino alla fine di questa fase.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

Nota:

non consentire agli animali da fattoria, in particolare ai bovini da latte, di accedere all'area trattata per 21 giorni dopo il trattamento.

Melo

Dose massima/consigliata per una singola applicazione: 1) Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL 5,0 l/ha oppure 2) Chwastox

Extra 300 SL 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha Utilizzare il prodotto

dalla primavera all'autunno sulle infestanti verdi durante la loro crescita intensiva.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

Note: 1.

Prima di spruzzare, rimuovere meccanicamente tutti i polloni radicali dagli alberi da frutto.

2. Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchi o schermi, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa degli alberi, con il rischio di danneggiare le piante.

SUCCESSIONE DELLE PIANTE

Se è necessario eliminare la piantagione trattata con Chwastox Extra 300 SL (a causa di danni alle piante causati da gelo, malattie o parassiti) dopo la coltivazione

altre piante possono essere coltivate prima della semina, ad eccezione delle specie particolarmente sensibili a questo agente, ad esempio pomodori e barbabietole.

Quando si utilizza Chwastox Extra 300 SL in miscela con altri erbicidi, seguire le raccomandazioni sulla successione delle piante per gli erbicidi utilizzati in combinazione con Chwastox Extra 300 SL.

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI D'USO RELATIVE ALLA BUONA PRATICA AGRICOLA 1. Non utilizzare il prodotto:

- durante i periodi di siccità, - su piante malate, danneggiate o bagnate, - a temperature inferiori a 10°C e superiori a 25°C, - quando la temperatura notturna è inferiore a 5°C,
- prima dell'avvicinarsi di gelate e pioggia, - durante il tempo ventoso, che può far sì che il liquido si riversi sulle piante vicine.

2. Durante l'utilizzo del prodotto, non consentire:

- deriva del liquido di lavoro sulle piantagioni di colture vicine, in particolare dicotiledoni, • sovrapposizione del liquido di lavoro alle giunzioni delle fasce di trattamento e delle testate, • penetrazione dell'agente nell'acqua utilizzata per l'irrigazione delle piante.

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO UTILIZZABILE

Preparare il liquido utilizzabile immediatamente prima dell'uso.

Prima di iniziare a preparare il liquido di lavoro, determinare esattamente la quantità necessaria.

Versare la quantità misurata di agente in un serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito con acqua (con l'agitatore acceso). Sciacquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e versare il liquido di risciacquo nel serbatoio dell'irroratrice contenente il fluido di lavoro, rabboccare con acqua fino al volume richiesto e mescolare accuratamente. Dopo aver versato l'agente nel serbatoio dell'irroratrice, se l'irroratrice non è dotata di agitatore idraulico, agitare meccanicamente il fluido. In caso di interruzione dell'irrorazione, agitare accuratamente il fluido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

Quando si utilizza l'agente in miscele con altri agenti, seguire scrupolosamente le raccomandazioni per la preparazione del liquido utilizzabile di questi agenti.

GESTIONE DEI RESIDUI DEL LIQUIDO UTILIZZABILE E PULIZIA DELL'ATTREZZATURA I resti del liquido utilizzabile dopo il trattamento devono essere gestiti in modo da limitare il rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee ai sensi delle normative sulla legge sulle acque e di contaminazione del suolo,

vale a dire: – dopo la diluizione preventiva, utilizzare sulla superficie su cui è stato effettuato il trattamento, se presente è possibile o

– smaltiti utilizzando soluzioni tecniche che garantiscano la degradazione biologica delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, oppure – smaltiti in altro modo, nel rispetto delle normative sui rifiuti.

Lavare accuratamente l'attrezzatura dopo il lavoro.

Trattare l'acqua utilizzata per pulire l'attrezzatura allo stesso modo del liquido rimanente, utilizzando gli stessi dispositivi di protezione individuale.

Quando si lava l'attrezzatura utilizzando detergenti appositamente progettati, trattare i risciacqui risultanti secondo le istruzioni allegate al detergente.

Nota:

data l'elevata sensibilità di alcune colture anche a piccole quantità di agente, è molto importante lavare accuratamente l'irroratrice dopo il trattamento, soprattutto prima di utilizzarla su colture diverse da quelle raccomandate sull'etichetta.

CONDIZIONI PER L'USO SICURO DEL PRODOTTO Prima di

utilizzare il prodotto, tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva del liquido di lavoro e che hanno richiesto tali informazioni devono essere informate di questo fatto.

Precauzioni per le persone che utilizzano il prodotto:

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Evitare la contaminazione degli occhi.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Indossare guanti protettivi, protezioni per il viso e gli occhi e indumenti protettivi per proteggersi dagli effetti dei prodotti fitosanitari durante la preparazione della soluzione di lavoro e durante il trattamento.

In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione o l'etichetta.

Precauzioni ambientali:

Non contaminare l'acqua con il prodotto fitosanitario o con la sua confezione.

Non lavare l'attrezzatura vicino all'acqua di superficie.

Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i fossi di drenaggio delle aziende agricole e delle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario designare una zona di protezione dai bacini artificiali e dai corsi d'acqua con una

larghezza di: $\geq$ 10 m nel caso di colture di cereali invernali - orzo invernale, frumento invernale, triticale invernale, segale,

$\geq$ 1 m nel caso di colture di cereali primaverili: grano primaverile, orzo primaverile, triticale primaverile, avena.

Per proteggere le piante terrestri non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

Quando si utilizza Chwastox Extra 300 SL in una miscela in cisterna con altri erbicidi, è necessario tenere conto e rispettare le restrizioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari contenuti in tale miscela.

Periodo che va dall'applicazione dell'agente al giorno in cui persone e animali possono entrare nell'area in cui è stato applicato l'agente (periodo di prevenzione): persone: non entrare finché il liquido di lavoro sulla superficie della pianta non si è completamente asciugato, animali da fattoria, in particolare bovini da latte: non entrare per 21 giorni dopo il trattamento.

Periodo dall'ultima applicazione dell'agente al giorno della raccolta della coltura (periodo di sospensione): non applicabile

Periodo compreso tra l'ultima applicazione del prodotto sulla coltura e il giorno in cui è possibile seminare o piantare la coltura successiva:
si deve tenere conto del SUCCESSO DELLA PIANTA.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO SICURO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DELL'IMBALLAGGIO Tenere

fuori dalla portata dei

bambini. Conservare i prodotti

fitosanitari: γ nella confezione

originale, γ in modo da evitare il contatto con alimenti, bevande o mangimi, la contaminazione ambientale e l'accesso da parte di

terzi, γ a una temperatura compresa tra 0°C e 30°C.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Si consiglia di restituire i contenitori vuoti a un rivenditore di prodotti fitosanitari o di trattarli come rifiuti urbani. In caso di domande su come smaltire i contenitori, consultare il rivenditore di prodotti fitosanitari.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, trattare in modo sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

In caso di ingestione: contattare un centro antiveleni o un medico se non ci si sente bene.

Periodo di validità - 3 anni

Data di produzione -

Contenuto netto -

Numero di lotto -