

Tillståndshavare: CIECH

Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-post:

sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX EXTRA 300 SL

Produkten är avsedd för professionella användare.

Innehåll av aktiv substans:

MCPA (en förening från fenoxisyrgruppen) - 300 g/l (26,5 %)

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-77/2010 av den
08/10/2010, senast ändrat genom beslut från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-481/2017d av den 26/09/2017.



Uppmärksamhet

H302 – Skadligt vid förtäring.

EUH 401 – För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

P264 – Tvätta händerna noggrant efter användning.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P312 – VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du känner dig dålig.

P330 – Skölj munnen.

BRUKSANVISNING

Chwastox Extra 300 SL är ett herbicidmedel i flytande form för att framställa en vattenlösning, applicerad bladmässigt, avsedd för att bekämpa ettåriga tvåhjärtbladiga ogräs i vår- och vintersäd.

I äppelodling bekämpar Chwastox Extra 300 SL, som används i en blandning med herbiciderna Agrosar 360 SL eller Glifoherb 360 SL, bland annat besvärliga fleråriga ogräs som hästsvans och kvikgräs.

ÅTGÄRDER MOT OGRÄS

Medlet absorberas främst av ogräsblad, vilket orsakar deformation av dem, följt av hämmad tillväxt och plantdöd. Medlet är mest effektivt för att utrota ogräs i 2-6-bladsstadiet.

Känsliga ogräs: vanlig rökelse, vit gåsfot, åkerriddarsporre, fasanfot, hundfot, vanlig herdeväska, åkerknippen.

Måttligt känsliga ogräs: blåklint, åkervallmo.

Medelresistent ogräs: vanlig våtmark, åkerförgätmigej, åkervinda, grov amarant.

Resistent ogräs: åkerpensé, lila nässla, åkerkråka, doftlös baldersbjörn, persisk ärepris, åkerärepris, köttysa, fläckig knott, åkerkamomill, sådesvävskvast.

Chwastox Extra 300 SL i en dos av 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL i en dos av 5,0 l/ha eller

Chwastox Extra 300 SL i en dos av 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL i en dos av 5,0 l/ha

Känsliga ogräs: liten geranium, stallgräs, våtmark, nässla, vit gåsfot, maskros, kvikgräs, kanadensisk knott, gammalväxt, åkerfräken, vanlig herdeväska, ettårig ängsgröe, körtelört.

ANVÄNDNING AV MEDELET

Medlet är avsett att användas med självgående eller traktormonterade fältsprutor eller fruktträdgårdssprutor utrustade med herbicidbom.

Vårvete, vårkorn, vårrågvete, havre, vintervete, vinterkorn, vinterrågvete, råg

Maximal/rekommenderad dos för en engångsapplikation: 3,0 l/ha

Appliceringsdatum: utför behandlingen på våren, från början av spannmålsbildningsfasen till slutet av denna fas.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1

Obs: Låt

inte lantbruksdjur, särskilt mjölkkor, vistas i det behandlade området under 21 dagar efter behandlingen.

Äppelträd

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 1) Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL 5,0 l/ha eller 2) Chwastox Extra 300

SL 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha Använd medlet från vår till höst på gröna ogräs under deras intensiva tillväxt.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1

Anmärkningar: 1. Avlägsna mekaniskt alla rotskott från fruktträden före sprutning.

2. Spraya säkert, helst med sprutor med skydd eller nät, så att droppar av sprutvätskan inte hamnar på löv, skott och träd bark på grund av risken att skada växterna.

VÄXTSUCCESSION

Om det är nödvändigt att eliminera planteringen som behandlats med Chwastox Extra 300 SL (på grund av skador på växterna orsakade av frost, sjukdomar eller skadedjur) efter odling

Andra växter kan odlas före sådd, förutom arter som är särskilt känsliga för detta agens, t.ex. tomater, rödbetor.

När Chwastox Extra 300 SL används i blandning med andra herbicider, följ rekommendationerna för växtföljd för herbicider som används i kombination med Chwastox Extra 300 SL.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED GOD JORDBRUKSPRAKSIS 1.

Använd inte produkten:

- under torka, - på sjuka, skadade eller våta växter, - vid temperaturer under 10 °C och över 25 °C, - när nattetemperaturen är lägre än 5 °C, - före annalkande frost och regn, - vid blåst väder, vilket kan få vätskan att driva över på närliggande växter.

kultiverad.

2. Tillåt inte följande när du använder produkten:

- avdrift av arbetsvätskan till angränsande odlingar, särskilt tvåhjärtbladiga växter, • överlappning av arbetsvätskan vid korsningarna mellan behandlingsremsor och åkerfält, • inträngning av medlet i vattnet som används för att bevattna växterna.

FÖRBEREDELSE AV ANVÄNDBARA VÄTSKAN

Förbered den användbara vätskan omedelbart före användning.

Innan du börjar förbereda arbetsvätskan, bestäm exakt hur mycket som behövs.

Håll den uppmätta mängden sprutmedel i en delvis fylld sprutbehållare med vatten (med omröraren påslagen). Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och håll sköljvätskan i sprutbehållaren med arbetsvätskan, fyll på med vatten till önskad volym och blanda noggrant. Efter att ha hållt sprutmedlet i sprutbehållaren, om sprutan inte är utrustad med hydraulisk omrörare, ska vätskan omröras mekaniskt. Om sprutningen avbryts, ska arbetsvätskan i sprutbehållaren omröras noggrant innan arbetet återupptas.

Vid användning av medlet i blandningar med andra medel, följ noggrant rekommendationerna för beredning av den användbara vätskan av dessa medel.

HANTERING AV RESTER AV ANVÄNDBARA VÄTSKOR OCH RENGÖRING AV UTRUSTNINGEN

Rester av användbar vätska efter behandlingen bör hanteras på ett sätt som begränsar risken för förorening av yt- och grundvatten i enlighet med vattenlagens bestämmelser och markförorening, dvs.: – efter föregående utspädning,

användning på den yta där behandlingen utfördes, om det finns det är möjligt eller

- bortskaffas med hjälp av tekniska lösningar som säkerställer biologisk nedbrytning av de aktiva substanserna i växtskyddsmedel, eller – bortskaffas på annat sätt, i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Tvätta utrustningen noggrant efter arbetet.

Behandla vattnet som används för att rengöra utrustningen på samma sätt som den återstående vätskan, med samma personliga skyddsutrustning.

När du tvättar utrustningen med rengöringsmedel avsedda för detta ändamål, hantera de resulterande sköljningarna i enlighet med de instruktioner som medföljer rengöringsmedlet.

Obs: På

grund av vissa gröders mycket höga känslighet för även små mängder av medlet är det mycket viktigt att tvätta sprutan noggrant efter behandling, särskilt innan den används på andra grödor än de som rekommenderas på etiketten.

VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN Innan

produkten används måste alla berörda parter som kan komma att exponeras för driften av arbetsvätskan och som har begärt sådan information informeras om detta.

Försiktighetsåtgärder för personer som använder produkten:

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Undvik ögonkontaminering.

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.

Använd skyddshandskar, ansikts- eller ögonskydd och skyddskläder för att skydda mot effekterna av växtskyddsmedel vid beredning av arbetslösningen och under behandlingen.

Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare och visa förpackningen eller etiketten.

Miljöskyddsåtgärder:

Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess förpackning.

Tvätta inte utrustning nära ytvatten.

Undvik vattenföroreningar genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en skyddszon mot vattendrag och reservoarer med en bredd av: ≥ 10

m för vintersäd – vinterkorn, vintervete, rågvete

vinter, råg,

≥ 1 m för vårsädeslag – vårvete, vårkorn, vårrågvete, havre.

För att skydda landväxter som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid användning av Chwastox Extra 300 SL i tankblandning med andra herbicider måste de begränsningar som anges i etiketterna för de växtskyddsmedel som ingår i en sådan blandning beaktas och följas.

Perioden från applicering av medlet till den dag då människor och djur får beträda området där medlet applicerades (förebyggande period): människor - beträd inte området förrän arbetsvätskan på växtytan har torkat helt, lantbruksdjur, särskilt mjölkkor - beträd inte området under 21 dagar efter behandlingen.

Period från sista appliceringen av medlet till dagen för skörd av grödan (karenstid): ej tillämpligt

Period från den sista appliceringen av produkten på grödan till den dag då följande gröda kan sås eller planteras: VÄXTFRAMGÅNG
måste beaktas.

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV VÄXTSKYDDSMEDEL OCH FÖRPACKNING Förvaras utom

räckhåll för barn. Förvara

växtskyddsmedel: ≥ 1 i originalförpackningen,

≥ 1 på ett sätt som förhindrar kontakt

med livsmedel, drycker eller foder, miljökontaminering och åtkomst för tredje part, ≥ 1 vid en temperatur mellan 0 °C och 30 °C.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar av växtskyddsmedel för andra ändamål.

All oanvänd produkt ska överföras till en enhet som är auktoriserad för insamling av farligt avfall.

Det rekommenderas att du returnerar tomma behållare till en återförsäljare av växtskyddsmedel eller hanterar dem som kommunalt avfall. Om du har några frågor om hur du ska göra dig av med behållarna, kontakta din återförsäljare av växtskyddsmedel.

FÖRSTA HJÄLPEN Motgift:

inget, behandla symptomatisk.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Vid förtäring: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare om du känner dig dålig.

Giltighetstid - 3 år

Produktionsdatum -

Nätinnehåll -

Batchnummer -