

Bilag nr. 1 til Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters afgørelse nr. R-274/2019d af 29. marts
2019 om ændring af Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters tilladelse nr. R-45/2016 af 29. februar 2016.

Tilladelsesindehaver:

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tlf.: +48 17 24
07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechagro.pl

CHWASTOX NY TRIO 390 SL

Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere.

Indhold af aktive stoffer:

MCPA i form af kaliumsalt (en forbindelse fra phenoxysyregruppen) - 200 g/l
(16,7%) mecoprop-P i form af kaliumsalt (en forbindelse fra phenoxysyregruppen) - 150
g/l (12,5%) dicamba i form af kaliumsalt (en forbindelse fra benzoesyrederivatgruppen) - 40 g/l (3,3%)

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R-45/2016 af

29/02/2016, senest ændret ved Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter's afgørelse nr. R-274/2019d af 29/03/2019



Opmærksomhed

H302 - Farlig ved indtagelse.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH401 - Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylningen.

P337+P313 - Hvis øjenirritation fortsætter: Søg lægehjælp.

VIRKNINGSBESKRIVELSE

Selektivt herbicid med systemisk virkning, der påføres bladmæssigt i væskeform til fremstilling af en vandig opløsning.

Ifølge HRAC-klassificeringen er de aktive stoffer MCPA, mecoprop-P og dicamba klassificeret i gruppe O.

INDSATS MOD UKRUDS

Midlet absorberes af ukrudtsblade, hvilket får dem til at deformeres, efterfulgt af hæmmet vækst og plantedød. Midlet bekæmper effektivt ukrudt i dets tidlige udviklingsstadier, fra kimplantestadiet til 9-blads- eller 9-hvirvelstadiet (BBCH 11-19). Vejrforhold, der er gunstige for plantevækst, forstærker midlets herbicide effekt.

Vinterhvede, vintertriticale, rug, vinterbyg (dosis 2,0 l/ha)

Følsomme ukrudtsorter: kornblomst, almindelig røget tang, agersennep, almindelig fugleurt, almindelig nåleurt, hvid gåsefod, markvalmue, duftløs kamille, agerforglemmigej, grof kaprifolie, kløverblad, snerle, agerkamille, almindelig kamille, raps, almindelig hyrdetaske, agerbundte.

Moderat følsomt ukrudt: lille storkenæb, stedmoderblomst, vedbend-ærenpris.

Vårbyg, vårhvede, havre, vårtriticale (dosis 1,5 l/ha)

Følsomme ukrudtsplanter: almindelig røggæs, agersennep, almindelig fuglegræs, purpur-nælde, hvid gåsefod, markvalmue, duftløs kamille, grof kaprifolie, kløverblad, snerle (Convolvulus), agerkamille, grof amarant, almindelig hyrdetaske, agerbundter, småblomstret galurt.

Moderat følsomt ukrudt: lille storkenæb, kornblomst, stedmoderblomst, markforglemmigej, raps.

Rekreative græsarealer (græsplæner, sportsbaner, golfbaner) (dosis 2,0 l/ha)

Følsomme ukrudt: krybende ranunkel, almindelig mælkebøtte, grøn tang, almindelig hornurt, almindelig syreform.

Moderat følsomt ukrudt: ribwort-plantain, almindelig plantain, almindelig røllike

Resistent ukrudt: lille storkenæb, hvidkløver, ærenpris for hvidkløver, markærenpris for hvidkløver.

Rekreative græsarealer (græsplæner, sportsbaner, golfbaner) (2,0 l/ha anvendt to gange)

Følsomme ukrudtsorter: Ribwort-vejbred, almindelig vejbred, lille storkenæb, krybende ranunkel, hvidkløver, almindelig røllike, almindelig mælkebøtte, grøn tang, agerpris, almindelig hornurt, almindelig syreform.

Resistent ukrudt: Germander Ærenpris.

ANVENDELSE AF MIDLET

Midlet er beregnet til brug med selvkørende eller traktormonterede marksprøjter eller håndsprøjter.

Vinterhvede, vintertriticale, rug, vinterbyg

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 2,0 l/ha.

Påføringsdato: Påfør produktet om foråret efter vegetationens start fra begyndelsen af kornskylningens skudfase til dens afslutning (BBCH 21-29).

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Anbefalet vandmængde: 200 - 300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Vårbyg, vårhvede, havre, vårtriticale. Maksimal/

anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 1,5 l/ha.

Anvendelsesperiode: Brug produktet fra begyndelsen af kornets skudfase til dens afslutning (BBCH 21-29).

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Anbefalet vandmængde: 200 - 300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber

Rekreative græsarealer (græsplæner, sportsbaner, golfbaner)

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 2,0 l/ha

Anvendelsesperiode: Påfør fra forår til tidligt efterår, på ukrudt fra fåbladsstadiet til blomstringsstadiet (BBCH 14-40), på hele græsplænen, sportsbanen, golfbanen eller blot på ukrudtsrige områder. I tilfælde af kraftig ukrudtsangreb kan en yderligere behandling være nødvendig.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 56 dage.

Anbefalet vandmængde: 500 l/

ha. Anbefalet sprøjtning: mellemstor dråbe.

Kommentarer:

1. Slå ikke græsplænen i mindst 7 dage før påføring af produktet og mindst 7 dage efter udfører proceduren.
2. I det år, hvor en græsplæne, sportsbane eller golfbane anlægges, kan ukrudtsrensning udføres, når græsset vil nå den fulde skudfase.
3. Når du sprøjter i nærheden af træer og buske, må du undgå, at sprøjtevæsken drypper af (især ned på blade og ikke-træagtig bark), da det kan beskadige dem.
4. Brug ikke behandlede planter til foder i udbringningsåret.

PLANTESUCCES Hvis det

er nødvendigt at fjerne den plantage, der er behandlet med midlet, på grund af frostskaader, sygdomme eller skadedyr, kan alle planter dyrkes efter dyrkning før såning.

FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER FOR BRUG I FORBINDELSE MED GOD LANDBRUGSPRAKSIS

1. Strategi for

resistenshåndtering For at minimere

risikoen for forekomst og udvikling af ukrudtsresistens over for herbicider er det i overensstemmelse med god landbrugspraksis nødvendigt at:

- nøje følge instruktionerne på plantebeskyttelsesmidlets etiket –
Brug produktet i den anbefalede dosis på det anbefalede tidspunkt for at sikre optimal ukrudtsbekæmpelse,
 - tilpasse valget af herbicid og beslutningen om at udføre behandlingen til det eksisterende (eller potentielle) ukrudtsangreb, under hensyntagen til den dominerende art og tærsklerne for skadelighed,
 - anvende en rotation af herbicider (aktive stoffer) med forskellige virkningsmekanismer, –
 - anvende en blanding af herbicider (aktive stoffer) med forskellige virkningsmekanismer, –
 - anvende herbicider i rotation og/eller blanding, der påvirker flere ukrudtslivsprocesser (med forskellige virkningsmekanismer),
 - brug kun et herbicid med en given virkningsmekanisme én gang i vækstsæsonen afgrødeplante,
 - tilpasse dyrkningsprocedurerne til de herskende forhold på marken, især typen og intensiteten ukrudt,
 - anvende forskellige ukrudtsbekæmpelsesmetoder, herunder sædskifte osv., –
 - anvende certificeret såsæd, – rene landbrugsmaskiner for at forhindre, at ukrudtsformeringsmateriale overføres til andre positioner,
 - informere tilladelsesindehaveren om utilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse, – for detaljerede oplysninger kontakt venligst rådgiveren, tilladelsesindehaveren
2. Brug ikke produktet: ÷ i perioder med tørke, ÷ på syge, beskadigede eller våde planter, ÷ ved temperaturer under 10°C og over 25°C, ÷ før frost og regn,

ÿ når vinden skaber mulighed for at drive sprøjtevæsken ned på naboplanter dyrket.

3. Ved brug af midlet må følgende undgås: - at

sprøjtevæsken drives ned på tilstødende plantager med dyrkede planter, især tokimbladede planter, - at sprøjtevæsken overlapper hinanden ved krydsninger mellem behandlingsfelter og forager, - at midlet kommer i vand (især vand, der bruges til vanding af planter).

FORBEREDELSE AF BRUGBAR VÆSKE OG SPRØJTEKNIK Før du forbereder den brugbare væske, skal du omhyggeligt bestemme den nødvendige mængde og mængden af middel. Følg sprøjteproducentens anvisninger ved påfyldning af sprøjten.

Hvis der ikke er nogen anvisning, tilsættes den afmålte mængde væske til en delvist fyldt sprøjtetank med vand (med omrøreren tændt). Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og hæld skyllevæsken i sprøjtetanken med arbejdsvæsken, og fyld op med vand til den ønskede mængde. Efter at væsken er hældt i sprøjtetanken uden hydraulisk omrører, blandes arbejdsvæsken mekanisk. Brug arbejdsvæsken umiddelbart efter tilberedningen. Hvis sprøjtningen afbrydes, blandes arbejdsvæsken grundigt i sprøjtetanken, før arbejdet genoptages.

HÅNDTERING AF RESTER AF BRUGBAR VÆSKE OG RENGØRING AF Udstyr Rester af den

brugbare væske bør: – om muligt anvendes efter fortynding på den overflade, hvorpå behandlingen er udført, eller – bortskaffes ved hjælp af tekniske løsninger, der sikrer biologisk nedbrydning af de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller – bortskaffes på anden måde i overensstemmelse med affaldsbestemmelserne.

Vask udstyret grundigt efter brug. Grundig rengøring af udstyret er især vigtig, før det bruges på andre planter end dem, der anbefales.

Behandl vandet, der bruges til at rengøre udstyret, på samme måde som den resterende væske, og brug det samme personlige værnemiddel.

BETINGELSER FOR SIKKER BRUG AF PRODUKTET Før produktet

tages i brug, skal alle interesserede parter, der kan blive udsat for afdrift af arbejdsvæsken, og som har anmodet om sådanne oplysninger, informeres om dette.

Forholdsregler for personer, der bruger produktet: Der

må ikke spises, drikkes eller ryges under brug af produktet.

Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj for at beskytte mod virkningerne af plantebeskyttelsesmidler under tilberedning af arbejdsopløsningen og under behandlingen.

Miljømæssige forholdsregler:

Forurens ikke vand med plantebeskyttelsesmidlet eller dets emballage. Vask ikke udstyr i nærheden af overfladevand. Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter fra landbrug og veje.

Legepladser og rekreative områder - Når ukrudtet blomstrer, slås græsset og sprøjtes efter 2 uger.

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 1 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte planter og leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone mod ikke-landbrugsområder.

Perioden fra midlets påføring til den dag, hvor mennesker og dyr må betræde det område, hvor midlet blev påført (forebyggelsesperiode): Gå ikke ind, før væsken er helt tørret på plantens overflade.

Periode fra sidste anvendelse af produktet til dagen for høst af afgrøden (tilbageholdelsesperiode): Ikke relevant.

Perioden fra den sidste påføring af produktet på afgrøden indtil den dag, hvor den følgende afgrøde kan sås eller plantes: PLANTESUCCES skal tages i betragtning.

OPBEVARINGSBETINGELSER OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER OG EMBALLAGE Opbevares

utilgængeligt for børn.

Opbevar plantebeskyttelsesmidler: ÷ på steder eller i faciliteter, hvor der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger mod miljøforurening og adgang fra tredjeparter,

÷ i originalemballagen, på en måde der forhindrer kontakt med fødevarer, drikkevarer eller foder,

÷ ved en temperatur på 0°C - 30°C.

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle farligt affald.

Det anbefales at returnere tomme beholdere til en forhandler af plantebeskyttelsesmidler eller behandle dem som husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal bortskaffe beholderne, skal du kontakte din forhandler af plantebeskyttelsesmidler.

FØRSTEHJÆLP Modgift:

ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylningen.

Hvis øjenirritation fortsætter: Søg lægehjælp.

Gyldighedsperiode - 3 år

Produktionsdato -

Netindhold -

Batchnummer -