

Allegato n. 1 alla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 274/2019d del 29 marzo
2019 che modifica l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 45/2016 del 29 febbraio 2016.

Titolare del permesso:

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17
24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechagro.pl

CHWASTOX NUOVO TRIO 390 SL

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali.

Contenuto di principi attivi:

MCPA sotto forma di sale di potassio (un composto del gruppo degli acidi fenossi) -
200 g/l (16,7%) mecoprop-P sotto forma di sale di potassio (un composto del gruppo degli
acidi fenossi) - 150 g/l (12,5%) dicamba sotto forma di sale di potassio (un composto del gruppo dei
derivati dell'acido benzoico) - 40 g/l (3,3%)

Autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R -45/2016 del

29/02/2016, modificata da ultimo dalla decisione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R - 274/2019d del 29/03/2019



Attenzione

H302 - Nocivo se ingerito.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

P280 - Indossare guanti/protezione per gli occhi/protezione per il viso.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

DESCRIZIONE

DELL'AZIONE Erbicida selettivo ad azione sistemica, applicato per via fogliare, sotto forma di liquido per preparare una soluzione acquosa.

Secondo la classificazione HRAC, i principi attivi MCPA, mecoprop-P e dicamba sono classificati nel gruppo O.

AZIONE SULLE ERBACCE

L'agente viene assorbito dalle foglie delle infestanti, causandone la deformazione, seguita da un arresto della crescita e dalla morte della pianta. L'agente controlla efficacemente le infestanti nelle loro prime fasi di sviluppo, dallo stadio di plantula allo stadio di 9 foglie o 9 verticilli (BBCH 11-19). Le condizioni meteorologiche favorevoli alla crescita delle piante potenziano l'effetto erbicida dell'agente.

Frumento invernale, tritcale invernale, segale, orzo invernale (dose 2,0 l/ha)

Erbacce sensibili: fiordaliso, fumaria comune, senape campestre, stellaria comune, ago comune, piede d'oca bianco, papavero campestre, biancospino inodore, nontiscordardime campestre, caprifoglio ruvido, sanguinella, convolvolo (convolvolo), camomilla campestre, camomilla comune, colza spontanea, borsa del pastore comune, fagottini campestri.

Erbacce moderatamente sensibili: geranio piccolo, viola del pensiero, veronica.

Orzo primaverile, frumento primaverile, avena, tritcale primaverile (dose 1,5 l/ha)

Erbacce sensibili: fumaria comune, senape campestre, erba stella comune, ortica rossa, piede d'oca bianco, papavero campestre, biancospino inodore, caprifoglio ruvido, sanguinella, convolvolo, camomilla campestre, amaranto ruvido, borsa del pastore comune, erba dei campi, gallinella a piccoli fiori.

Erbacce moderatamente sensibili: geranio piccolo, fiordaliso, viola del pensiero, nontiscordardimé, colza spontanea.

Aree verdi ricreative (prati, campi sportivi, campi da golf) (dose 2,0 l/ha)

Erbacce sensibili: ranuncolo strisciante, tarassaco comune, alga verde, ceratofillo comune, acetosella comune.

Erbacce moderatamente sensibili: piantaggine lanceolata, piantaggine comune, millefoglio comune

Erbacce resistenti: geranio, trifoglio bianco, veronica del camedrio, veronica dei campi.

Aree verdi ricreative (prati, campi sportivi, campi da golf) (2,0 l/ha applicati due volte)

Erbacce sensibili: piantaggine comune, piantaggine comune, geranio comune, ranuncolo strisciante, trifoglio bianco, millefoglio comune, tarassaco comune, alga verde, veronica comune, ceratofillo comune, acetosella comune.

Erbacce resistenti: Veronica del germano.

APPLICAZIONE DELL'AGENTE

L'agente è destinato all'uso con irroratrici semoventi o montate su trattore o con irroratrici manuali.

Frumento invernale, tritcale invernale, segale, orzo invernale

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 2,0 l/ha.

Data di applicazione: Applicare il prodotto in primavera dopo l'inizio della vegetazione dall'inizio della fase di accestimento dei cereali fino alla sua fine (BBCH 21-29).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200 - 300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Orzo primaverile, frumento primaverile, avena, tritcale

primaverile Dose massima/consigliata per singola applicazione: 1,5 l/ha.

Periodo di applicazione: Utilizzare il prodotto dall'inizio della fase di accestimento dei cereali fino alla sua fine (BBCH 21-29).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200 - 300 l/ha.

Spruzzatura consigliata: gocce medie

Aree verdi ricreative (prati, campi sportivi, campi da golf)

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 2,0 l/ha

Periodo di applicazione: applicare dalla primavera all'inizio dell'autunno, sulle infestanti dallo stadio di poche foglie alla fase di fioritura (BBCH 14-40), su tutto il prato, campo sportivo, campo da golf o solo sulle aree infestate. In caso di forte infestazione da infestanti, potrebbe essere necessaria una seconda applicazione.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 56 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500

l/ha Irrorazione consigliata: goccioline medie.

Commenti:

1. Non tagliare il prato per almeno 7 giorni prima dell'applicazione del prodotto e per almeno 7 giorni dopo. eseguire la procedura.
2. Nell'anno di realizzazione di un prato, di un campo da gioco o di un campo da golf, il diserbo può essere effettuato quando l'erba raggiungerà la fase di accostamento completo.
3. Quando si spruzza vicino ad alberi e arbusti, evitare che il liquido venga disperso (soprattutto sulle foglie e sulla corteccia non legnosa) per evitare di danneggiarli.
4. Non utilizzare le piante trattate come mangime nell'anno di applicazione.

SUCCESSO DELLE PIANTE Se

è necessario eliminare la piantagione trattata con l'agente a causa di danni alle piante causati da gelo, malattie o parassiti, tutte le piante possono essere coltivate dopo la coltivazione pre-semina.

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI D'USO RELATIVE ALLA BUONA PRATICA AGRICOLA 1. Strategia di gestione della resistenza Per ridurre al

minimo il rischio di insorgenza e sviluppo

di resistenza delle infestanti agli erbicidi, in conformità alla Buona Pratica Agricola, è necessario: – seguire scrupolosamente le istruzioni riportate

sull'etichetta del prodotto fitosanitario –

utilizzare il prodotto alla dose consigliata, al momento consigliato per garantire un controllo ottimale delle erbe infestanti,

– adattare la scelta dell'erbicida e la decisione di effettuare il trattamento all'infestazione di erbe infestanti esistente (o potenziale), tenendo conto delle specie dominanti e delle soglie di nocività,

– utilizzare una rotazione di erbicidi (sostanze attive) con diversi meccanismi d'azione, – utilizzare una miscela di erbicidi (sostanze attive) con diversi meccanismi d'azione, – utilizzare erbicidi in rotazione e/o miscela che influenzano diversi processi vitali delle erbe infestanti

(con diversi meccanismi d'azione),

– utilizzare un erbicida con un determinato meccanismo d'azione solo una volta durante la stagione di crescita pianta coltivata,

– adattare le procedure colturali alle condizioni prevalenti nel campo, in particolare al tipo e all'intensità erbacce,

– utilizzare vari metodi di controllo delle erbacce, tra cui la rotazione delle colture, ecc., – utilizzare sementi certificate, – pulire i macchinari agricoli

per evitare che il materiale di propagazione delle erbacce venga trasferito

altre posizioni, –

informare il titolare del permesso in merito a un controllo insoddisfacente delle erbacce, – per informazioni dettagliate contattare il consulente, titolare del permesso

2. Non utilizzare il prodotto: ÿ durante periodi di siccità, ÿ su piante malate, danneggiate

o bagnate, ÿ a

temperature inferiori a 10°C e superiori a 25°C, ÿ

prima dell'avvicinarsi del gelo e della pioggia,

• quando il vento crea la possibilità di far scorrere il liquido spruzzato sulle piante vicine coltivate.

3. Durante l'uso dell'agente, evitare che: - il

liquido di applicazione defluisca sulle piantagioni vicine di piante coltivate, in particolare piante dicotiledoni, - il liquido di applicazione si sovrapponga alle giunzioni delle strisce

di trattamento e delle capezzagne, - l'agente penetri nell'acqua (in particolare nell'acqua utilizzata per annaffiare le piante)

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO UTILIZZABILE E TECNICA DI SPRUZZATURA

Prima di preparare il liquido utilizzabile, determinare attentamente il volume richiesto e la quantità di agente.

Durante il riempimento dell'irroratrice, seguire le istruzioni del produttore dell'irroratrice.

In assenza di istruzioni, aggiungere la quantità misurata di agente in un serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito con acqua (con l'agitatore acceso). Sciacquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e versare il risciacquo nel serbatoio dell'irroratrice contenente il fluido di lavoro e rabboccare con acqua fino al volume richiesto. Dopo aver versato l'agente nel serbatoio dell'irroratrice senza agitatore idraulico, miscelare meccanicamente il fluido di lavoro. Utilizzare il fluido di lavoro immediatamente dopo la preparazione. In caso di interruzione dell'irrorazione, miscelare accuratamente il fluido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

GESTIONE DEI RESIDUI DEL LIQUIDO UTILIZZABILE E PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

I resti del liquido utilizzabile devono essere: – se possibile, utilizzati previa diluizione sulla superficie su cui è stato effettuato il trattamento, oppure – smaltiti utilizzando

soluzioni tecniche che garantiscano la degradazione biologica delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, oppure – smaltiti in altro modo, nel rispetto delle normative sui rifiuti.

Lavare accuratamente l'attrezzatura dopo l'uso. Una pulizia accurata dell'attrezzatura è particolarmente importante prima di utilizzarla su piante diverse da quelle raccomandate.

Trattare l'acqua utilizzata per la pulizia dell'attrezzatura nello stesso modo del liquido rimanente, utilizzando gli stessi dispositivi di protezione individuale.

CONDIZIONI PER L'USO SICURO DEL PRODOTTO

Prima di utilizzare il prodotto, tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva del liquido di lavoro e che hanno richiesto tali informazioni devono essere informate di questo fatto.

Precauzioni per le persone che utilizzano il

prodotto: non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Utilizzare guanti e indumenti protettivi per proteggersi dagli effetti dei prodotti fitosanitari durante la preparazione della soluzione di lavoro e durante il trattamento.

Precauzioni ambientali:

Non contaminare l'acqua con il prodotto fitosanitario o il suo imballaggio. Non lavare le attrezzature in prossimità di acque superficiali. Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i canali di scolo di aziende agricole e strade.

Campi da gioco e aree ricreative - Quando le erbacce sono in fiore, falciare e spruzzare dopo 2 settimane

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 1 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere le piante e gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

Periodo che va dall'applicazione dell'agente al giorno in cui persone e animali possono accedere all'area in cui è stato applicato l'agente (periodo di prevenzione): non entrare finché il liquido non si è completamente asciugato sulla superficie della pianta.

Periodo dall'ultima applicazione del prodotto al giorno della raccolta della coltura (tempo di sospensione): Non applicabile.

Periodo compreso tra l'ultima applicazione del prodotto sulla coltura e il giorno in cui è possibile seminare o piantare la coltura successiva: si deve tenere conto del SUCCESSO DELLA PIANTA.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO SICURO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DELL'IMBALLAGGIO Tenere

fuori dalla portata dei

bambini. Conservare i prodotti fitosanitari:

in luoghi o strutture in cui siano in atto misure di sicurezza appropriate contro la contaminazione ambientale e l'accesso da parte di terzi,

nella confezione originale, in modo da evitare il contatto con alimenti, bevande o foraggio,

a una temperatura compresa tra 0°C e 30°C.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Si consiglia di restituire i contenitori vuoti a un rivenditore di prodotti fitosanitari o di trattarli come rifiuti urbani. In caso di domande su come smaltire i contenitori, consultare il rivenditore di prodotti fitosanitari.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, trattare in modo sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

Periodo di validità - 3 anni

Data di produzione -

Contenuto netto -

Numero di lotto -