

Bijlage nr. 1 bij het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 274/2019d van 29 maart 2019 tot wijziging van de vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 45/2016 van 29 februari 2016.

Vergunninghouder: CIECH

Sarzyna Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechagro.pl

CHWASTOX NIEUWE TRIO 390 SL

Het product is bedoeld voor gebruik door professionele gebruikers.

Inhoud werkzame stoffen:

MCPA in de vorm van kaliumzout (een verbinding uit de fenoxyzuurgroep) - 200 g/l (16,7%)
mecoprop-P in de vorm van kaliumzout (een verbinding uit de fenoxyzuurgroep) - 150 g/l (12,5%) dicamba
in de vorm van kaliumzout (een verbinding uit de groep benzoëzuurderivaten) - 40 g/l (3,3%)

Vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R -45/2016

van 29/02/2016, laatst gewijzigd bij besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 274/2019d van 29/03/2019



Aandacht

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

P280 - Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337+P313 - Indien de oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen.

WERKINGSBESCHRIJVING

Selectief herbicide met systemische werking, dat via de bladeren wordt aangebracht in de vorm van een vloeistof om een waterige oplossing te bereiden.

Volgens de HRAC-classificatie zijn de werkzame stoffen MCPA, mecoprop-P en dicamba ingedeeld in groep O.

ACTIE TEGEN ONKRUID

Het middel wordt opgenomen door onkruidbladeren, waardoor deze misvormen, gevolgd door groeiachterstand en plantsterfte. Het middel bestrijdt onkruid effectief in de vroege ontwikkelingsstadia, van zaailing tot het stadium met negen bladeren of negen kransen (BBCH 11-19). Gunstige weersomstandigheden voor plantengroei versterken de herbicide werking van het middel.

Wintertarwe, wintertriticale, rogge, wintergerst (dosis 2,0 l/ha)

Gevoelige onkruiden: korenbloem, echte duivenkervel, akkerselderij, muurkruid, gewone naaldkruis, witte ganzenvoet, klapproos, kamille, vergeet-mij-nietje, ruwe kamperfoelie, kleeftkruis, winde (winde), akkerkamille, echte kamille, koolzaadopslag, herderstasje, akkerbossen.

Matig gevoelige onkruiden: kleine ooievaarsbek, akkerviooltje, klimopereprijs.

Zomergerst, zomertarwe, haver, zomertriticale (dosis 1,5 l/ha)

Gevoelige onkruiden: gewone duivenkervel, akkerstruik, muur, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, klapproos, geurloze kamille, ruwe kamperfoelie, kleeftkruis, winde (winde), akkerkamille, ruwe amarant, herderstasje, akkerbossen, kleinbloemige galkruis.

Matig gevoelige onkruiden: kleine ooievaarsbek, korenbloem, akkerviooltje, akkervergeet-mij-nietje, koolzaadopslag.

Recreatieve grasgebieden (gazons, sportvelden, golfbanen) (dosis 2,0 l/ha)

Gevoelige onkruiden: kruipboterbloem, paardenbloem, groene kelp, gewone hoornblad, veldzuring.

Matig gevoelige onkruiden: smalle weegbree, gewone weegbree, duizendblad

Bestendige onkruiden: kleine ooievaarsbek, witte klaver, gamanderereprijs, akkerereprijs.

Recreatieve grasgebieden (gazons, sportvelden, golfbanen) (2,0 l/ha tweemaal toegepast)

Gevoelige onkruiden: smalle weegbree, gewone weegbree, kleine ooievaarsbek, kruipboterbloem, witte klaver, duizendblad, paardenbloem, groene kelp, ereprijs, gewone hoornblad, veldzuring.

Bestendige onkruidsoort: Ereprijs.

TOEPASSING VAN HET

MIDDEL Het middel is bedoeld voor gebruik met zelfrijdende of op een tractor gemonteerde veldspuiten of handspuiten.

Wintertarwe, wintertriticale, rogge, wintergerst

Maximale/aanbevolen dosis voor eenmalige toepassing: 2,0 l/ha.

Toepassingsdatum: Breng het product in het voorjaar aan na de start van de vegetatie, vanaf het begin van de uitstoeingsfase van het graan tot het einde ervan (BBCH 21-29).

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200 - 300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Zomergerst, zomertarwe, haver, zomertriticale.

Maximale/aanbevolen dosis voor eenmalige toepassing: 1,5 l/ha.

Toepassingsperiode: Gebruik het product vanaf het begin van de uitstoeingsfase van het graan tot het einde ervan (BBCH 21-29).

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200 - 300 l/ha.

Aanbevolen spray: middelgrote druppels

Recreatieve grasgebieden (gazons, sportvelden, golfbanen)

Maximale/aanbevolen dosis voor een enkele toepassing: 2,0 l/ha

Toepassingsperiode: Toepassen van de lente tot de vroege herfst, op onkruid van het stadium met enkele bladeren tot het bloeistadium (BBCH 14-40), op het hele gazon, sportveld, golfbaan of alleen op onkruidrijke plekken. Bij een zware onkruidplaag kan een tweede toepassing nodig zijn.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 2.

Interval tussen de behandelingen: minimaal 56 dagen.

Aanbevolen hoeveelheid water:

500 l/ha **Aanbevolen bespuiting:** middelgrote druppel.

Opmerkingen:

1. Maai het gazon minimaal 7 dagen voor en minimaal 7 dagen erna niet de procedure uitvoeren.
2. In het jaar dat u een gazon, speelveld of golfbaan aanlegt, kunt u onkruid wieden wanneer het gras bereikt de volledige uitstoeingsfase.
3. Wanneer u in de buurt van bomen en struiken spuit, zorg er dan voor dat de spuitvloeistof niet verwaait (vooral niet op bladeren en niet-houtachtige schors), omdat deze anders beschadigd kunnen raken.
4. Gebruik behandelde planten niet als meststof in het jaar van toepassing.

PLANT SUCCES Als het nodig

is om de met het middel behandelde aanplant te verwijderen vanwege schade aan de planten door vorst, ziekten of plagen, kunnen alle planten na voorzaai opnieuw worden gekweekt.

VOORZORGSMATREGELEN EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK IN VERBAND MET GOEDE LANDBOUWPRAKTIJK

1. Strategie voor resistentiebeheer

Om het risico op het ontstaan en de

ontwikkeling van onkruidresistentie tegen herbiciden te minimaliseren, is het volgens de Goede Landbouwpraktijk noodzakelijk om: – de instructies op het

etiket van het gewasbeschermingsmiddel strikt op te volgen –

Gebruik het product in de aanbevolen dosering en op het aanbevolen tijdstip om een optimale onkruidbestrijding te garanderen,

– de keuze van het herbicide en de beslissing om de behandeling uit te voeren, afstemmen op de bestaande (of potentiële) onkruidplaag, rekening houdend met de dominante soorten en de schadelijkheidsdrempels,

– gebruik een rotatie van herbiciden (werkzame stoffen) met verschillende werkingsmechanismen, –

gebruik een mengsel van herbiciden (werkzame stoffen) met verschillende werkingsmechanismen, –

gebruik herbiciden in rotatie en/of mengsel die meerdere levensprocessen van onkruid beïnvloeden

(met verschillende werkingsmechanismen),

– gebruik een herbicide met een bepaald werkingsmechanisme slechts één keer tijdens het groeiseizoen

landbouwplant,

– de teeltprocedures aanpassen aan de omstandigheden ter plaatse, met name aan het type en de intensiteit onkruid,

– gebruik verschillende methoden voor onkruidbestrijding, waaronder vruchtwisseling, enz., –

gebruik gecertificeerd zaad, – maak landbouwmachines

schoon om te voorkomen dat onkruidvermeerderingsmateriaal wordt overgebracht naar

andere functies, –

informeer de vergunninghouder over onbevredigende onkruidbestrijding, – voor gedetailleerde

informatie kunt u contact opnemen met de adviseur, vergunninghouder

2. Gebruik het product niet: • tijdens periodes van droogte, • op zieke, beschadigde of natte

planten, • bij

temperaturen onder de 10°C en boven de 25°C, •

vóór de nadering van vorst en regen,

• wanneer de wind de mogelijkheid creëert dat de spuitvloeistof op naburige planten terechtkomt gecultiveerd.

3. Bij gebruik van het middel mag u niet toestaan dat:

- de toepassingsvloeistof op aangrenzende aanplantingen van cultuurplanten terechtkomt, met name tweezaadlobbige planten, - de toepassingsvloeistof overlapt op de kruisingen van behandelingsstroken en landtongen, - het middel in water terechtkomt (met name in water dat wordt gebruikt voor het besproeien van

GEBRUIKSVLOEISTOF VOORBEREIDEN EN SPRAYTECHNIEK Bepaal vóór het voorbereiden

van de bruikbare vloeistof zorgvuldig het benodigde volume en de hoeveelheid spuitmiddel. Volg bij het vullen van de spuit de instructies van de fabrikant van de spuit.

Voeg bij gebrek aan instructies de afgemeten hoeveelheid van het middel toe aan een gedeeltelijk met water gevulde spuittank (met ingeschakeld roerwerk). Spoel de lege verpakkingen driemaal met water en giet de spoeling in de spuittank met de werkvloeistof. Vul bij met water tot de gewenste hoeveelheid. Nadat u het middel in de spuittank hebt gegoten zonder hydraulisch roerwerk, mengt u de werkvloeistof mechanisch. Gebruik de werkvloeistof direct na de voorbereiding. Als het spuiten wordt onderbroken, mengt u de werkvloeistof in de spuittank grondig voordat u verdergaat met werken.

OMGAAN MET DE RESIDUEN VAN BRUIKBARE VLOEISTOF EN REINIGEN VAN DE APPARATUUR De resten van de bruikbare vloeistof

moeten: – indien mogelijk, na verdunning worden gebruikt op het oppervlak waarop de behandeling is uitgevoerd, of – worden afgevoerd met

behulp van technische oplossingen die de biologische afbraak van de werkzame stoffen van de gewasbeschermingsmiddelen garanderen, of – op een andere manier worden afgevoerd, overeenkomstig de afvalregelgeving.

Was de apparatuur grondig na gebruik. Grondige reiniging van de apparatuur is vooral belangrijk voordat u deze gebruikt voor andere planten dan de aanbevolen planten.

Behandel het water dat u gebruikt om de apparatuur te reinigen op dezelfde manier als de resterende vloeistof en gebruik daarbij dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen.

VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk aan de drift van de werkvloeistof kunnen worden blootgesteld en die dergelijke informatie hebben aangevraagd, hiervan op de hoogte worden gesteld.

Voorzorgsmaatregelen voor personen die het product

gebruiken: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van het product.

Gebruik beschermende handschoenen en beschermende kleding om uzelf te beschermen tegen de effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij het bereiden van de werkoplossing en tijdens de behandeling.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of de verpakking. Was apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Voorkom waterverontreiniging via afwateringssloten van landbouwbedrijven en wegen.

Speelvelden en recreatiegebieden - Wanneer het onkruid bloeit, maaien en na 2 weken bespuiten

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk om een beschermingszone van 1 m breed aan te wijzen rondom reservoirs en waterlopen.

Om planten en niet-doelsoorten te beschermen, is het noodzakelijk om een beschermingszone van 5 m breed af te bakenen vanaf niet-agrarische gebieden.

De periode vanaf het aanbrengen van het middel tot de dag waarop mensen en dieren het gebied mogen betreden waar het middel is aangebracht (preventieperiode): Betreed de ruimte pas wanneer de vloeistof volledig is opgedroogd op het plantenoppervlak.

Periode vanaf de laatste toepassing van het product tot de dag van de oogst van het gewas (wachttijd): Niet van toepassing.

Periode vanaf de laatste toepassing van het product op het gewas tot aan de dag waarop het volgende gewas gezaaid of geplant kan worden: PLANT SUCCES moet in aanmerking worden genomen.

BEWAAROMSTANDIGHEDEN EN VEILIGE VERWIJDERING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN VERPAKKING Buiten bereik

van kinderen bewaren.

Gewasbeschermingsmiddelen bewaren:

• op plaatsen of in faciliteiten waar passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
tegen milieuverontreiniging en toegang door derden,

- in de originele verpakking, op een manier die contact met voedsel, dranken of voer,

• bij een temperatuur van 0oC - 30oC.

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Ongebruikte producten moeten worden overgedragen aan een instantie die bevoegd is om gevaarlijk afval te verzamelen.

Het is raadzaam om lege verpakkingen in te leveren bij een leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of ze te behandelen als gemeentelijk afval. Raadpleeg uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen als u vragen heeft over het afvoeren van de verpakkingen.

EERSTE HULP Tegengif:

geen, symptomatisch behandelen.

Indien u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.

Indien de oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts/arts.

Geldigheidsduur - 3 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -