

Bilaga nr 1 till jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriets beslut nr R-274/2019d av den 29 mars
2019 om ändring av jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriets tillstånd nr R-45/2016 av den 29 februari 2016.

Tillståndshavare: CIECH

Sarzyna Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07

111, fax: +48 17 24 07 122, e-post: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechagro.pl

CHWASTOX NEW TRIO 390 SL

Produkten är avsedd för professionella användare

Innehåll av aktiva substanser:

MCPA i form av kaliumsalt (en förening från fenoxisyrgruppen) - 200 g/l (16,7 %)

mecoprop-P i form av kaliumsalt (en förening från fenoxisyrgruppen) - 150 g/l (12,5 %)

dicamba i form av kaliumsalt (en förening från bensoesyra-derivatgruppen) - 40 g/l (3,3 %)

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-45/2016 av den
29/02/2016, senast ändrat genom beslut från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-274/2019d av den 29/03/2019



Uppmärksamhet

H302 - Skadligt vid förtäring.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 - Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

P337+P313 - Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

VERKAN BESKRIVNING

Selektiv herbicid med systemisk verkan, appliceras bladmässigt, i vätskans form för att framställa en vattenlösning.

Enligt HRAC-klassificeringen klassificeras de aktiva substanserna MCPA, mecoprop-P och dicamba i grupp O.

ÅTGÄRDER MOT OGRÄS

Medlet absorberas av ogräsblad, vilket orsakar deformation, följt av hämmad tillväxt och plantdöd. Medlet bekämpar effektivt ogräs i deras tidiga utvecklingsstadier, från plantstadiet till 9-blads- eller 9-virvelstadiet (BBCH 11-19). Väderförhållanden som är gynnsamma för växttillväxt förstärker medlets herbicida effekt.

Vintervete, vinterrågvete, råg, vinterkorn (dos 2,0 l/ha)

Känsliga ogräs: blåklint, räsvamp, åkersenap, vanlig fågel, nålört, vit gåsfot, åkervallmo, doftlös baldersbrå, åkerförgätmigej, grov kaprifol, köttyxa, åkervinda, åkerkamomill, vanlig kamomill, raps, vanlig herdeväska, åkerknippen.

Måttligt känsliga ogräs: liten näva, åkerpensé, murgröna.

Vårkorn, vårvete, havre, vårrågvete (dos 1,5 l/ha)

Känsliga ogräs: vanlig rökelse, åkersenap, vanlig våtmark, purpurfärgad nässla, vit gåsfot, åkervallmo, baldersbrå, kaprifol, köttyxa, vinda, åkerkamomill, grov amarant, vanlig herdeväska, åkerknippen, gallört.

Måttligt känsliga ogräs: liten näva, blåklint, åkerpensé, åkerförgätmigej, raps.

Rekreationsgräsområden (gräsmatta, idrottsplatser, golfbanor) (dos 2,0 l/ha)

Känsliga ogräs: krypande smörblomma, maskros, gröntang, hornört, syrsyra.

Måttligt känsliga ogräs: näbbgroblad, vanlig groblad, vanlig rölleka

Resistenta ogräs: liten trana, vitklöver, äppelsurra, åkerörre.

Rekreationsgräsområden (gräsmatta, idrottsplatser, golfbanor) (2,0 l/ha applicerat två gånger)

Känsliga ogräs: näbbbanan, vanlig plantain, liten näva, krypande smörblomma, vitklöver, rölleka, maskros, gröntang, åkerört, hornört, syrsyra.

Resistenta ogräs: Germander speedwell.

MEDELSANVISNING

Medlet är avsett att användas med självgående eller traktormonterade fältsprutor eller handsprutor.

Vintervete, vintertriticale, råg, vinterkorn

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 2,0 l/ha.

Appliceringsdatum: Applicera produkten på våren efter vegetationens början från början av spannmålsrotbildningsfasen till dess slut (BBCH 21-29).

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Rekommenderad vattenmängd: 200–300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Vårkorn, vårvete, havre, vårrågvete Maximal/

rekommenderad dos för engångsanvändning: 1,5 l/ha.

Appliceringsperiod: Använd produkten från början av spannmålsodlingsfasen till dess slut (BBCH 21-29).

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Rekommenderad vattenmängd: 200–300 l/ha.

Rekommenderad sprayning: medelstora droppar

Rekreationsgräsområden (gräsmatta, idrottsplatser, golfbanor)

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 2,0 l/ha

Appliceringsperiod: Applicera från vår till tidig höst, på ogräs från fåbladsstadiet till blomningsstadiet (BBCH 14-40), på hela gräsmattan, idrottsplanen, golfbanan eller bara på ogräsrika områden. Vid kraftig ogräsangrepp kan en andra applicering vara nödvändig.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 56 dagar.

Rekommenderad vattenmängd:

500 l/ha Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Kommentarer:

1. Klipp inte gräsmattan i minst 7 dagar före applicering av produkten och i minst 7 dagar efteråt. utföra proceduren.
2. Under året då en gräsmatta, spelplan eller golfbana anläggs kan ogräsrensning utföras när gräset kommer att nå full rotbildningsfas.
3. Vid sprutning nära träd och buskar, se till att sprutvätskan inte rinner ner (särskilt inte på löv och bark som inte är vedartad) eftersom det kan skada dem.
4. Använd inte behandlade växter som foder under behandlingsåret.

VÄXTSUCCESS Om det är

nödvändigt att eliminera planteringen som behandlats med medlet på grund av skador på växterna av frost, sjukdomar eller skadedjur, kan alla växter odlas efter odling före sådd.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED GOD JORDBRUKSPRAKSIS 1.

Strategi för resistenshantering För att

minimera risken för uppkomst och utveckling av ogräsresistens mot herbicider är det, i enlighet med god jordbrukspraxis, nödvändigt att: –

noggrant följa instruktionerna på växtskyddsmedlets etikett –

använd produkten i rekommenderad dos, vid rekommenderad tidpunkt för att säkerställa optimal ogräsbekämpning,

– anpassa valet av herbicid och beslutet att utföra behandlingen till det befintliga (eller potentiella) ogräsangreppet, med hänsyn till den dominerande arten och tröskelvärdena för skadlighet,

– använda en rotation av herbicider (aktiva substanser) med olika verkningsmekanismer, – använda en blandning av herbicider (aktiva substanser) med olika verkningsmekanismer, – använda herbicider i rotation och/eller blandning som påverkar flera ogräslivsprocesser

(med olika verkningsmekanismer),

– använd en herbicid med en given verkningsmekanism endast en gång under växtsäsongen gröda,

– anpassa odlingsförfarandena till de förhållanden som råder på fältet, särskilt till typen och intensiteten ogräs,

– använda olika metoder för ogräsbekämpning, inklusive växtföljd etc., – använda certifierat utsäde, – rena jordbruksmaskiner för att förhindra att ogräsförökningsmaterial överförs till

andra positioner,

– informera tillståndshavaren om otillfredsställande ogräsbekämpning, – för detaljerad information vänligen kontakta rådgivaren, tillståndshavaren

2. Använd inte produkten: $\hat{y}$ under torka, $\hat{y}$ på sjuka, skadade eller våta växter, $\hat{y}$ vid

temperaturer under

10°C och över 25°C, $\hat{y}$ före frost och regn,

ÿ när vinden skapar möjlighet att sprutvätskan driver över närliggande växter kultiverad.

3. Vid användning av medlet, se till att inte: -

appliceringsvätskan rinner ner på angränsande planteringar av odlade växter, särskilt tvåhjärtbladiga växter, - appliceringsvätskan överlappar varandra vid korsningarna mellan behandlingsremsor och uddar, - medlet tränger in i vatten (särskilt vatten som används för bevattning av växter).

BEREDNING AV ANVÄNDBAR VÄTSKA OCH SPRUTNINGSTEKNIK Innan du beredningar den användbara vätskan, bestäm noggrant önskad volym och mängd sprutmedel. Följ sprutstillverkarens anvisningar vid påfyllning av sprutan.

Om instruktioner saknas, tillsätt den uppmätta mängden medlet i en delvis fylld sprutbehållare med vatten (med omröraren påslagen). Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och håll sköljmedlet i sprutbehållaren som innehåller arbetsvätskan och fyll på med vatten till önskad volym. Efter att medlet har hållits i sprutbehållaren utan hydraulisk omrörare, blanda arbetsvätskan mekaniskt. Använd arbetsvätskan omedelbart efter beredningen. Om sprutningen avbryts, blanda arbetsvätskan noggrant i sprutbehållaren innan arbetet återupptas.

HANTERING AV RESTER AV ANVÄNDBARA VÄTSKOR OCH RENGÖRING AV UTRUSTNINGEN

Rester av den användbara vätskan

bör: – om möjligt användas efter utspädning på den yta där behandlingen utfördes, eller – bortskaffas med hjälp av tekniska lösningar som säkerställer biologisk nedbrytning av de aktiva substanserna i växtskyddsmedel, eller – bortskaffas på annat sätt, i enlighet med avfallsbestämmelserna.

Tvätta utrustningen noggrant efter användning. Noggrann rengöring av utrustningen är särskilt viktig innan den används på andra växter än de som rekommenderas.

Behandla vattnet som används för att rengöra utrustningen på samma sätt som den återstående vätskan, med samma personliga skyddsutrustning.

VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN Innan

produkten används måste alla berörda parter som kan komma att exponeras för driften av arbetsvätskan och som har begärt sådan information informeras om detta.

Försiktighetsåtgärder för personer som använder

produkten: Ät, drick eller rök inte medan produkten används.

Använd skyddshandskar och skyddskläder för att skydda mot effekterna av växtskyddsmedel vid beredning av arbetslösningen och under behandlingen.

Miljöskyddsåtgärder:

Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess förpackning. Tvätta inte utrustning nära ytvatten. Undvik vattenförorening genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

Lekplatser och rekreationsområden - När ogräset blommar, klipp och spraya efter 2 veckor

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 1 m bred skyddszon från reservoarerna och vattendrag.

För att skydda växter och leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Perioden från appliceringen av medlet till den dag då människor och djur får vistas i området där medlet applicerades (förebyggande period): Gå inte in förrän vätskan har torkat helt på växtytan.

Period från sista appliceringen av produkten till skörddagen (karenstid): Ej tillämpligt.

Period från den sista appliceringen av produkten på grödan till den dag då följande gröda kan sås eller planteras: VÄXTFRAMGÅNG måste beaktas.

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV VÄXTSKYDDSMEDEL OCH FÖRPACKNING
Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara växtskyddsmedel:

• på platser eller i anläggningar där

lämpliga säkerhetsåtgärder finns vidtagna

mot miljöföroreningar och åtkomst av tredje part,

• i originalförpackning, på ett sätt som förhindrar kontakt med livsmedel, drycker eller foder,

• vid en temperatur på 0°C - 30°C.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar av växtskyddsmedel för andra ändamål.

All oanvänd produkt ska överföras till en enhet som är auktoriserad för insamling av farligt avfall.

Det rekommenderas att du returnerar tomma behållare till en återförsäljare av växtskyddsmedel eller hanterar dem som kommunalt avfall. Om du har några frågor om hur du ska göra dig av med behållarna, kontakta din återförsäljare av växtskyddsmedel.

FÖRSTA HJÄLPEN Motgift:

inget, behandla symptomatiskt.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

Giltighetstid - 3 år

Produktionsdatum -

Nätinnehåll -

Batchnummer -