

Bilag til tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R-94/2014 af 23. juni
2014 ændret ved Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter's afgørelse nr. R-358/2016d af 20. juli 2016.

Tilladelsesindehaver: CIECH

Sarżyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarżyna, tlf.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail:
sarżyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX TURBO 340 SL

Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere.

Indhold af aktive stoffer:

MCPA (en forbindelse fra gruppen af phoxycarboxylsyre) - 300 g/l (25,9%)

dicamba (en forbindelse fra gruppen af benzoesyrederivater) - 40 g/l (3,4%)

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R-94/2014 af 23.

juni 2014 ændret ved Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter afgørelse nr. R-879/2015d af

23. oktober 2015 og Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter afgørelse nr. R-358/2016d af 20. juli 2016.



Opmærksomhed

H302 - Farlig ved indtagelse.

H315 - Forårsager hudirritation.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH 401 - Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301+312 - VED INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

BESKRIVELSE AF

FUNKTIONEN CHWASTOX TURBO 340 SL er et herbicid i form af et koncentrat til fremstilling af en vandig opløsning til bladpåføring, beregnet til bekæmpelse af etårige tokimbladede ukrudtsplanter efter fremspiring.

Chwastox Turbo 340 SL er et selektivt, systemisk herbicid, der primært absorberes gennem ukrudtsblade og derefter hurtigt flyttes inden for planten, hvilket forårsager deformation, hæmmet vækst og død. Det er mest effektivt til at bekæmpe ukrudt i deres tidlige udviklingsstadier - kimplanter og rosetter. Varmt vejr, der favoriserer plantevækst, forstærker herbicidets herbicide effekt.

Ifølge HRAC-klassificeringen er de aktive stoffer MCPA og dicamba klassificeret i gruppe O. Produktet er beregnet til brug med selvkørende eller traktormonterede marksprøjter.

EFFEKT PÅ UKRUDS Vinterkorn

Følsomme ukrudtsplanter: kornblomst, fuglegræs, hvid gåsefod, markvalmue, duftløs kamille, kløverblad, raps, almindelig hyrdetaske, markbundter.

Moderat følsomt ukrudt: agerblomst.

Forårssæd

Følsomme ukrudtsplanter: fuglegræs, hvid gåsefod, markvalmue, duftløs kamille, kløverblad, markkamille, markkviste.

Moderat følsomt ukrudt: purpurbrændenælde, landbrugs-ærenpris, persisk ærenpris, grov amarant.

Moderat resistent ukrudt: agerstedmoderblomst.

ANVENDELSE AF AGENTET

Vårbyg, havre Maksimal/

anbefalet dosis til en enkelt anvendelse: 2,0 l/ha Anvendelsesperiode: Brug produktet fra begyndelsen til slutningen af skudfasen hos korn (BBCH 21-29).

For at udvide ukrudtsbekæmpelsen i vårbyg med sennep kan Chwastox Turbo 340 SL anvendes i ovennævnte periode i en blanding med Chwastox MP 600 SL i følgende doser: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstor dråbe. Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Vinterhvede, vintertriticale, rug Maksimal/anbefalet

dosis til en enkelt anvendelse: 2,5 l/ha Anvendelsesdato: Påfør produktet om foråret fra begyndelsen til slutningen af kornproduktionsfasen (BBCH 21-29).

For at udvide ukrudtsbekæmpelsen i vinterhvede med markkamille og marksennep kan Chwastox Turbo 340 SL anvendes i ovennævnte periode i en blanding med Chwastox MP 600 SL i følgende doser: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha.

For at udvide bekæmpelsen af ukrudt i vinterhvede til også at omfatte purpurbrændenælde, snerle (convolvulus) og marksennep, kan Chwastox Turbo 340 SL anvendes i ovennævnte periode i en blanding med Ambassador 75 WG i følgende doser: Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha + Ambassador 75 WG 20 g/ha.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstor dråbe. Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

PLANTESUCCESS Hvis det er

nødvendigt at fjerne den plantage, der er behandlet med midlet, som følge af skader på planterne forårsaget af frost, sygdomme eller skadedyr, kan andre planter dyrkes efter udførelse af kultivering før såning, undtagen arter, der er særligt følsomme over for midlet, f.eks. tomater, rødbeder.

FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER FOR BRUG I FORBINDELSE MED GOD LANDBRUGSPRAKSIS 1.

Brug ikke produktet: ÿ i perioder med tørke, ÿ på syge,

beskadigede eller

våde planter, ÿ ved temperaturer under 10°C og

over 25°C, ÿ når temperaturen om natten er

lavere end 5°C, -

før frost og regn nærmer sig, - i blæsende vejr, hvilket kan

få væsken til at drive ned på tilstødende

afgrødeplanter.

2. Undgå at bruge produktet: _____

ÿ afdrift af arbejdsvæsken til tilstødende afgrødeplantager, ÿ overlapning af arbejdsvæsken ved krydsninger mellem behandlingsstriber og forager.

TILBEREDNING AF BRUGSBARE VÆSKE

Før du begynder at tilberede den brugbare væske, skal du bestemme den nøjagtige mængde, der er nødvendig.

For at undgå utilsigtet kontaminering med andre plantebeskyttelsesmidler skal sprøjten vaskes med en 10% opløsning af sodavand eller aktivt kul.

Når du tilbereder arbejdsvæsken til midlet, hældes den afmålte mængde midlet først i sprøjtebeholderen (fyldt med en lille mængde vand).

Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og hæld skyllevæsken i sprøjtes tank med arbejdsvæsken.

Fyld derefter sprøjtetanken op med vand til den nødvendige mængde, og bland grundigt.

Sæt vandforsyningsslangen ned i tanken helt ned til bunden af tanken.

Ved afbrydelser i sprøjtningen skal arbejdsvæsken blandes grundigt i sprøjtetanken, inden arbejdet genoptages.

HÅNDTERING AF RESTER AF BRUGBAR VÆSKE

Rester af brugbar væske efter behandlingen skal håndteres på en måde, der begrænser risikoen for forurening af overflade- og grundvand i henhold til vandlovgivningens bestemmelser og jordforurening, dvs.: – efter forudgående fortynding, anvendelse på

den overflade, hvorpå behandlingen blev udført, hvis det er muligt, eller – bortskaffelse ved hjælp af tekniske løsninger, der sikrer biologisk

nedbrydning af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller – bortskaffes på anden måde i overensstemmelse med affaldsreglerne. Vask udstyret grundigt efter arbejdet.

Vand, der bruges til at rengøre udstyret, skal behandles på samme måde som resterende sprøjtevæske. På grund af nogle afgrøders høje følsomhed over for selv små mængder af produktet, er det meget vigtigt at rengøre sprøjten grundigt efter brug, især før den bruges på andre afgrøder end dem, der anbefales.

BETINGELSER FOR SIKKER BRUG AF AGENTET

Før produktet tages i brug, skal alle interesserede parter, der kan blive udsat for sprøjteeffekten, og som har anmodet om sådanne oplysninger, informeres.

Forholdsregler for personer, der bruger produktet:

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Brug beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse og beskyttelsestøj for at beskytte mod virkningerne af plantebeskyttelsesmidler under tilberedning af arbejdsopløsningen og under behandlingen.

Miljømæssige forholdsregler:

Forurens ikke vand med produktet eller dets emballage.

Vask ikke udstyr i nærheden af overfladevand.

Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter fra landbrug og veje.

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 1 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte ikke-målplanter og leddyr er det nødvendigt at definere en bufferzone i en afstand af 5 m fra ikke-landbrugsområder.

Perioden fra midlets påføring til den dag, hvor mennesker og dyr må betræde det område, hvor midlet blev påført (forebyggelsesperiode): Gå ikke ind, før væsken er helt tørret på plantens overflade.

Periode fra sidste anvendelse af midlet til dagen for høst af afgrøden (tilbageholdelsesperiode):

Ikke relevant

Periode fra sidste påføring af produktet på afgrøden indtil den dag, hvor den følgende afgrøde kan sås eller plantes:

PLANTESUCCES skal tages i betragtning.

OPBEVARINGSFORHOLD OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER OG EMBALLAGE

Opbevares utilgængeligt

for børn. Opbevar

plantebeskyttelsesmidler: ÿ i områder eller faciliteter, der er tilstrækkeligt beskyttet mod miljøforurening og adgang for tredjeparter, ÿ i originalemballagen, så

kontakt med fødevarer, drikkevarer eller foderstoffer undgås, ÿ ved en temperatur på 0-30 °C.

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle farligt affald.

Returner den tomme emballage, der indeholder farlige plantebeskyttelsesmidler, til sælgeren.

FØRSTEHJÆLP Modgift:

ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Ved indtagelse: Ring til en giftinformationscentral eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

Gyldighedsperiode - 3 år

Produktionsdato -

Netindhold -

Batchnummer -