

Allegato all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-94/2014 del 23 giugno 2014 modificata dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-358/2016d del 20 luglio 2016.

Titolare del permesso: CIECH

Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX TURBO 340 SL

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali.

Contenuto di principi attivi:

MCPA (un composto del gruppo degli acidi fenossicarbossilici) - 300 g/l (25,9%)

dicamba (un composto del gruppo dei derivati dell'acido benzoico) - 40 g/l (3,4%)

Autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 94/2014 del 23 giugno 2014 modificata dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 879/2015d del 23 ottobre 2015 e dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 358/2016d del 20 luglio 2016.



Attenzione

H302 - Nocivo se ingerito.

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P301+312 - IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

DESCRIZIONE

DELL'OPERAZIONE CHWASTOX TURBO 340 SL è un erbicida sotto forma di concentrato per la preparazione di una soluzione acquosa, per applicazione fogliare, destinato al controllo post-emergenza delle infestanti dicotiledoni annuali.

Chwastox Turbo 340 SL è un erbicida selettivo e sistemico che viene assorbito principalmente attraverso le foglie delle infestanti e poi rapidamente traslocato all'interno della pianta, causando deformazioni, crescita stentata e morte. È particolarmente efficace nel controllo delle infestanti nelle prime fasi di sviluppo: piantine e rosette. Il clima caldo, favorendo la crescita delle piante, potenzia l'effetto erbicida dell'erbicida.

Secondo la classificazione HRAC, le sostanze attive MCPA e dicamba sono classificate nel gruppo O. Il prodotto è destinato all'uso con irroratrici semoventi o montate su trattore.

EFFETTO SULLE ERBACCE Cereali

invernali

Erbacce sensibili: fiordaliso, stellaria media, piede d'oca bianco, papavero dei campi, biancospino inodore, ganja, colza spontanea, borsa del pastore comune, fagottini di campo.

Erbacce moderatamente sensibili: viola del pensiero.

Cereali primaverili

Erbacce sensibili: stellaria media, piede d'oca bianco, papavero campestre, biancospino inodore, erba cipollina, camomilla campestre, ramoscelli campestri.

Erbacce moderatamente sensibili: ortica viola, veronica agricola, veronica persiana, amaranto ruvido.

Erbacce moderatamente resistenti: viola del pensiero.

RICHIESTA DELL'AGENTE

Orzo primaverile, avena

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 2,0 l/ha Periodo di applicazione:

impiegare il prodotto dall'inizio alla fine della fase di accestimento dei cereali (BBCH 21-29).

Per ampliare l'azione di controllo delle infestanti nell'orzo primaverile con senape campestre, Chwastox Turbo 340 SL può essere utilizzato nel periodo sopra indicato in miscela con Chwastox MP 600 SL alle seguenti dosi: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Spruzzatura consigliata: goccioline medie Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

Frumento invernale, triticale invernale, segale Dose

massima/consigliata per singola applicazione: 2,5 l/ha Data di applicazione: applicare il prodotto in primavera dall'inizio alla fine della fase di accestimento dei cereali (BBCH 21-29).

Per ampliare l'azione di controllo delle infestanti nel frumento invernale con camomilla e senape campestre, è possibile utilizzare Chwastox Turbo 340 SL nel periodo sopra indicato in miscela con Chwastox MP 600 SL alle seguenti dosi: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha.

Per ampliare la gamma di controllo delle erbe infestanti nel frumento invernale, includendo ortica viola, convolvolo e senape dei campi, è possibile utilizzare Chwastox Turbo 340 SL nel periodo sopra indicato in miscela con Ambassador 75 WG alle seguenti dosi: Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha + Ambassador 75 WG 20 g/ha.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Spruzzatura consigliata: goccioline medie Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

SUCCESSO DELLE PIANTE Se

è necessario eliminare la piantagione trattata con l'agente a causa di danni alle piante causati da gelo, malattie o parassiti, dopo aver effettuato la coltivazione pre-semina, si possono coltivare altre piante, ad eccezione delle specie particolarmente sensibili all'agente, ad esempio pomodori, barbabietole.

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI D'USO RELATIVE ALLA BUONA PRATICA AGRICOLA 1. Non utilizzare il prodotto: ÿ in periodi di siccità, ÿ su piante

malate, danneggiate

o bagnate, ÿ a temperature inferiori a 10°C e

superiori a 25°C, ÿ quando la temperatura notturna è inferiore a 5 °C,

- prima dell'avvicinarsi del gelo e della pioggia, - durante

il tempo ventoso, che può causare la deriva del liquido sulle superfici adiacenti piante coltivate.

2. Durante l'utilizzo del prodotto, non consentire:

ÿ deriva del liquido di lavoro sulle piantagioni di colture vicine, ÿ sovrapposizione

del liquido di lavoro nelle giunzioni delle strisce di trattamento e delle capezzagne.

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO UTILIZZABILE

Prima di iniziare a preparare il liquido utilizzabile, determinare esattamente la quantità necessaria.

Per evitare contaminazioni accidentali con altri prodotti fitosanitari, lavare l'irroratore con una soluzione al 10% di soda o carbone attivo.

Quando si prepara il liquido di lavoro dell'agente, versare prima la quantità misurata dell'agente nel serbatoio dell'irroratrice (riempito con una piccola quantità d'acqua).

Sciacquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e versare il liquido di risciacquo nel serbatoio dell'irroratrice contenente il fluido di lavoro. Quindi, rabboccare il serbatoio dell'irroratrice con acqua fino alla quantità necessaria, mescolando accuratamente.

Inserire il tubo di alimentazione dell'acqua nel serbatoio fino al fondo.

In caso di interruzioni della spruzzatura, miscelare accuratamente il liquido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

GESTIONE DEI RESIDUI DI LIQUIDO UTILIZZABILE I resti di

liquido utilizzabile dopo il trattamento devono essere gestiti in modo da limitare il rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee ai sensi delle disposizioni della legge sulle acque e di contaminazione del

suolo, vale a dire: – dopo la diluizione preventiva, utilizzo sulla superficie su cui è stato effettuato il trattamento, se possibile,

oppure – smaltimento mediante soluzioni tecniche che garantiscano la protezione biologica degradazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, oppure

– smaltiti in altro modo, in conformità con le normative sui rifiuti.

Lavare accuratamente l'attrezzatura dopo il lavoro.

L'acqua utilizzata per la pulizia dell'attrezzatura deve essere trattata allo stesso modo del liquido di irrorazione residuo. Data l'elevata sensibilità di alcune colture anche a quantità minime di prodotto, è molto importante pulire accuratamente l'irroratrice dopo l'uso, soprattutto prima di utilizzarla su colture diverse da quelle raccomandate.

CONDIZIONI PER L'USO SICURO DELL'AGENTE

Prima di utilizzare il prodotto, tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva dello spray e che hanno richiesto tali informazioni devono essere informate.

Precauzioni per le persone che utilizzano il prodotto:

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Indossare guanti protettivi, protezioni per occhi e viso e indumenti protettivi per proteggersi dagli effetti dei prodotti fitosanitari durante la preparazione della soluzione di lavoro e durante il trattamento.

Precauzioni ambientali:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o la sua confezione.

Non lavare l'attrezzatura vicino all'acqua di superficie.

Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i fossi di drenaggio delle aziende agricole e delle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 1 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere le piante e gli artropodi non bersaglio, è necessario definire una zona cuscinetto a una distanza di 5 m dalle aree non agricole.

Periodo che va dall'applicazione dell'agente al giorno in cui persone e animali possono accedere all'area in cui è stato applicato l'agente (periodo di prevenzione): non entrare finché il liquido non si è completamente asciugato sulla superficie della pianta.

Periodo compreso tra l'ultima applicazione dell'agente e il giorno della raccolta della coltura (periodo di sospensione):

Non applicabile

Periodo compreso tra l'ultima applicazione del prodotto sulla coltura e il giorno in cui è possibile seminare o piantare la coltura successiva:
si deve tenere conto del SUCCESSO DELLA PIANTA.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO SICURO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DELL'IMBALLAGGIO Tenere

fuori dalla portata dei

bambini. Conservare i prodotti fitosanitari:

in aree o strutture adeguatamente protette dalla contaminazione ambientale e dall'accesso di terzi, in
nella confezione originale, evitando il contatto con alimenti, bevande o mangimi, in a
una temperatura compresa tra 0 e 30 °C.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Restituire al venditore gli imballaggi vuoti contenenti prodotti fitosanitari pericolosi.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, trattare in modo sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

In caso di ingestione: contattare un centro antiveleni o un medico se non ci si sente bene.

Periodo di validità - 3 anni

Data di produzione

Contenuto netto -

Numero di lotto -