

Bijlage bij de vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-94/2014 van 23 juni 2014 gewijzigd door het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-358/2016d van 20 juli 2016.

Vergunninghouder: CIECH

Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX TURBO 340 SL

Het product is bedoeld voor gebruik door professionele gebruikers.

Inhoud werkzame stoffen:

MCPA (een verbinding uit de groep van fenoxycarbonzuren) - 300 g/l (25,9%)

dicamba (een verbinding uit de groep van benzoëzuurderivaten) - 40 g/l (3,4%)

Vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 94/2014 van 23 juni 2014 gewijzigd door het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 879/2015d van 23 oktober 2015 en het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 358/2016d van 20 juli 2016.



Aandacht

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH 401 - Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P301+312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

WERKINGSBESCHRIJVING CHWASTOX TURBO 340 SL is een herbicide in de vorm van een concentraat voor het bereiden van een waterige oplossing voor bladtoepassing, bedoeld voor de na-opkomstbestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden.

Chwastox Turbo 340 SL is een selectief, systemisch herbicide dat voornamelijk via de bladeren van onkruid wordt opgenomen en zich vervolgens snel door de plant verspreidt, wat leidt tot vervorming, groeiachterstand en afsterven. Het is het meest effectief bij de bestrijding van onkruid in de vroege stadia van hun ontwikkeling: zaailingen en rozetten. Warm weer, dat de plantengroei bevordert, versterkt de herbicide werking van het herbicide.

Volgens de HRAC-classificatie zijn de werkzame stoffen MCPA en dicamba ingedeeld in groep O. Het product is bedoeld voor gebruik met zelfrijdende of op een tractor gemonteerde veldspuiten.

EFFECT OP ONKRUID Wintergranen

Gevoelige onkruiden: korenbloem, muur, witte ganzenvoet, klapproos, geurloze kamille, kleeftkruid, koolzaadopslag, herderstasje, akkerbonen.

Matig gevoelige onkruiden: akkerviooltje.

Lentegransen

Gevoelige onkruiden: vogelmuur, witte ganzenvoet, klapproos, geurloze kamille, kleeftkruid, akkerkamille, akkertwijgen.

Matig gevoelige onkruiden: paarse dovenetel, ereprijs, Perzische ereprijs, ruwe amarant.

Matig resistent onkruid: akkerviooltje.

TOEPASSING VAN DE AGENT

Zomergerst, haver

Maximale/aanbevolen dosis voor een enkele toepassing: 2,0 l/ha Toepassingsperiode: gebruik het product van het begin tot het einde van de uitstoeingsfase van granen (BBCH 21-29).

Om het bereik van de onkruidbestrijding in voorjaarsgerst met veldmosterd uit te breiden, kan in de bovengenoemde periode Chwastox Turbo 340 SL worden gebruikt in een mengsel met Chwastox MP 600 SL in de volgende doseringen: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen bespuiting: middelgrote druppel

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1

Wintertarwe, wintertriticale, rogge Maximale/

aanbevolen dosis voor een enkele toepassing: 2,5 l/ha Toepassingsdatum: breng het product in het voorjaar aan vanaf het begin tot het einde van de uitstoeingsfase van het graan. (BBCH 21-29).

Om het werkingsgebied van onkruidbestrijding in wintertarwe met akkerkamille en akkermosterd uit te breiden, kan in de bovengenoemde periode Chwastox Turbo 340 SL worden gebruikt in een mengsel met Chwastox MP 600 SL in de volgende doseringen: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha.

Om het werkingsgebied van onkruidbestrijding in wintertarwe uit te breiden met paarse dovenetel, winde (convolvulus) en veldsla, kan in de bovengenoemde periode Chwastox Turbo 340 SL worden gebruikt in een mengsel met Ambassador 75 WG in de volgende doseringen: Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha + Ambassador 75 WG 20 g/ha.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen bespuiting: middelgrote druppel

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1

PLANTENSUCCESS Als het

nodig is om de met het middel behandelde aanplant te verwijderen als gevolg van schade aan de planten door vorst, ziekten of plagen, kunnen na het uitvoeren van voorzaai bewerking andere planten worden geteeld, met uitzondering van soorten die bijzonder gevoelig zijn voor het middel, bijvoorbeeld tomaten en bieten.

VOORZORGSMAATREGELEN EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK IN VERBAND MET GOEDE LANDBOUWPRAKTIJK 1.

Gebruik het product niet: ÿ in

periodes van droogte,

ÿ op zieke, beschadigde of natte planten, ÿ bij

temperaturen onder de 10°C en boven de 25°C, ÿ wanneer de temperatuur 's nachts laag is lager dan 5°C, -

voordat er vorst en regen komt, - tijdens winderig weer,

waardoor de vloeistof naar aangrenzende wateren kan drijven

landbouwgewassen.

2. Bij gebruik van het product mag u het volgende niet toestaan:

ÿ afdrijven van de werkvloeistof naar aangrenzende landbouwaanplantingen, ÿ

overlappend van de werkvloeistof op de kruisingen van behandelingsstroken en kopakkers.

HET BEREIDEN VAN DE BRUIKBARE VLOEISTOF

Voordat u begint met het bereiden van de bruikbare vloeistof, bepaalt u nauwkeurig hoeveel vloeistof u nodig hebt. Om onbedoelde besmetting met andere gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, wast u de spuitmachine met een 10% oplossing van soda of actieve kool.

Bij het bereiden van de werkvloeistof van het middel giet u eerst de afgemeten hoeveelheid middel in de spuittank (gevuld met een kleine hoeveelheid water).

Spoel de lege containers drie keer met water en giet het spoelmiddel in de tank van de spuitmachine met de werkvloeistof. Vul de tank van de spuitmachine vervolgens bij met water tot de benodigde hoeveelheid en meng goed.

Steek de watertoevoerslang in de tank, helemaal tot aan de bodem.

Bij onderbrekingen in het spuitwerk, mengt u de werkvloeistof grondig in de spuittank voordat u het werk hervat.

BEHANDELING VAN DE RESTANTEN VAN BRUIKBARE VLOEISTOF

De restanten van bruikbare vloeistof na de behandeling dienen op een wijze te worden behandeld die het risico van verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater in de zin van de bepalingen van de Waterwet en van bodemverontreiniging beperkt,

d.w.z.: – na voorafgaande verdunning, indien mogelijk, gebruiken op het oppervlak waarop de behandeling is uitgevoerd, of – afvoeren met

behulp van technische oplossingen die de biologische

afbraak van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, of – op

een andere wijze worden verwijderd, overeenkomstig de afvalvoorschriften.

Maak de apparatuur na het werk grondig schoon.

Water dat gebruikt wordt om de apparatuur te reinigen, moet op dezelfde manier behandeld worden als overgebleven spuitvloeistof. Omdat sommige gewassen zeer gevoelig zijn voor zelfs kleine hoeveelheden van het product, is het zeer belangrijk om de spuit na gebruik grondig te reinigen, vooral voordat u deze gebruikt op andere gewassen dan de aanbevolen gewassen.

VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK VAN DE AGENT

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk in aanraking komen met de spuitnevel en die om dergelijke informatie hebben gevraagd, worden geïnformeerd.

Voorzorgsmaatregelen voor mensen die het product gebruiken:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Draag beschermende handschoenen, oog- en gezichtsbescherming en beschermende kleding om uzelf te beschermen tegen de effecten van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het bereiden van de werkoplossing en tijdens de behandeling.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Verontreinig het water niet met het product of de verpakking.

Was de uitrusting niet in de buurt van oppervlaktewater.

Voorkom waterverontreiniging via afwateringssloten van boerderijen en wegen.

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk om een beschermingszone van 1 m breed aan te wijzen rondom reservoirs en waterlopen.

Om niet-doelsoorten en geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk om een bufferzone af te bakenen op een afstand van 5 m van niet-agrarische gebieden.

De periode vanaf het aanbrengen van het middel tot de dag waarop mensen en dieren het gebied mogen betreden waar het middel is aangebracht (preventieperiode): Betreed de ruimte pas wanneer de vloeistof volledig is opgedroogd op het plantenoppervlak.

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst van het gewas (wachttijd):

Niet van toepassing

De periode vanaf de laatste toepassing van het product op het gewas tot aan de dag waarop het volgende gewas kan worden gezaaid of geplant: PLANT
SUCCES moet in aanmerking worden genomen.

BEWAAROMSTANDIGHEDEN EN VEILIGE VERWIJDERING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN VERPAKKING Buiten bereik

van kinderen houden.

Bewaar gewasbeschermingsmiddelen: ÿ in

ruimtes of faciliteiten die adequaat zijn beschermd tegen milieuverontreiniging en toegang door derden, ÿ in de originele verpakking, zodat contact met voedsel, dranken of diervoeders wordt voorkomen, ÿ bij een temperatuur van 0 - 30 °C.

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Ongebruikte producten moeten worden overgedragen aan een instantie die bevoegd is om gevaarlijk afval te verzamelen.

Lever de lege verpakkingen met gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in bij de verkoper.

EERSTE HULP Tegengif:

geen, symptomatisch behandelen.

Indien u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Bij inslikken: Indien u zich onwel voelt, raadpleeg dan een antigifcentrum of een arts.

Geldigheidsduur - 3 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -