

Bilaga till tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-94/2014 av den 23 juni 2014, ändrat genom beslut från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-358/2016d av den 20 juli 2016.

Tillståndshavare: CIECH

Sarżyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarżyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-post: sarżyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX TURBO 340 SL

Produkten är avsedd för professionella användare.

Innehåll av aktiva substanser:

MCPA (en förening från gruppen fenoxikarboxylsyror) - 300 g/l (25,9 %)

dikamba (en förening från gruppen bensoesyra-derivat) - 40 g/l (3,4 %)

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-94/2014 av den 23 juni 2014 ändrat genom beslut från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-879/2015d av den 23 oktober 2015 och beslut från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-358/2016d av den 20 juli 2016.



Uppmärksamhet

H302 - Skadligt vid förtäring.

H315 - Orsakar hudirritation.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH 401 - För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+312 - VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du känner dig dålig.

BRUKSANVISNING

CHWASTOX TURBO 340 SL är ett herbicidmedel i form av ett koncentrat för beredning av en vattenlösning, för bladbekämpning, avsett för bekämpning efter uppkomst av ettåriga tvåhjärtbladiga ogräs.

Chwastox Turbo 340 SL är en selektiv, systemisk herbicid som absorberas huvudsakligen genom ogräsblad och sedan snabbt förflyttas inom växten, vilket orsakar deformation, hämmad tillväxt och död. Den är mest effektiv för att bekämpa ogräs i deras tidiga utvecklingsstadier – plantor och rosetter. Varmt väder som gynnar växttillväxt förstärker herbicidens herbicideffekt.

Enligt HRAC-klassificeringen klassificeras de aktiva substanserna MCPA och dicamba i grupp O. Produkten är avsedd att användas med självgående eller traktormonterade fältsprutor.

EFFEKT PÅ OGRÄS Vinterspannmål

Känsliga ogräs: blåklint, fågel, vit gåsfot, åkervallmo, doftlös baldersbjörn, köttysa, raps, vanlig herdeväska, åkerknippen.

Måttligt känsliga ogräs: åkerpensé.

Vårsädeslag

Känsliga ogräs: våtmark, vit gåsfot, åkervallmo, doftlös baldersbrå, köttysa, åkerkamomill, åkerkvistar.

Måttligt känsliga ogräs: purpurfärgad nässla, jordbruksärenpris, persisk ärenpris, grov amarant.

Måttligt resistent ogräs: åkerpensé.

ANVÄNDNING AV MEDELET

Vårkorn, havre Maximal/

rekommenderad dos för engångsbehandling: 2,0 l/ha Appliceringsperiod: använd produkten från början till slutet av sprängfasen hos spannmål (BBCH 21-29).

För att utöka ogräsbekämpningen i vårkorn med åkersenap kan Chwastox Turbo 340 SL användas under ovan nämnda period i en blandning med Chwastox MP 600 SL i följande doser: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1

Vintervete, vinterrågvete, råg Maximal/

rekommenderad dos för engångsbehandling: 2,5 l/ha Appliceringsdatum: applicera produkten på våren från början till slutet av spannmålsbildningsfasen (BBCH 21-29).

För att utöka ogräsbekämpningen i höstvet med åkerkamomill och åkersenap kan Chwastox Turbo 340 SL användas under ovan nämnda period i en blandning med Chwastox MP 600 SL i följande doser: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha.

För att utöka ogräsbekämpningen i höstvet till att omfatta röd nässla, vinda och åkersenap, kan Chwastox Turbo 340 SL användas under ovan nämnda period i en blandning med Ambador 75 WG i följande doser: Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha + Ambador 75 WG 20 g/ha.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1

VÄXTSUCCES Om det är nödvändigt

att eliminera den plantering som behandlats med medlet på grund av skador på växterna av frost, sjukdomar eller skadedjur, kan andra växter odlas efter utförd försädd, förutom arter som är särskilt känsliga för medlet, t.ex. tomat, rödbetor.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED GOD JORDBRUKSPRAKSIS 1.

Använd inte produkten: ✓

under torka, ✓ på sjuka,
skadade eller våta växter, ✓ vid temperaturer under
10°C och över 25°C, ✓ när nattetemperaturen är
lägre än 5°C, -
före frost och regn, - vid blåsigtt väder, vilket kan få vätskan
att driva över på intilliggande
grödor.

2. Tillåt inte följande när du använder produkten: _____

✓ avdrift av arbetsvätskan till angränsande odlingar, ✓ överlappning av arbetsvätskan
vid korsningarna mellan behandlingsremsor och åkerfält.

TILLAGNING AV ANVÄNDBARA VÄTSKAN Innan

du börjar tillreda den användbara vätskan, fastställ exakt hur mycket som behövs.

För att eliminera oavsiktlig kontaminering med andra växtskyddsmedel, tvätta sprutan med en 10% lösning av soda eller aktivt kol.

När du bereder arbetsvätskan för medlet, håll först den uppmätta mängden medlet i sprutbehållaren (fylld med en liten mängd vatten).

Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och håll sköljmedlet i sprutans tank som innehåller arbetsvätskan. Fyll sedan på spruttanken med vatten till önskad mängd och blanda noggrant.

För in vattenslangen i tanken helt ner till botten.

Vid avbrott i sprutningen, blanda arbetsvätskan noggrant i sprutbehållaren innan arbetet återupptas.

HANTERING AV RESTER AV ANVÄNDBARA VÄTSKOR Rester av

användbar vätska efter behandlingen bör hanteras på ett sätt som begränsar risken för förorening av yt- och grundvatten i den mening som avses i vattenlagens bestämmelser och markförorening, dvs.: – efter föregående utspädning, användning på

den yta där behandlingen utfördes, om möjligt, eller – bortskaffande med tekniska lösningar som säkerställer biologiska

nedbrytning av de aktiva substanserna i växtskyddsmedel, eller –
bortskaffa på annat sätt i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Tvätta utrustningen noggrant efter arbetet.

Vatten som används för att rengöra utrustningen bör behandlas på samma sätt som överbliven sprutvätska.

På grund av vissa gröders höga känslighet för även mycket små mängder av produkten är det mycket viktigt att rengöra sprutan noggrant efter användning, särskilt innan den används på andra grödor än de som rekommenderas.

VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV MEDELET

Innan produkten används bör alla berörda parter som kan komma att exponeras för sprutavdrift och som har begärt sådan information informeras.

Försiktighetsåtgärder för personer som använder produkten:

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Använd skyddshandskar, ögon- och ansiktsskydd och skyddskläder för att skydda mot effekterna av växtskyddsmedel vid beredning av arbetslösningen och under behandlingen.

Miljöskyddsåtgärder:

Förorena inte vatten med produkten eller dess förpackning.

Tvätta inte utrustning nära ytvatten.

Undvik vattenföroreningar genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 1 m bred skyddszon från reservoarer och vattendrag.

För att skydda icke-målväxter och leddjur är det nödvändigt att definiera en buffertzon på ett avstånd av 5 m från icke-jordbruksområden.

Perioden från appliceringen av medlet till den dag då människor och djur får vistas i området där medlet applicerades (förebyggande period): Gå inte in förrän vätskan har torkat helt på växtytan.

Period från sista appliceringen av medlet till skörddagen (karensperioden):

Ej tillämpligt

Period från sista appliceringen av produkten på grödan till den dag då följande gröda kan sås eller planteras:
VÄXTFRAMGÅNG måste beaktas.

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV VÄXTSKYDDSMEDEL OCH FÖRPACKNING Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara växtskyddsmedel:

• i områden eller anläggningar som har

skyddats på lämpligt sätt mot miljöförorening och åtkomst av tredje part, • i originalförpackningen, så att kontakt med livsmedel, drycker eller foder undviks, • vid en temperatur på 0–30 °C.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar av växtskyddsmedel för andra ändamål.

All oanvänd produkt ska överföras till en enhet som är auktoriserad för insamling av farligt avfall.

Returnera tomma behållare som innehåller farliga växtskyddsmedel till säljaren.

FÖRSTA HJÄLPEN Motgift:

inget, behandla symptomatiskt.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Vid förtäring: Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare om du känner dig dålig.

Giltighetstid - 3 år

Produktionsdatum -

Nätinnehåll -

Batchnummer -