

Bilag til Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters afgørelse nr. R - MRiRW nr. R-369/2016d af 21. juli 2016 om ændring af tilladelse nr. R-9/2012 fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter af 12. januar 2012.

Indehaver af tilladelse: Bayer SAS,

16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon, Frankrig, tlf.: +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36

Enhed, der indfører plantebeskyttelsesmidlet på Republikken Polens område: Bayer Sp. z oo, Al.

Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tlf.: 22 572 36 20, fax: 22 572 35 00

Enhed ansvarlig for den endelige emballage og mærkning af plantebeskyttelsesmidlet: AGROPAK Sp. j., Brzeziński i

Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tlf./fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl,

TARGET SA, Kartoszyo, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tlf.: +48 58 774 10 90, fax: +48 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl

## DECISMEGA 50 EW

Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere.

Aktivt stofindhold: deltamethrin

(en forbindelse fra pyrethroidgruppen) – 50 g/l (4,80%).

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R-9/2012 af 12. januar

2012 ændret ved Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters afgørelse nr. R-241/2012d af 3

Oktober 2012, ved afgørelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr.

R-526/2015d af 18. juni 2015 og ved Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters afgørelse nr. R-369/2016d af 21. juli 2016.



Fare

H301 - Giftig ved indtagelse.

H315 - Forårsager hudirritation.

**H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.**

H410 - Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH 401 - Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

**P301 + P310 - VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.**

**P391 – Opsaml spild.**

#### **BESKRIVELSE AF**

**VIRKNING:** Decis Mega 50 EW er et insekticid i form af et vandigt emulsionskoncentrat med kontakt- og mavevirkning, der er designet til at bekæmpe bidende og sugende skadedyr i landbrugs-, frugt-, grøntsags- og prydplanter. Det virker på plantens overflade. Det er designet til brug med selvkørende eller traktormonterede marksprøjter, selvkørende eller traktormonterede frugtplantagesprøjter og håndholdte sprøjter.

#### **ANVENDELSE AF AGENTET**

##### **LANDBRUGSPANT**

##### **Sukkerroer**

##### **Mszyca burakowa**

**Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,2 l/ha.**

**Anbefalet dosis til engangsbrug: 0,1 - 0,2 l/ha.**

**Ansøgningsdato: Ansøg**

så snart vingede bladlus bebor planterne, før kolonier opstår.

Antal behandlinger: 1.

##### **Rødbede loppebille, rødbede loppebille**

**Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,2 l/ha.**

**Anbefalet dosis til engangsbrug: 0,1 - 0,2 l/ha.**

**Ansøgningsperiode:**

Påfør når de første biller viser sig, eller når den første skade bemærkes.

Antal behandlinger:

1. Lidt komplikation

**Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,2 l/ha.**

**Anbefalet dosis til engangsbrug: 0,1 - 0,2 l/ha.**

**Ansøgningsdato: Ansøg**

umiddelbart efter de første symptomer på skadedyret viser sig (normalt i 2-4-bladsfasen hos rødbeder).

Antal behandlinger: 1.

Anbefalet vandmængde: 300 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.**

##### **Vinterhvede, vårbyg**

##### **Bladlus**

**Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,125 l/ha.**

**Anbefalet dosis til engangsbrug: 0,1 - 0,125 l/ha.**

**Anvendelsesperiode:**

**Påfør** efter aksning, men senest i perioden med kornets mælkeagtige modenhed.

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.

**Padderokker**

Maksimal dosis for en enkelt anvendelse: 0,125 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 0,1 - 0,125 l/ha.

**Anvendelsesdato:**

Anvendes fra larvernes begyndelse.

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.

Anbefalet vandmængde: 300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.

**Kartoffel**

**Larver og biller af Colorado-kartoffelbillen.**

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 0,1 - 0,15 l/ha.

**Ansøgningsdato: Ansøg**

efter skadedyrsangreb. Brug den højere anbefalede dosis til at bekæmpe biller og i tilfælde af frodig kartoffelvækst.

Anbefalet vandmængde: 150-400 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 7 dage.

**Vinterraps**

**Rapsmyg**

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.

**Ansøgningsdato: Ansøg**

efter fremkomsten af unge larver, når det gennemsnitlige antal larver er: 1 larve pr. 1 plante (på vinterraps om efteråret).

**Majroeille**

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.

**Påføringsdato: Påfør**

som anvist, inden billerne lægger deres æg.

Anbefalet vandmængde: 300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

**Vinterraps, forårssraps**

**Loppebiller, rapsolieoppebiller.**

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.

**Ansøgningsdato:**

Bruges når biller optræder på unge planter, eller når den første skade bemærkes.

**Rapsbille (behandling mod pollenbille bekæmper også firtandet bille)**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,1 l/ha.**

**Ansøgningsdato: Ansøg**

ifølge indikationerne efter billernes forekomst på planter i den kompakte blomsterstandsfasen, senest i den løse blomsterstandsfasen.

**Skadedyr i bælg (kålminer, kålminer)**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Ansøgningsperiode:**

Udfør behandlingen i begyndelsen af blomsterbladernes fald.

**Kålbladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Ansøgningsperiode:**

Påfør når de første bladluskolonier viser sig.

Anbefalet vandmængde: 300 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**I vinterraps er det maksimale antal behandlinger i vækstsæsonen: 3.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

**Det anbefales at udføre maksimalt 3 behandlinger, herunder 1 behandling om efteråret og 2 behandlinger om foråret.**

**I vårraps er det maksimale antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

**FRUGTPLANTER**

**Æbletræ**

**Æbleblomstmøl**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

Hvornår skal det bruges: Påfør

Lige før eller under knopbrydning på æbletræer. Påfør på solrige dage ved temperaturer på mindst 120°C.

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

**Æblebladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Påføringsdato: Påfør**

efter de første bladluskolonier viser sig.

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

Anbefalet vandmængde: 500-750 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

Blomme

### **Bladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Påføringsdato: Påfør**

**efter de første bladluskolonier viser sig.**

**Antal behandlinger: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

**Anbefalet vandmængde: 500-750 l/ha.**

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra resten af etiketten: 2.**

Solbær

### **Bladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Påføringsdato: Påfør**

**efter de første bladluskolonier viser sig.**

**Antal behandlinger: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

**Anbefalet vandmængde: 500-750 l/ha.**

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra resten af etiketten: 2.**

### **Jordbær**

Hindbærblomst

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Anvendelsesperiode:**

**Påfør før blomstring, i den periode hvor billerne viser sig.**

**Antal behandlinger: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

**Anbefalet vandmængde: 500-750 l/ha.**

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra resten af etiketten: 2.**

### **GRØNTSAGSPLANT**

Tomat dyrket i jorden

Colorado kartoffelbille

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Anvendelsesperiode: Brug**

**i perioden med billefremkomst eller larvernes udklækning.**

Anbefalet vandmængde: 600 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

**Hvidkål**

**Hvidkål, hvidkål**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Ansøgningsperiode:**

**Bruges under larvernes udklækningsperiode.**

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

Anbefalet vandmængde: 600 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra resten af etiketten: 2.**

**PRYDPLANTER**

**Rose (i jorden)**

**Rosenbladlus**

**Maksimal koncentration til engangsbrug: 0,025% (25 ml af midlet i 100 l vand).**

**Anbefalet koncentration til engangsbrug: 0,015-0,025% (15-25 ml af midlet i 100 l vand).**

Anvendelsesdato: Påfør efter

at skadedyret er blevet bemærket.

**Rosenfarvet tragt**

**Maksimal koncentration til engangsbrug: 0,025% (25 ml af midlet i 100 l vand).**

**Anbefalet koncentration til engangsbrug: 0,015-0,025% (15-25 ml af midlet i 100 l vand).**

Anvendelsesdato: Anvend

efter bekræftelse af skadedyrets tilstedeværelse.

**Anbefalet mængde arbejdsvæske: 1000 l/ha.**

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14-21 dage.**

#### **ANVENDELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER I AFGRØDER OG ANVENDELSER I SMÅ OMRÅDER**

**Brugeren er eneansvarlig for effektiviteten og fytotoksiciteten af et plantebeskyttelsesmiddel  
produkt anvendt i mindre afgrøder.**

## **FRUGTPLANTER**

### **Solbær**

#### **Rosenrumpet tortrix**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Påføringsdato: Sprøjt**

efter skadedyret viser sig, fra det stadie hvor det første blad er foldet ud, indtil slutningen af blomstringsstadiet (BBC 11-69).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 500 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra den forrige del af etiketten: 2.**

### **Røde ribs, hvide ribs, blåbær fra højbusk**

#### **Bladlus, rosenbladrolle**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Anvendelsesdato: Sprøjtning**

efter at skadedyret viser sig fra det stadie, hvor det første blad er foldet ud, indtil slutningen af blomstringsstadiet (BBC 11-69).

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 500 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

### **Aronia**

#### **Bladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Påføringsdato: Sprøjt efter**

de første kolonier viser sig, fra det stadie hvor det første blad er foldet ud, indtil slutningen af blomstringsstadiet (BBCH 11-69).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

### **Rønneborer**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.**

**Ansøgningsdato: Den**

Behandlingen bør udføres om foråret, når skadedyret lever af blomsterstande, nemlig blomsterknopper, i fasen fra begyndelsen af blomsterstandens udvikling til slutningen af blomstringsfasen (BBCH 51-69).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 500 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

## Hindbær, brombær

Bladlus, *Drosophila suzukii* (plettet vinget drosophila), hindbærmyg, hindbærlysvinge

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.

### Ansøgningsperiode:

Sprøjt efter de første bladluskolonier viser sig, fra slutningen af blomstringsfasen til slutningen af den fremskredne frugtmogningsfase (BBCH 68-85).

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

Anbefalet vandmængde: 500 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

## Jordbær

Bladlus

Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.

### Påføringsdato: Sprøjtning

efter de første bladluskolonier viser sig fra slutningen af udviklingsfasen af udløberskud til begyndelsen af frugtmogningsfasen (BBCH 49-81).

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

*Drosophila suzukii* (plettet vinget drosophila), rosenvinget tortrix og andre tortrix-møl, suppleanter

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.

### Påføringsdato: Sprøjtning

efter skadedyrets optræden fra slutningen af udløberskuddenes udviklingsfase til begyndelsen af frugtmogningsfasen (BBCH 49-81).

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

Anbefalet vandmængde: 300-600 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra den forrige del af etiketten: 2.

Blomme

*Drosophila suzukii* (plettet vinget flue)

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.

Anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15-0,25 l/ha.

### Ansøgningsdato: Den

Behandling bør udføres 3-4 dage efter fangst med feromoner eller klæbefælder, fra frugtknopperne og indtil slutningen af fasen, hvor frugten er moden til konsum (BBCH 76-89).

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

Gulhornet frugtkrop, let frugtkrop

### Ansøgningsdato:



Bruges efter fangst med klæbefælder, i den sidste fase af blomsterbladets fald (BBCH 67-69).

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.

Anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15-0,25 l/ha.

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

Anbefalet vandmængde: 500-750 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra den forrige del af etiketten: 2.

**Kirsebær, sød kirsebær**

**Bladlus**

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 0,15 - 0,25 l/ha.

Påføringsdato: Sprøjtning

efter de første bladluskolonier viser sig, fra begyndelsen af den primære skudvækstfase indtil slutningen af fasen, hvor frugten er moden til konsum (BBCH 31-89).

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

**Kirsebærfrugtflue, Drosophila suzukii (plettet vinget frugtflue)**

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,25 l/ha.

Ansøgningsdato: Den

Behandling bør udføres 3-4 dage efter fangst med feromoner eller klæbefælder, når frugten når 60-90 % af sin typiske størrelse (BBCH 76-79).

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

Anbefalet vandmængde: 500-750 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.

**GRØNTSAGSPLANT**

**Hvidkålsbladlus**

Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.

Påføringsdato: Sprøjtning

efter de første bladluskolonier viser sig, fra begyndelsen af den klart udviklede første bladfase indtil slutningen af udviklingsfasen for de plantedele, der er beregnet til høst (BBCH 11-49).

Antal behandlinger: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.

Anbefalet vandmængde: 600 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen, under hensyntagen til brugen af produktet fra den forrige del af etiketten: 2.**

**Rødkål, broccoli, blomkål, kinakål, bladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Påføringsdato: Sprøjtning**

efter de første bladluskolonier viser sig, fra begyndelsen af den klart udviklede første bladfase indtil slutningen af udviklingsfasen for de plantedele, der er beregnet til høst (BBCH 11-49).

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 600 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Gulerod**

**Bladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Påføringsdato: Sprøjt**

efter de første bladluskolonier viser sig, fra begyndelsen af fasen med det første tydeligt udviklede blad indtil slutningen af fasen, hvor roden når sin typiske størrelse og form (BBCH 11-49).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

**Gulerodsflue Maksimum/**

**Anbefalet dosis til en enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Påføringsdato: Sprøjtning**

efter høst på klæbebrædder, fra begyndelsen af fasen med klart udviklede første blade indtil slutningen af fasen, hvor roden når sin typiske størrelse og form (BBCH 11-49).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 500 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Markærter dyrket til frisk frø, markærter dyrket til tørret frø)**

**Bladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Påføringsdato: Sprøjtning**

efter de første bladluskolonier viser sig, fra begyndelsen af den klart udviklede førstebladsfase til begyndelsen af blomsterstandens udviklingsfase (BBCH 11-49).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

#### **Ærtekapsel**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

**Anvendelsesperiode: Sprøjt efter skadedyret viser sig**

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 200-800 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Bønner dyrket til friske frø, bønner dyrket til tørrede frø**

#### **Bladlus**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

Anvendelsesdato: Sprøjtning

efter de første bladluskolonier viser sig, fra begyndelsen af den klart udviklede førstebladsfase til begyndelsen af blomsterstandens udviklingsfase (BBCH 11-49).

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 200-800 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Løg dyrket fra frø, løg dyrket fra kimplanter, løg dyrket fra foråret**

løg.

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

Påføringsdato: Sprøjt efter

høst med duft- eller feromonfælder, fra begyndelsen af den tydeligt synlige første bladfase indtil slutningen af udviklingsfasen for de plantedele, der er beregnet til høst (BBCH 11-49).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

#### **Tripser**

**Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 0,15 l/ha.**

Anvendelsesdato: Sprøjtning

efter fangst på klæbrige fælder, fra begyndelsen af den første tydeligt synlige bladfase indtil slutningen af udviklingsfasen for de plantedele, der er beregnet til høst (BBCH 11-49).

Antal behandlinger: 2.

**Interval mellem behandlinger: mindst 14 dage.**

Anbefalet vandmængde: 200-800 l/ha.

**Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.**

**Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.**

**FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER FOR BRUG I FORBINDELSE MED GODE  
LANDBRUGSPRAKSIKS**

1. Hvis der er behov for flere behandlinger, skal der anvendes skiftevis **anbefalede insekticider fra andre kemiske grupper.**
2. Midlet virker mest effektivt ved temperaturer under 20°C. Ved højere temperaturer udføre behandlinger sidst på dagen.
3. I tilfælde af skadedyrsbekæmpelse (især piercing-sugende skadedyr) bør behandlingen udføres grundigt, så alle dele af planten er dækket af arbejdsvæsken.
4. Før produktet anvendes på prydplanter, skal der udføres en testbehandling på hver sort, der dyrkes for første gang, for at kontrollere, om der er opstået symptomer på planteskader inden for 7 dage.
5. Når planter dækket af et voksagtigt lag (f.eks. kål) sprøjtes ind i væsken brug, tilsæt et befugtningsmiddel.
6. Ved påføring af midlet må følgende ikke undgås:  
– at sprøjtevæsken drives ned på tilstødende afgrødeplantager – at sprøjtevæsken overlapper hinanden ved krydsninger mellem behandlingsfelter og forager.

#### TILBEREDNING AF BRUGSBARE VÆSKE

Før du begynder at tilberede den brugbare væske, skal du bestemme den nøjagtige mængde, der er nødvendig. Ryst indholdet af pakken før brug. Hæld den afmålte mængde i sprøjtetanken, der er delvist fyldt med vand (med omrøreren tændt).

Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og hæld skyllevæsken i sprøjtes arbejdsvæsketank. Fyld derefter sprøjtetanken op med vand til den ønskede mængde. Sprøjt med omrøreren aktiveret. Efter at produktet er hældt i sprøjtetanken, blandes væsken mekanisk i tanken, hvis sprøjten ikke er udstyret med en hydraulisk omrører. Hvis sprøjtningen afbrydes, blandes arbejdsvæsken grundigt i sprøjtetanken, før arbejdet genoptages.

#### HÅNDTERING AF BRUGBARE VÆSKERESTER OG RENGØRING AF UDSKYR

Rester af arbejdsvæsken efter behandlingen skal håndteres på en måde, der begrænser risikoen for forurening af overflade- og grundvand i henhold til vandlovgivningens bestemmelser og jordforurening, dvs.: – efter forudgående

fortynding, anvendelse på den overflade, hvorpå behandlingen er udført, hvis det er muligt, eller – bortskaffelse ved hjælp af tekniske

løsninger, der sikrer biologisk

nedbrydning af de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller – bortskaffe på anden måde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Vask udstyret grundigt efter arbejdet.

Hvis udstyret vaskes med rengøringsmidler, der er beregnet til dette formål, skal de resulterende skylninger håndteres i overensstemmelse med den medfølgende anvisning til rengøringsmidlet.

#### BETINGELSER FOR SIKKER BRUG AF AGENTET

Før produktet tages i brug, skal alle interesserede parter, der kan blive udsat for sprøjteeffekten, og som har anmodet om sådanne oplysninger, informeres.

#### Forholdsregler for personer, der bruger produktet, og arbejdstagere:

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Undgå at indånde sprøjtetågen.

Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj for at beskytte mod eksponering for plantebeskyttelsesmidler.

#### Miljømæssige forholdsregler:

Forurens ikke vand med plantebeskyttelsesmidlet eller dets emballage.

Vask ikke udstyr i nærheden af overfladevand.

Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter fra landbrug og veje.

Meget giftig for bier (i tilfælde af engangsbrug i vækstsæsonen ved en dosis lig med eller højere end 0,2 l/ha eller gentagen brug i vækstsæsonen ved en dosis lig med eller højere end 0,125 l/ha).

#### I tilfælde af sukkerroedyrkning

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb med en bredde på: – 5 m med samtidig brug af

sprøjtemidler, der reducerer væskeafdrift

brugbart område under behandlingen med 50%  
eller

– 10 m fra reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Ved en enkelt anvendelse med en dosis på 0,2 l/ha: Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier søger føde (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før forebyggelsesperioden er slut.

Ved en enkelt anvendelse med en dosis under 0,2 l/ha: Farlig for bier. Brug produktet uden for perioder med biaktivitet.

#### Ved dyrkning af vinterhvede og vårbyg:

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Ved to anvendelser i løbet af vækstsæsonen med en dosis på 0,125 l/ha: Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier fouragerer (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før forebyggelsesperioden er slut.

Ved anvendelse i en dosis under 0,125 l/ha: Farlig for bier.  
Brug produktet uden for perioder med biaktivitet.

#### I tilfælde af kartoffeldyrkning

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 10 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Ved to anvendelser i løbet af vækstsæsonen med en mængde på 0,125 l/ha eller derover: Farlig for bier.

For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier søger føde (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før forebyggelsesperioden er slut.

Ved brug af produktet i en dosis under 0,125 l/ha:

Farlig for bier. Bruges uden for perioder med biaktivitet.

#### Ved dyrkning af vinterraps og forårsraps:

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 10 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Ved gentagne anvendelser i vækstsæsonen med en dosis lig med eller højere end 0,125 l/

ha, produktet er farligt for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier søger føde (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før forebyggelsesperioden er slut.

Ved anvendelse i en dosis under 0,125 l/ha: Farlig for bier.

Brug produktet uden for perioder med biaktivitet.

Ved dyrkning af hvidkål, rødkål, kinakål, broccoli, blomkål, gulerødder, bønner dyrket til friske frø, bønner dyrket til tørrede frø, ærter dyrket til friske frø, ærter dyrket til tørrede frø, løg dyrket fra såning, løg dyrket fra kimplanter, løg dyrket fra forårsløg: For at beskytte vandlevende organismer er det

nødvendigt at udpege en beskyttelseszone på 5 m i bredden fra reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Ved gentagen anvendelse i vækstsæsonen med en dosis på 0,15 l/ha: Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier søger føde (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før den forebyggende periode er afsluttet.

Ved anvendelse i en dosis under 0,125 l/ha: Farlig for bier.

Brug produktet uden for perioder med biaktivitet.

#### Ved dyrkning af æble-, blomme-, kirsebær- og surkirsebærtræer:

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 50 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 30 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier får deres nektar (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før den forebyggende periode er slut.

Ved dyrkning af solbær, rødbær og hvidbær, blåbær, aronia, hindbær og brombær: For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt

at udpege en beskyttelseszone på 50 m i bredden fra reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 15 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier får deres nektar (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før den forebyggende periode er slut.

#### Når man dyrker jordbær:

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege: – en 5 m bred beskyttelseszone med samtidig brug af sprøjter, der reducerer afdriften af arbejdsvæsken under behandling med 50 % eller – en 10 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og

vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier får deres nektar (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før den forebyggende periode er slut.

#### Til tomatdyrkning:

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 10 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Ved to anvendelser i løbet af vækstsæsonen: Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må det ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier søger føde (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før den forebyggende periode er slut.

#### I tilfælde af rosendyrkning

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en 20 m bred beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb.

For at beskytte leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt at udpege en 15 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

Ved to anvendelser i løbet af vækstsæsonen i en koncentration på 0,025%: Farlig for bier. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må produktet ikke anvendes på afgrøder under blomstring. Må ikke anvendes i områder, hvor bier søger føde (honningdug). Må ikke anvendes, når der er blomstrende ukrudt. Må ikke anvendes på planter, der kan begynde at blomstre, før forebyggelsesperioden er slut.

Perioden fra midlets påføring til den dag, hvor mennesker og dyr må betræde det område, hvor midlet blev påført (forebyggelsesperiode): Gå ikke ind, før væsken er helt tørret på plantens overflade.

Forebyggende periode mod bier (antiforgiftningsperiode):

I tilfælde af en enkelt anvendelse af produktet i vækstsæsonen med en dosis lavere end 0,2 l/ha eller flere anvendelser af produktet i vækstsæsonen med en dosis lavere end 0,125 l/ha: ikke relevant

I tilfælde af en enkelt anvendelse af produktet i vækstsæsonen med en dosis lig med eller højere end 0,2 l/ha eller flere anvendelser af produktet i vækstsæsonen med en dosis lig med eller højere end 0,125 l/ha: 24 timer.

Periode fra sidste påføring af midlet til dagen for høst af afgrøden (tilbageholdelsesperiode): Jordbær, tomat - 3 dage.

Kartoffel, æble, blomme, surkirsebær, sødkirsebær, solbær, ribs, hvide ribs, aronia, blåbær, hindbær, brombær, hvidkål, rødkål, kinakål, broccoli, blomkål, gulerod, bønner dyrket til friske frø, bønner dyrket til tørrede frø, ærter dyrket til friske frø, ærter dyrket til tørrede frø, løg dyrket fra såning, løg dyrket fra kimplanter, løg dyrket fra forårsløg – 7 dage.

Sukkerroer, vinterhvede, vårbyg - 30 dage.

Forårsraps, vinterraps - 45 dage.

Rose - ikke relevant.

Periode fra sidste anvendelse af produktet på planter beregnet til foder indtil den dag, hvor dyr må fodres med disse planter (tilbageholdelsestid for foder): Ikke relevant.

Periode fra sidste anvendelse af produktet til den dag, hvor følgende afgrøder kan sås eller plantes: Ikke relevant.

#### BETINGELSER FOR OPBEVARING OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF BESKYTTELSESMIDLET PLANTER OG EMBALLAGE

Opbevares utilgængeligt

for børn. Opbevar plantebeskyttelsesmidlet: ÿ på

steder eller i faciliteter, hvor der er implementeret passende foranstaltninger til beskyttelse mod miljømæssige

kontaminering og adgang fra tredjeparter, ÿ i originalemballagen, på en måde der forhindrer kontakt med mad og drikkevarer.

eller fodre, i en tæt lukket beholder, ved en temperatur på 0°C - 30°C.

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle farligt affald.

Returner tomme beholdere, der indeholder farlige plantebeskyttelsesmidler, til sælgeren.

FØRSTEHJÆLP Modgift:

ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Ved indtagelse, undgå at fremkalde opkastning, søg straks lægehjælp og vis emballagen eller etiketten.

Gyldighedsperiode - 3 år

Produktionsdato - .....

Netindhold - .....

Batchnummer - ...