

Allegato alla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - MRiRW n. R-369/2016d del 21 luglio 2016 che modifica l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-9/2012 del 12 gennaio 2012.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer

SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lione, Repubblica francese, tel.: +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36

Ente che introduce il prodotto fitosanitario nel territorio della Repubblica di Polonia: Bayer Sp. z oo, Al.

Jerozolimskie 158, 02-326 Varsavia, tel.: 22 572 36 20, fax: 22 572 35 00

Ente responsabile del confezionamento finale e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario: AGROPAK Sp. j., Brzeziński i

Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl,

TARGET SA, Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90, fax: +48 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl

DECISMEGA 50 EW

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali.

Contenuto del principio attivo: deltametrina

(un composto del gruppo dei piretroidi) – 50 g/l (4,80%).

Autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R-9/2012 del 12 gennaio 2012 modificato dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-241/2012d del 3 Ottobre 2012, con decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-526/2015d del 18 giugno 2015 e dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-369/2016d del 21 luglio 2016.



Pericolo

H301 - Tossico se ingerito.

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H319 - Provoca grave irritazione oculare.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P301 + P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.

DESCRIZIONE DI

AZIONE: Decis Mega 50 EW è un insetticida concentrato in emulsione acquosa, ad azione per contatto e per ingestione, studiato per il controllo di parassiti pungenti e pungitori-succhiatori di piante agricole, frutticole, orticole e ornamentali. Agisce sulla superficie della pianta. Progettato per l'uso con irroratrici semoventi o portate su trattore, irroratrici semoventi o portate su trattore per frutteto e irroratrici manuali.

RICHIESTA DELL'AGENTE

PIANTE AGRICOLE

Barbabietola

Mszyca burakowa

Dose massima per singola applicazione: 0,2 l/ha.
Dose raccomandata per uso singolo: 0,1 - 0,2 l/ha.

Data di applicazione: Applica

non appena gli afidi alati infestano le piante, prima che appaiano le colonie.

Numero di trattamenti: 1.

Altica della barbabietola, altica della barbabietola

Dose massima per singola applicazione: 0,2 l/ha.
Dose raccomandata per uso singolo: 0,1 - 0,2 l/ha.

Periodo di applicazione:

Applicare quando compaiono i primi coleotteri o quando si notano i primi danni.

Numero di trattamenti:

1. Leggermente complicato

Dose massima per singola applicazione: 0,2 l/ha.
Dose raccomandata per uso singolo: 0,1 - 0,2 l/ha.

Data di applicazione: Applica

subito dopo la comparsa dei primi sintomi del parassita (solitamente nella fase delle 2-4 foglie della barbabietola).

Numero di trattamenti: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Grano invernale, orzo primaverile

Afidi

Dose massima per singola applicazione: 0,125 l/ha.
Dose raccomandata per uso singolo: 0,1 - 0,125 l/ha.

Periodo di

applicazione: applicare dopo la spigatura, ma non oltre il periodo di maturazione lattiginosa del chicco.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Equiseti

Dose massima per singola applicazione: 0,125 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 0,1 - 0,125 l/ha.

Data di applicazione:

Utilizzare a partire dall'inizio della schiusa delle larve.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Patata

Larve e coleotteri della dorifera della patata.

Dose massima per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 0,1 - 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Applica

dopo un'infestazione da parassiti. Utilizzare la dose più elevata raccomandata per controllare i coleotteri e in caso di crescita rigogliosa delle patate.

Quantità d'acqua consigliata: 150-400 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 7 giorni.

colza invernale

Moscerino della colza

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Applica

dopo la comparsa delle giovani larve, quando il numero medio di larve è: 1 larva per 1 pianta (su colza invernale in autunno).

Il punteruolo della rapa

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione:

applicare come indicato, prima che gli scarabei depongano le uova.

Quantità d'acqua consigliata: 300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Colza invernale, colza primaverile

Altiche, altiche della colza.

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare quando compaiono coleotteri sulle giovani piante o quando si notano i primi danni.

Coleottero del polline della colza (il trattamento contro il coleottero del polline combatte anche il punteruolo a quattro denti)

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,1 l/ha.

Data di applicazione: Applica

secondo le indicazioni dopo la comparsa dei coleotteri sulle piante nella fase di infiorescenza compatta, al più tardi nella fase di infiorescenza lasca.

Parassiti del baccello (minatrice fogliare del cavolo, minatrice fogliare del cavolo)

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Periodo di applicazione:

Eseguire il trattamento all'inizio della caduta dei petali del fiore.

Afide del cavolo

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Periodo di applicazione:

Applicare quando compaiono le prime colonie di afidi.

Quantità d'acqua consigliata: 300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Nella colza invernale, il numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita è 3.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14-21 giorni.

Si consiglia di effettuare un massimo di 3 trattamenti, di cui 1 in autunno e 2 in primavera.

Nella colza primaverile, il numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita è 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

PIANTE DA FRUTTO

Melo

falena dei fiori di melo

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Quando usare: applicare

poco prima o durante il germogliamento sui meli. Applicare nelle giornate soleggiate, a temperature di almeno 120°C.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Afide del melo

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione:

applicare dopo la comparsa delle prime colonie di afidi.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500-750 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Prugna

Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione:

applicare dopo la comparsa delle prime colonie di afidi.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500-750 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nel resto dell'etichetta: 2.

Ribes nero

Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione:

applicare dopo la comparsa delle prime colonie di afidi.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500-750 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nel resto dell'etichetta: 2.

Fragola

fiore di lampone

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Periodo di

applicazione: applicare prima della fioritura, nel periodo in cui compaiono i coleotteri.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500-750 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nel resto dell'etichetta: 2.

PIANTE VEGETALI

Pomodoro coltivato nel terreno

Dorifora della patata

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Periodo di applicazione: Utilizzo

durante il periodo di emersione degli scarabei o di schiusa delle larve.

Quantità d'acqua consigliata: 600 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

cavolo bianco

Cavolo cappuccio bianco, cavolo cappuccio bianco

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Periodo di applicazione:

Utilizzare durante il periodo di schiusa dei bruchi.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 600 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nel resto dell'etichetta: 2.

PIANTE ORNAMENTALI

Rosa (nel terreno)

Afide della rosa

Concentrazione massima per uso singolo: 0,025% (25 ml di agente in 100 l di acqua).

Concentrazione raccomandata per uso singolo: 0,015-0,025% (15-25 ml di agente in 100 l di acqua).

Data di applicazione: applicare

dopo aver notato la presenza del parassita.

Tramoggia color rosa

Concentrazione massima per uso singolo: 0,025% (25 ml di agente in 100 l di acqua).

Concentrazione raccomandata per uso singolo: 0,015-0,025% (15-25 ml di agente in 100 l di acqua).

Data di applicazione: applicare

dopo aver confermato la presenza del parassita.

Quantità di liquido di lavoro consigliata: 1000 l/ha.

Spruzzatura consigliata: gocce medie

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 – 21 giorni.

APPLICAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE COLTURE E APPLICAZIONI SU PICCOLE AREE

**L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'efficacia e della fitotossicità di un prodotto fitosanitario.
prodotto utilizzato in colture minori.**

PIANTE DA FRUTTO

Ribes nero

Tortrice dal groppone rosa

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione:

Spruzzare dopo la comparsa del parassita, dalla fase di dispiegamento della prima foglia fino alla fine della fase di fioritura (BBC 11-69).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nella parte precedente dell'etichetta: 2.

Ribes rosso, ribes bianco, mirtillo rosso

Afidi, tortrice delle rose

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa del parassita, dalla fase di dispiegamento della prima foglia fino alla fine della fase di fioritura (BBC 11-69).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Aronia

Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione:

Spruzzare dopo la comparsa delle prime colonie, dalla fase di dispiegamento della prima foglia fino alla fine della fase di fioritura (BBCH 11-69).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Trivellatore del sorbo

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione: Il

il trattamento deve essere effettuato in primavera, quando il parassita si nutre delle infiorescenze, divorando i boccioli dei fiori, nella fase che va dall'inizio dello sviluppo dell'infiorescenza alla fine della fase di fioritura (BBCH 51-69).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Lampone, mora

Afidi, *Drosophila suzukii* (*drosophila alata maculata*), cecidomia del lampone, ala chiara del lampone

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Periodo di applicazione:

Spruzzare dopo la comparsa delle prime colonie di afidi, dalla fine della fase di fioritura fino alla fine della fase avanzata di maturazione dei frutti (BBCH 68-85).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Fragola

Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa delle prime colonie di afidi dalla fine della fase di sviluppo dei germogli stolonali all'inizio della fase di maturazione dei frutti (BBCH 49-81).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Drosophila suzukii (*drosophila alata maculata*), tortrice alata rosa e altre tortrici, alternative

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa del parassita, dalla fine della fase di sviluppo dei germogli fino all'inizio della fase di maturazione dei frutti (BBCH 49-81).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 300-600 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nella parte precedente dell'etichetta: 2.

Prugna

Drosophila suzukii (mosca alata maculata)

Dose massima per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Dose raccomandata per singola applicazione: 0,15-0,25 l/ha.

Data di applicazione: Il

il trattamento deve essere effettuato 3-4 giorni dopo la cattura con trappole a feromoni o adesive, dalla fase di crescita delle gemme del frutto fino alla fine della fase in cui il frutto è maturo per il consumo (BBCH 76-89).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Corpo fruttifero a corna gialle, corpo fruttifero leggero

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare dopo la cattura con trappole adesive, nella fase finale della caduta dei petali dei fiori (BBCH 67-69).

Dose massima per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Dose raccomandata per singola applicazione: 0,15-0,25 l/ha.

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500-750 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nella parte precedente dell'etichetta: 2.

Ciliegia, ciliegia dolce

Afidi

Dose massima per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 0,15 - 0,25 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa delle prime colonie di afidi, dall'inizio della fase di crescita del germoglio principale fino alla fine della fase in cui il frutto è maturo per il consumo (BBCH 31-89).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Mosca della frutta della ciliegia, *Drosophila suzukii* (mosca della frutta alata maculata)

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,25 l/ha.

Data di applicazione: II

il trattamento deve essere effettuato 3-4 giorni dopo la cattura con trappole a feromoni o adesive, quando il frutto raggiunge il 60-90% della sua dimensione tipica (BBCH 76-79).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500-750 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

PIANTE VEGETALI

Afidi del cavolo bianco

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa delle prime colonie di afidi, dall'inizio della fase di sviluppo netto della prima foglia fino alla fine della fase di sviluppo delle parti della pianta destinate alla raccolta (BBCH 11-49).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 600 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita, tenendo conto dell'uso del prodotto indicato nella parte precedente dell'etichetta: 2.

Cavolo rosso, broccoli, cavolfiore, cavolo cinese Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa delle prime colonie di afidi, dall'inizio della fase di sviluppo netto della prima foglia fino alla fine della fase di sviluppo delle parti della pianta destinate alla raccolta (BBCH 11-49).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 600 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Carota

Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione:

Spruzzare dopo la comparsa delle prime colonie di afidi, dall'inizio della fase della prima foglia chiaramente sviluppata fino alla fine della fase in cui la radice raggiunge le sue dimensioni e forma tipiche (BBCH 11-49).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Mosca della carota Massimo/

dose raccomandata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la raccolta su tavolette adesive, dall'inizio della fase di prima foglia chiaramente sviluppata fino alla fine della fase in cui la radice raggiunge la sua dimensione e forma tipiche (BBCH 11-49).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 500 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Piselli da campo coltivati per seme fresco, piselli da campo coltivati per seme secco)

Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa delle prime colonie di afidi, dall'inizio della fase di sviluppo netto della prima foglia fino all'inizio della fase di sviluppo dell'infiorescenza (BBCH 11-49).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

baccello di pisello

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Periodo di applicazione: spruzzare dopo la comparsa del parassita

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 200-800 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Fagioli coltivati per semi freschi, fagioli coltivati per semi secchi

Afidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la comparsa delle prime colonie di afidi, dall'inizio della fase di sviluppo netto della prima foglia fino all'inizio della fase di sviluppo dell'infiorescenza (BBCH 11-49).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 200-800 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Cipolle coltivate dai semi, cipolle coltivate dalle piantine, cipolle coltivate dalla primavera

cipolle.

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione:

Spruzzare dopo la raccolta utilizzando trappole profumate o a feromoni, dall'inizio della prima fase fogliare chiaramente visibile fino alla fine della fase di sviluppo delle parti della pianta destinate alla raccolta (BBCH 11-49).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Tripidi

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 0,15 l/ha.

Data di applicazione: Spray

dopo la cattura tramite trappole adesive, dall'inizio della prima fase fogliare chiaramente visibile fino alla fine della fase di sviluppo delle parti della pianta destinate alla raccolta (BBCH 11-49).

Numero di trattamenti: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 14 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 200-800 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

**PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI D'USO RELATIVE AL BUON
PRATICA AGRICOLA**

1. Se sono necessari più trattamenti, utilizzare alternativamente insetticidi raccomandati da altri gruppi chimici.
2. L'agente agisce più efficacemente a temperature inferiori a 20°C. A temperature più elevate eseguire i trattamenti alla fine della giornata.
3. In caso di controllo dei parassiti (in particolare dei parassiti pungenti-succhiatori), il trattamento deve essere eseguito accuratamente in modo che tutte le parti delle piante siano coperte dal liquido di lavorazione.
4. Prima di utilizzare il prodotto sulle piante ornamentali, effettuare un trattamento di prova su ogni varietà coltivata per la prima volta per verificare se si sono manifestati sintomi di danneggiamento delle piante entro 7 giorni.
5. Quando si spruzzano piante ricoperte da un rivestimento ceroso (ad esempio cavolo) nel liquido utilizzare, aggiungere un agente bagnante.
6. Durante l'applicazione dell'agente, evitare che: – il liquido di applicazione si riversi sulle piantagioni di colture adiacenti – il liquido di applicazione si sovrapponga alle giunzioni delle strisce di trattamento e delle capezzagne.

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO

UTILIZZABILE Prima di iniziare a preparare il liquido utilizzabile, determinare esattamente la quantità necessaria. Agitare il contenuto della confezione prima dell'uso. Versare la quantità misurata nel serbatoio dello spruzzatore parzialmente riempito con acqua (con l'agitatore acceso).

Sciacquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e versare il liquido di risciacquo nel serbatoio del fluido di lavoro dell'irroratrice. Quindi, rabboccare il serbatoio dell'irroratrice con acqua fino al volume richiesto. Spruzzare con l'agitatore inserito. Dopo aver versato il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mescolare meccanicamente il liquido nel serbatoio se l'irroratrice non è dotata di agitatore idraulico. In caso di interruzione dell'irrorazione, mescolare accuratamente il fluido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

GESTIONE DEI RESIDUI LIQUIDI UTILIZZABILI E PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

I resti del liquido di lavoro dopo il trattamento devono essere trattati in modo da limitare il rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee ai sensi delle disposizioni della legge sulle acque e di contaminazione del suolo, vale a dire: –

dopo la diluizione preventiva, utilizzare sulla superficie su cui è stato effettuato il trattamento, se possibile, oppure – smaltiti utilizzando

soluzioni tecniche che garantiscano la protezione biologica.

degradazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, oppure – smaltire in altro modo conformemente alle norme sui rifiuti.

Lavare accuratamente l'attrezzatura dopo il lavoro.

Se l'attrezzatura viene lavata utilizzando detergenti destinati a questo scopo, i risciacqui risultanti devono essere gestiti secondo le istruzioni fornite con il detergente.

CONDIZIONI PER L'USO SICURO DELL'AGENTE

Prima di utilizzare il prodotto, tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva dello spray e che hanno richiesto tali informazioni devono essere informate.

Precauzioni per le persone che utilizzano il prodotto e per i lavoratori:

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Non inalare la nebbia dello spray.

Utilizzare guanti e indumenti protettivi per proteggersi dall'esposizione ai prodotti fitosanitari.

Precauzioni ambientali:

Non contaminare l'acqua con il prodotto fitosanitario o con la sua confezione.
Non lavare l'attrezzatura in prossimità di acque superficiali.
Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i fossi di drenaggio delle aziende agricole e delle strade.

Molto tossico per le api (in caso di uso singolo durante la stagione di crescita a una dose pari o superiore a 0,2 l/ha o usi multipli durante la stagione di crescita a una dose pari o superiore a 0,125 l/ha).

Nel caso della coltivazione della barbabietola da zucchero

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario designare una zona di protezione dai bacini e dai corsi d'acqua con una larghezza di: – 5 m con l'uso simultaneo di

spruzzi che riducano la deriva dei liquidi

o superficie utilizzabile durante il trattamento del 50%

– 10 m da bacini e corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

In caso di singola applicazione alla dose di 0,2 l/ha: Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare in aree in cui le api sono in cerca di cibo (melata). Non applicare in presenza di infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo di prevenzione.

In caso di singola applicazione a dose inferiore a 0,2 l/ha: Pericoloso per le api. Utilizzare il prodotto al di fuori dei periodi di attività delle api.

Nel caso della coltivazione di grano invernale e orzo primaverile:

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 5 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

Se applicato due volte durante la stagione di crescita alla dose di 0,125 l/ha: Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare nelle aree in cui le api sono in cerca di cibo (melata). Non applicare in presenza di infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo di prevenzione.

Se utilizzato a una dose inferiore a 0,125 l/ha: pericoloso per le api.
Utilizzare il prodotto al di fuori dei periodi di attività delle api.

Nel caso della coltivazione della patata

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 10 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

Se applicato due volte durante la stagione di crescita a una velocità pari o superiore a 0,125 l/ha: pericoloso per le api.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare il prodotto sulle colture durante la fioritura. Non applicare nelle aree di bottinamento delle api (melata). Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo di prevenzione.

Quando si utilizza il prodotto a una dose inferiore a 0,125 l/ha:

Pericoloso per le api. Usare al di fuori dei periodi di attività delle api.

Nel caso di coltivazione di colza invernale e primaverile:

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 10 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

In caso di applicazioni ripetute durante la stagione vegetativa a dose pari o superiore a 0,125 l/

Ah, il prodotto è pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare in aree in cui le api sono in cerca di cibo (melata). Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo di prevenzione.

Se utilizzato a una dose inferiore a 0,125 l/ha: pericoloso per le api.

Utilizzare il prodotto al di fuori dei periodi di attività delle api.

Quando si coltivano cavolo bianco, cavolo rosso, cavolo cinese, broccoli, cavolfiori, carote, fagioli coltivati per semi freschi, fagioli coltivati per semi secchi, piselli coltivati per semi freschi, piselli coltivati per semi secchi, cipolle coltivate dalla semina, cipolle coltivate da piantine, cipolle coltivate da cipollotti: per proteggere gli organismi acquatici, è

necessario designare una zona di protezione larga 5 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

In caso di applicazioni ripetute durante la stagione vegetativa alla dose di 0,15 l/ha: Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare nelle aree di bottinamento delle api (melata). Non applicare in presenza di infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo preventivo.

Se utilizzato a una dose inferiore a 0,125 l/ha: pericoloso per le api.

Utilizzare il prodotto al di fuori dei periodi di attività delle api.

Nel caso di coltivazione di meli, susini, ciliegi e amareni:

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 50 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 30 m dalle aree non agricole.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare nelle aree in cui le api ricavano il nettare (melata). Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo preventivo.

Nel caso di coltivazione di ribes nero, ribes rosso e ribes bianco, mirtillo rosso, aronia, lampone, mora: per proteggere gli organismi

acquatici, è necessario designare una zona di protezione larga 50 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 15 m dalle aree non agricole.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare nelle aree in cui le api ricavano il nettare (melata). Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo preventivo.

Quando si coltivano le fragole:

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario designare: – una zona di protezione larga 5 m con l'impiego simultaneo di irroratori che riducano la deriva del liquido di lavoro durante l'azione
trattamento del 50% o – una zona di protezione larga 10 m dai bacini e

corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare nelle aree in cui le api ricavano il nettare (melata). Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo preventivo.

Per la coltivazione del pomodoro:

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 10 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

Se applicato due volte durante la stagione di crescita: pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare in aree in cui le api sono in cerca di cibo (melata). Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo preventivo.

Nel caso della coltivazione delle rose

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 20 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 15 m dalle aree non agricole.

Se applicato due volte durante la stagione di crescita a una concentrazione dello 0,025%: Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori, non applicare sulle colture durante la fioritura. Non applicare in aree in cui le api sono in cerca di cibo (melata). Non applicare in presenza di erbe infestanti in fiore. Non applicare su piante che potrebbero iniziare a fiorire prima della fine del periodo di prevenzione.

Periodo che va dall'applicazione dell'agente al giorno in cui persone e animali possono accedere all'area in cui è stato applicato l'agente (periodo di prevenzione): non entrare finché il liquido non si è completamente asciugato sulla superficie della pianta.

Periodo preventivo per le api (periodo anti-avvelenamento):

Nel caso di un'unica applicazione del prodotto durante la stagione di crescita a una dose inferiore a 0,2 l/ha o di applicazioni multiple del prodotto durante la stagione di crescita a una dose inferiore a 0,125 l/ha: non applicabile

Nel caso di un'unica applicazione del prodotto durante la stagione di crescita a una dose pari o superiore a 0,2 l/ha o di applicazioni multiple del prodotto durante la stagione di crescita a una dose pari o superiore a 0,125 l/ha: 24 ore.

Periodo dall'ultima applicazione dell'agente al giorno della raccolta della coltura (periodo di sospensione): Fragola, pomodoro - 3 giorni.

Patata, mela, prugna, amarena, ciliegia dolce, ribes nero, ribes rosso, ribes bianco, aronia, mirtillo rosso, lampone, mora, cavolo cappuccio bianco, cavolo cappuccio rosso, cavolo cinese, broccoli, cavolfiore, carota, fagioli coltivati per semi freschi, fagioli coltivati per semi secchi, piselli coltivati per semi freschi, piselli coltivati per semi secchi, cipolle coltivate dalla semina, cipolle coltivate dalle piantine, cipolle coltivate dai cipollotti - 7 giorni.

Barbabietola da zucchero, frumento invernale, orzo primaverile - 30 giorni.

Colza primaverile, colza invernale - 45 giorni.

Rosa - non applicabile.

Periodo compreso tra l'ultima applicazione del prodotto alle piante destinate all'alimentazione animale e il giorno in cui gli animali possono essere nutriti con tali piante (tempo di sospensione per l'alimentazione animale): Non applicabile.

Periodo compreso tra l'ultima applicazione del prodotto e il giorno in cui le seguenti colture possono essere seminate o piantate: Non applicabile.

CONDIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO SICURO DELL'AGENTE PROTETTIVO IMPIANTI E IMBALLAGGI

Tenere fuori dalla portata

dei bambini. Conservare il prodotto fitosanitario: γ in

luoghi o strutture in cui sono state attuate misure appropriate per la protezione dagli agenti atmosferici.

contaminazione e accesso da parte di terzi, γ nella confezione originale, in modo da impedire contatto con alimenti e bevande.

oppure somministrare in un contenitore ben chiuso, a una temperatura compresa tra 0°C e 30°C.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Restituire al venditore i contenitori vuoti contenenti prodotti fitosanitari pericolosi.

PRIMO SOCCORSO Antidoto:

nessuno, trattare in modo sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

In caso di ingestione, non provocare il vomito, consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione o l'etichetta.

Periodo di validità - 3 anni

Data di produzione -

Contenuto netto -

Numero di lotto -