

Bijlage bij het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - MRiRW nr. R-369/2016d van 21 juli
Wijziging van de vergunning nr. R-9/2012 van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van 12 januari 2012, 2016.

Vergunninghouder: Bayer

SAS, Rue Jean-Marie Leclair 16, CP106, 69266 Lyon, Frankrijk, tel.: +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36

Entiteit die het gewasbeschermingsmiddel in de Republiek Polen introduceert: Bayer Sp. z oo, Al.

Jerozolimskie 158, 02-326 Warschau, tel.: 22 572 36 20, fax: 22 572 35 00

Verantwoordelijke voor de uiteindelijke verpakking en etikettering van het gewasbeschermingsmiddel: AGROPAK Sp. j., Brzeziński i

Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl,

TARGET SA, Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90, fax: +48 58 676 74 89, e-mail:
info@target.com.pl

DECISMEGA 50 EW

Het product is bedoeld voor professioneel gebruik.

Actieve stof: deltamethrin


(een verbinding uit de pyrethroidengroep) – 50 g/l (4,80%).

Vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-9/2012 van 12 januari

2012 gewijzigd door het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-241/2012d van 3

Oktober 2012, bij besluit nr. van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

R-526/2015d van 18 juni 2015, en door het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-369/2016d van 21 juli 2016.



Gevaar

H301 - Giftig bij inslikken.

H315 – Veroorzaakt huidirritatie.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 - Zeer giftig voor waterorganismen met langdurige gevolgen.

EUH 401 - Om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden, dient u de gebruiksaanwijzing te volgen.

P280 – Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming.

P301 + P310 - BIJ INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P391 – Verzamel gemorste vloeistof.

BESCHRIJVING VAN

WERKING: Decis Mega 50 EW is een insecticide in de vorm van een waterige emulsieconcentraat met contact- en maagwerking, ontworpen voor de bestrijding van bijtende en zuigende insectenplagen in landbouwgewassen, fruit-, groente- en sierplanten. Het werkt op het plantoppervlak. Ontworpen voor gebruik met zelfrijdende of op een tractor gemonteerde veldsproeiers, zelfrijdende of op een tractor gemonteerde boomgaardsproeiers en handsproeiers.

AANVRAAG VAN DE AGENT

LANDBOUWPLANTEN

Suikerbiet

Mszyca burakowa

Maximale dosering per toepassing: 0,2 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 0,1 - 0,2 l/ha.

Aanmeldingsdatum: Aanmelden

zodra gevleugelde bladluizen de planten bewonen, voordat er kolonies verschijnen.

Aantal behandelingen: 1.

Bietenbladkever, bietenbladkever

Maximale dosering per toepassing: 0,2 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 0,1 - 0,2 l/ha.

Aanvraagperiode:

Aanbrengen zodra de eerste kevers verschijnen of de eerste schade wordt opgemerkt.

Aantal behandelingen:

1. Lichte complicatie

Maximale dosering per toepassing: 0,2 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 0,1 - 0,2 l/ha.

Aanmeldingsdatum: Aanmelden

onmiddellijk nadat de eerste symptomen van de plaag verschijnen (meestal in het 2-4 bladstadium van de biet).

Aantal behandelingen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Wintertarwe, zomergerst

Bladluizen

Maximale dosering per toepassing: 0,125 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 0,1 - 0,125 l/ha.

Toepassingsperiode:

Toepassen na de aarvorming, maar uiterlijk tijdens de periode van melkrijpheid van het graan.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Paardenstaarten

Maximale dosering per toepassing: 0,125 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 0,1 - 0,125 l/ha.

Toepassingsdatum:

Gebruiken vanaf het moment dat de larven uitkomen.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Aardappel

Larven en kevers van de Coloradokever.

Maximale dosering per toepassing: 0,15 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 0,1 - 0,15 l/ha.

Aanmeldingsdatum: Aanmelden

Na een plaag. Gebruik de hogere aanbevolen dosis om kevers te bestrijden en in geval van weelderige aardappelgroei.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 150-400 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 7 dagen.

Winterkoolzaad

Koolzaadmug

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Aanmeldingsdatum: Aanmelden

na het verschijnen van de jonge larven, wanneer het gemiddelde aantal larven is: 1 larve per 1 plant (bij winteraapzaad in de herfst).

De raapkever

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum:

Aanbrengen zoals aangegeven, voordat de kevers hun eieren leggen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Winterraapzaad, voorjaarsraapzaad

Aardvlooien, koolzaadaardvlooien.

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Aanvraagdatum:

Gebruik dit middel wanneer kevers op jonge planten verschijnen of wanneer de eerste schade zichtbaar is.

Koolzaadpollenkever (behandeling tegen de koolzaadpollenkever bestrijdt ook de viertandige snuitkever)

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,1 l/ha.

Aanmeldingsdatum: Aanmelden

volgens de aanwijzingen na het verschijnen van kevers op planten in het stadium van de compacte bloeiwijze, uiterlijk in het stadium van de losse bloeiwijze.

Peulplagen (koolmineermot, koolmineermot)

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Aanvraagperiode:

Voer de behandeling uit zodra de bloemblaadjes beginnen te vallen.

Koolbladluis

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Aanvraagperiode:

Aanbrengen zodra de eerste bladluizenkolonies verschijnen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Bij winterkoolzaad is het maximale aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 3.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14-21 dagen.

Het wordt aanbevolen om maximaal 3 behandelingen uit te voeren, waaronder 1 behandeling in de herfst en 2 behandelingen in de lente.

Bij voorjaarsraapzaad is het maximale aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

FRUITPLANTEN

Appelboom

Appelbloesemmot

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Wanneer te gebruiken: Aanbrengen

Net voor of tijdens het uitlopen van de knoppen aan de appelbomen. Aanbrengen op zonnige dagen, bij temperaturen van minimaal 120 °C.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Appelbladluis

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum:

Aanbrengen nadat de eerste bladluizenkolonies verschijnen.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500-750 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Pruim

Bladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum:

Aanbrengen nadat de eerste bladluizenkolonies verschijnen.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500-750 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product volgens de rest van het etiket: 2.

Zwarte bes

Bladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum:

Aanbrengen nadat de eerste bladluizenkolonies verschijnen.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500-750 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product volgens de rest van het etiket: 2.

Aardbei

Frambozenbloem

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsperiode:

Aanbrengen vóór de bloei, tijdens de periode dat de kevers verschijnen.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500-750 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product volgens de rest van het etiket: 2.

GROENTEPLANTEN

Tomaten die in de grond worden geteeld

Coloradokever

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsperiode: Gebruik

tijdens de periode waarin de kevers tevoorschijn komen of de larven uitkomen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 600 l/ha.

Aanbevolen sproei-hoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Witte kool

Witte kool, witte kool

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Aanvraagperiode:

Gebruik dit middel tijdens de periode dat de rupsen uitkomen.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 600 l/ha.

Aanbevolen sproei-hoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product volgens de rest van het etiket: 2.

SIERPLANTEN

Roos (in de grond)

Rozenbladluis

Maximale concentratie voor eenmalig gebruik: 0,025% (25 ml van het middel in 100 l water).

Aanbevolen concentratie voor eenmalig gebruik: 0,015-0,025% (15-25 ml van het middel in 100 l water).

Toepassingsdatum: Aanbrengen

nadat u het ongedierte hebt opgemerkt.

Roze trechter

Maximale concentratie voor eenmalig gebruik: 0,025% (25 ml van het middel in 100 l water).

Aanbevolen concentratie voor eenmalig gebruik: 0,015-0,025% (15-25 ml van het middel in 100 l water).

Toepassingsdatum: Aanbrengen

na bevestiging van de aanwezigheid van het ongedierte.

Aanbevolen hoeveelheid werkvloeistof: 1000 l/ha.

Aanbevolen sproei-hoeveelheid: middelgrote druppels

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 tot 21 dagen.

TOEPASSING VAN PLANTAARDIGE BESCHERMINGSMIDDELEN IN GEWASSEN

EN TOEPASSINGEN VOOR KLEINE OPPERVLAKKEN

De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de effectiviteit en fytotoxiciteit van een gewasbeschermingsmiddel.

Product gebruikt in minder gangbare gewassen.

FRUITPLANTEN

Zwarte bes

Roze-stuitige tortrix

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum:

Spuiten nadat het ongedierte verschijnt, vanaf het moment dat het eerste blad zich ontvouwt tot het einde van de bloeiperiode (BBC 11-69).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product zoals vermeld in het vorige deel van het etiket: 2.

Rode bes, witte bes, hoogstam bosbes

Bladluizen, rozenbladroller

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

nadat het ongedierte verschijnt vanaf het moment dat het eerste blad zich ontvouwt tot het einde van de bloeiperiode (BBC 11-69).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Aronia

Bladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum:

Spuiten nadat de eerste kolonies verschijnen, vanaf het moment dat het eerste blad zich ontvouwt tot het einde van de bloeiperiode (BBCH 11-69).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Lijsterbesboorder

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Aanvraagdatum: De

De behandeling moet in het voorjaar plaatsvinden, wanneer het ongedierte zich voedt met bloeiwijzen en bloemknoppen opeet, in de fase van het begin van de bloeiwijzeontwikkeling tot het einde van de bloeiperiode (BBCH 51-69).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Framboos, braam

Bladluizen, *Drosophila suzukii* (geklepte fruitvlieg), frambozenstengelgalmug, frambozenglasvleugel

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Aanvraagperiode:

Spuut na het verschijnen van de eerste bladluiskolonies, vanaf het einde van de bloeiperiode tot het einde van de gevorderde vruchtrijpingsfase (BBCH 68-85).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Aardbei

Bladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het verschijnen van de eerste bladluiskolonies vanaf het einde van de ontwikkelingsfase van de uitlopers tot het begin van de vruchtrijpingsfase (BBCH 49-81).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Drosophila suzukii (geklepte fruitvlieg), rozevleugelbladroller en andere bladrollervlinders, wisselt af

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

nadat het ongedierte verschijnt vanaf het einde van de ontwikkelingsfase van de uitlopers tot het begin van de vruchtrijpingsfase (BBCH 49-81).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 300-600 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product zoals vermeld in het vorige deel van het etiket: 2.

Pruim

Drosophila suzukii (geklepte vlieg)

Maximale dosering per toepassing: 0,25 l/ha.

Aanbevolen dosering per toepassing: 0,15-0,25 l/ha.

Aanvraagdatum: De

De behandeling moet 3-4 dagen na de vangst met feromoon- of kleefvallen worden uitgevoerd, vanaf de groeifase van de vruchtknop tot het einde van de fase waarin de vrucht rijp is voor consumptie (BBCH 76-89).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Geelhoornig vruchtlichaam, licht vruchtlichaam

Aanvraagdatum:

Gebruik na het vangen met kleefvallen, in de laatste fase van het afvallen van de bloemblaadjes (BBCH 67-69).

Maximale dosering per toepassing: 0,25 l/ha.

Aanbevolen dosering per toepassing: 0,15-0,25 l/ha.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500-750 l/ha.

Aanbevolen sproeihoefheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product zoals vermeld in het vorige deel van het etiket: 2.

Kers, zoete kers

Bladluizen

Maximale dosering per toepassing: 0,25 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 0,15 - 0,25 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het verschijnen van de eerste bladluiskolonies, vanaf het begin van de groeifase van de hoofdscheut tot het einde van de fase waarin de vrucht rijp is voor consumptie (BBCH 31-89).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Kersenfruitvlieg, *Drosophila suzukii* (gevlekte fruitvlieg)

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,25 l/ha.

Aanvraagdatum: De

De behandeling moet 3-4 dagen na het vangen met feromoon- of kleefvallen worden uitgevoerd, wanneer het fruit 60-90% van zijn typische grootte heeft bereikt (BBCH 76-79).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500-750 l/ha.

Aanbevolen sproeihoefheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

GROENTEPLANTEN

Witte koolbladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het verschijnen van de eerste bladluiskolonies, vanaf het begin van de duidelijk ontwikkelde eerste bladfase tot het einde van de ontwikkelingsfase van de plantendelen die bestemd zijn voor de oogst (BBCH 11-49).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 600 l/ha.

Aanbevolen sproeihoefheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen, rekening houdend met het gebruik van het product zoals vermeld in het vorige deel van het etiket: 2.

Bladluizen in rode kool, broccoli, bloemkool en Chinese kool.

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het verschijnen van de eerste bladluiskolonies, vanaf het begin van de duidelijk ontwikkelde eerste bladfase tot het einde van de ontwikkelingsfase van de plantendelen die bestemd zijn voor de oogst (BBCH 11-49).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 600 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Wortel

Bladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum:

Spuiten nadat de eerste bladluiskolonies verschijnen, vanaf het begin van de fase waarin het eerste duidelijk ontwikkelde blad verschijnt tot het einde van de fase waarin de wortel zijn typische grootte en vorm bereikt (BBCH 11-49).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Wortelvlieg Maximum/

Aanbevolen dosering voor een eenmalige toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het oogsten op kleefplanken, vanaf het begin van de fase waarin het eerste blad duidelijk ontwikkeld is tot het einde van de fase waarin de wortel zijn typische grootte en vorm bereikt (BBCH 11-49).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 500 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

(velderwten geteeld voor vers zaad, velderwten geteeld voor droog zaad)

Bladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het verschijnen van de eerste bladluiskolonies, vanaf het begin van de duidelijk ontwikkelde eerste bladfase tot het begin van de bloeiwijze-ontwikkelingsfase (BBCH 11-49).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

erwtenpeul

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsperiode: Spuit zodra het ongedierte verschijnt.

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-800 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Bonen geteeld voor verse zaden, bonen geteeld voor gedroogde zaden

Bladluizen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het verschijnen van de eerste bladluiskolonies, vanaf het begin van de duidelijk ontwikkelde eerste bladfase tot het begin van de bloeiwijze-ontwikkelingsfase (BBCH 11-49).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-800 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Uien gekweekt uit zaad, uien gekweekt uit zaailingen, uien gekweekt in de lente uien.

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuit

na de oogst met behulp van geur- of feromoonvallen, vanaf het begin van de duidelijk zichtbare eerste bladfase tot het einde van de ontwikkelingsfase van de voor de oogst bestemde plantendelen (BBCH 11-49).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Tripsen

Maximale/aanbevolen dosis per toepassing: 0,15 l/ha.

Toepassingsdatum: Spuiten

na het vangen met kleefvallen, vanaf het begin van de eerste duidelijk zichtbare bladfase tot het einde van de ontwikkelingsfase van de voor de oogst bestemde plantendelen (BBCH 11-49).

Aantal behandelingen: 2.

Interval tussen behandelingen: minimaal 14 dagen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-800 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

VOORZORGSMATREGELEN EN GEBRUIKSAANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT GOEDE LANDBOUWPRAKTIJK

1. Als er meerdere behandelingen nodig zijn, gebruik ze dan afwisselend.

aanbevolen insecticiden uit andere chemische groepen.

2. Het middel werkt het meest effectief bij temperaturen onder de 20 °C. Bij hogere temperaturen...

Voer de behandelingen aan het einde van de dag uit.

3. In geval van ongediertebestrijding (met name bij zuigende insecten) dient de behandeling te worden uitgevoerd.

Zorgvuldig, zodat alle delen van de planten bedekt zijn met de werkzame vloeistof.

4. Voordat u het product op sierplanten gebruikt, dient u binnen 7 dagen een testbehandeling uit te voeren op elke variëteit die u voor het eerst kweekt. Controleer daarbij of er symptomen van plantenschade zijn opgetreden.

5. Bij het besproeien van planten met een wasachtige laag (bijvoorbeeld kool) in de vloeistof

Gebruik het en voeg een bevochtigingsmiddel toe.

6. Zorg er bij het aanbrengen van het middel voor dat: – de

toepassingsvloeistof niet op aangrenzende gewasplantages terechtkomt – de

toepassingsvloeistof niet overlapt op de overgangen tussen behandelingsstroken en kopakkers.

HET VOORBEREIDEN VAN DE BRUIKBARE

VLOEISTOF Voordat u begint met het voorbereiden van de bruikbare vloeistof, moet u precies bepalen hoeveel u nodig hebt.

Schud de inhoud van de verpakking voor gebruik. Giet de afgemeten hoeveelheid in het reservoir van de sproeier, dat gedeeltelijk met water is gevuld (met de roerder ingeschakeld).

Spoel de lege containers driemaal met water en giet het spoelwater in de vloeistoftank van de sproeier. Vul de tank vervolgens bij met water tot het vereiste volume. Spuit met de roerder ingeschakeld. Nadat het product in de tank van de sproeier is gegoten, mengt u de vloeistof mechanisch in de tank als de sproeier niet is uitgerust met een hydraulische roerder.

Als het spuiten wordt onderbroken, mengt u de vloeistof in de tank van de sproeier grondig voordat u verdergaat.

VERWERKING VAN BRUIKBARE VLOEIBARE RESERVE EN REINIGING VAN APPARATUUR

De resten van de behandelingsvloeistof moeten zodanig worden behandeld dat het risico op verontreiniging van oppervlakte- en grondwater, zoals bedoeld in de Waterwet, en bodemverontreiniging wordt beperkt, dat wil zeggen: – indien mogelijk na voorafgaande verdunning,

gebruik op het oppervlak waarop de behandeling heeft plaatsgevonden, of – verwijdering met behulp van technische oplossingen die biologische zuivering

garanderen.

afbraak van de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, of – afvoeren op een andere manier in overeenstemming met de afvalregelgeving.

Reinig de apparatuur grondig na gebruik.

Als de apparatuur wordt gereinigd met reinigingsmiddelen die daarvoor bestemd zijn, moet het spoelwater worden behandeld volgens de instructies die bij het reinigingsmiddel zijn geleverd.

VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK VAN HET MIDDEL

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk worden blootgesteld aan de sproeiveel en die om dergelijke informatie hebben verzocht, worden geïnformeerd.

Voorzorgsmaatregelen voor personen die het product gebruiken en voor werknemers:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Adem de sproeiveel niet in.

Gebruik beschermende handschoenen en beschermende kleding ter bescherming tegen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of de verpakking ervan.
Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater.
Voorkom watervervuiling door afwateringssloten van boerderijen en wegen.

Zeer giftig voor bijen (bij eenmalig gebruik tijdens het groeiseizoen in een dosis van 0,2 l/ha of hoger, of bij meervoudig gebruik tijdens het groeiseizoen in een dosis van 0,125 l/ha of hoger).

In het geval van suikerbietenteelt

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone af te bakenen rond reservoirs en waterlopen met een breedte van: – 5 m, waarbij

tegelijktijdig gebruik wordt gemaakt van sproeiers die de vloeistofdrift verminderen.

Bruikbaar oppervlak tijdens de behandeling met 50%.
of

– 10 m van reservoirs en waterlopen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Bij een eenmalige toepassing met een dosering van 0,2 l/ha: Schadelijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag het middel niet worden toegepast op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen foerageren (honingdauw). Niet toepassen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieperiode is afgelopen.

Bij een eenmalige toepassing met een dosering lager dan 0,2 l/ha: Gevaarlijk voor bijen.
Gebruik het product buiten de perioden waarin bijen actief zijn.

In het geval van het telen van wintertarwe en zomergerst:

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Bij tweemaal toepassing tijdens het groeiseizoen met een dosering van 0,125 l/ha: Schadelijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, niet toepassen op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen foerageren (honingdauw). Niet toepassen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieperiode is afgelopen.

Bij gebruik in een dosering lager dan 0,125 l/ha: gevaarlijk voor bijen.
Gebruik het product buiten de periodes dat bijen actief zijn.

In het geval van aardappelteelt

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 10 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Indien tweemaal toegepast tijdens het groeiseizoen met een dosering van 0,125 l/ha of meer: schadelijk voor bijen.

Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u het middel niet aanbrengen op gewassen tijdens de bloei. Niet aanbrengen in gebieden waar bijen foerageren (honingdauw). Niet aanbrengen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet aanbrengen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de beschermingsperiode is afgelopen.

Bij gebruik van het product in een dosering lager dan 0,125 l/ha:

Gevaarlijk voor bijen. Gebruik buiten de perioden waarin bijen actief zijn.

In het geval van het telen van winteraapzaad en voorjaarsaapzaad:

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 10 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Bij herhaalde toepassingen gedurende het groeiseizoen met een dosering van 0,125 l/ of hoger.

Ha, het product is schadelijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u het product niet aanbrengen op gewassen tijdens de bloei. Niet aanbrengen in gebieden waar bijen foerageren (honingdauw). Niet aanbrengen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet aanbrengen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de beschermingsperiode is afgelopen.

Bij gebruik in een dosering lager dan 0,125 l/ha: gevaarlijk voor bijen.

Gebruik het product buiten de periodes dat bijen actief zijn.

Bij het telen van witte kool, rode kool, Chinese kool, broccoli, bloemkool, wortelen, bonen (zowel voor verse zaden als voor gedroogde zaden), erwten (zowel voor verse zaden als voor gedroogde zaden), uien (gezaaid uit zaad, uien uit zaailingen en uien uit bosuitjes): Om waterorganismen te beschermen, is het raadzaam om

Het is noodzakelijk om een beschermingszone van 5 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Bij herhaalde toepassingen tijdens het groeiseizoen met een dosering van 0,15 l/ha: Schadelijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, niet toepassen op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen foerageren (honingdauw). Niet toepassen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieve periode is afgelopen.

Bij gebruik in een dosering lager dan 0,125 l/ha: gevaarlijk voor bijen.

Gebruik het product buiten de periodes dat bijen actief zijn.

In het geval van het kweken van appel-, pruim-, kersen- en zure kersenbomen:

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 50 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 30 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Gevaarlijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u het middel niet toepassen op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen hun nectar (honingdauw) verzamelen. Niet toepassen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieve periode is afgelopen.

Bij de teelt van zwarte bessen, rode bessen, witte bessen, hoogstam bosbessen, aroniabessen, frambozen en bramen: ter bescherming van

waterorganismen is het noodzakelijk een beschermingszone van 50 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 15 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Gevaarlijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u het middel niet toepassen op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen hun nectar (honingdauw) verzamelen. Niet toepassen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieve periode is afgelopen.

Bij het kweken van aardbeien:

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk om het volgende aan te wijzen: – een beschermingszone van 5 meter breed met gelijktijdig gebruik van sproeiers die de drift van de werkzame vloeistof tijdens de behandeling verminderen. behandeling met 50% of – een 10 meter brede beschermingszone rond reservoirs en waterlopen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Gevaarlijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u het middel niet toepassen op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen hun nectar (honingdauw) verzamelen. Niet toepassen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieve periode is afgelopen.

Voor de tomatenteelt:

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 10 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Bij tweemaal gebruik tijdens het groeiseizoen: **Gevaarlijk voor bijen.** Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, niet toepassen op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen foerageren (honingdauw). Niet toepassen wanneer er bloeiend onkruid aanwezig is. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieve periode is afgelopen.

In het geval van rozenteelt

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 20 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om niet-doelwit geleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 15 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden.

Bij tweemaal toegepaste toepassing tijdens het groeiseizoen met een concentratie van 0,025%:

Schadelijk voor bijen. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, niet toepassen op gewassen tijdens de bloei. Niet toepassen in gebieden waar bijen foerageren (honingdauw). Niet toepassen in aanwezigheid van bloeiend onkruid. Niet toepassen op planten die mogelijk gaan bloeien voordat de preventieperiode is afgelopen.

De periode tussen het aanbrengen van het middel en de dag waarop mensen en dieren het gebied waar het middel is aangebracht weer mogen betreden (preventieperiode): betreed het gebied niet voordat de vloeistof volledig op het plantoppervlak is opgedroogd.

Preventieve periode voor bijen (periode ter voorkoming van vergiftiging):

In het geval van een eenmalige toepassing van het product tijdens het groeiseizoen met een dosering lager dan 0,2 l/ha of meerdere toepassingen van het product tijdens het groeiseizoen met een dosering lager dan 0,125 l/ha: niet van toepassing

In het geval van een eenmalige toepassing van het product tijdens het groeiseizoen met een dosering van 0,2 l/ha of meer, of meerdere toepassingen van het product tijdens het groeiseizoen met een dosering van of meer 0,125 l/ha: 24 uur.

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst (wachttijd): Aardbei, tomaat - 3

dagen.

Aardappel, appel, pruim, zure kers, zoete kers, zwarte bes, rode bes, witte bes, aroniabes, hoogstam bosbes, framboos, braam, witte kool, rode kool, Chinese kool, broccoli, bloemkool, wortel, bonen geteeld voor vers zaad, bonen geteeld voor droog zaad, erwten geteeld voor vers zaad, erwten geteeld voor droog zaad, uien geteeld uit zaailingen, uien geteeld uit zaailingen, uien geteeld uit lente-uitjes – 7 dagen.

Suikerbiet, wintertarwe, zomergerst - 30 dagen.

Voorjaarskoolzaad, winterkoolzaad - 45 dagen.

Roos - niet van toepassing.

Periode vanaf de laatste toepassing van het product op planten bestemd voor veevoer tot de dag waarop dieren met deze planten gevoerd mogen worden (wachttijd voor veevoer): Niet van toepassing.

Periode vanaf de laatste toepassing van het product tot de dag waarop de volgende gewassen gezaaid of geplant kunnen worden: Niet van toepassing.

VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMINGSMIDDEL PLANTEN EN VERPAKKINGEN

Buiten het bereik van

kinderen houden. Bewaar het gewasbeschermingsmiddel:

• op plaatsen of in faciliteiten waar passende maatregelen zijn getroffen ter bescherming tegen milieuschade.

• besmetting en toegang door derden, in de originele verpakking, op een manier die besmetting en toegang door derden voorkomt. contact met voedsel en dranken.

• of voer, in een goed afgesloten verpakking, bij een temperatuur van 0°C - 30°C.

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Alle ongebruikte producten moeten worden overgedragen aan een instantie die bevoegd is om gevaarlijk afval in te zamelen.

Lever lege verpakkingen met gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in bij de verkoper.

Eerstehulpmiddel tegengif:

Geen, behandel de symptomen.

Als u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Bij inslikken niet laten braken, onmiddellijk medisch advies inwinnen en de verpakking of het etiket tonen.

Geldigheidsperiode - 3 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -