

Bilaga till beslut nr R - MRiRW nr R-369/2016d från ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling av den 21 juli 2016 om ändring av tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-9/2012 av den 12 januari 2012.

Innehavare av godkännande:

Bayer SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon, Frankrike, tel.: +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36

Enhet som inför växtskyddsmedlet i Republiken Polens territorium: Bayer Sp. z oo, Al.

Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 36 20, fax: 22 572 35 00

Enhet som ansvarar för slutförpackning och märkning av växtskyddsmedlet: AGROPAK Sp. j., Brzeziński i

Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax: 32 615 63 30, e-post: agropak@agropak.pl,

TARGET SA, Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90, fax: +48 58 676 74 89, e-post: info@target.com.pl

DECISMEGA 50 EW

Produkten är avsedd för professionella användare.

Aktiv substansinnehåll: deltametrin

(en förening från pyretroidgruppen) – 50 g/l (4,80 %).

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-9/2012 av den 12 januari

2012 ändrad genom beslut av jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-241/2012d av den 3

Oktober 2012, genom beslut av jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr.

R-526/2015d av den 18 juni 2015, och genom beslut av jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-369/2016d av den 21 juli 2016.



Fara

H301 - Giftigt vid förtäring.

H315 – Orsakar hudirritation.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH 401 - För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301 + P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P391 – Samla upp spill.

BESKRIVNING AV

VERKAN: Decis Mega 50 EW är ett insektsmedel i form av ett vattenhaltigt emulsionskoncentrat, med kontakt- och mageffekt, utformat för att bekämpa bitande och sugande skadedjur i jordbruks-, frukt-, grönsaks- och prydnadsväxter. Det verkar på växtytan. Utformat för användning med självgående eller traktormonterade fältsprutor, självgående eller traktormonterade fruktträdgårdssprutor och handhållna sprutor.

ANVÄNDNING AV MEDELET

JORDBRUKSVÄXTER

Sockerbetor

Mszyca burakowa

Maximal dos för engångsanvändning: 0,2 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 0,1–0,2 l/ha.

Ansökningsdatum: Ansök

så snart bevingade bladlöss bebor växterna, innan kolonier uppstår.

Antal behandlingar: 1.

Rödbetsloppbagge, rödbetsloppbagge

Maximal dos för engångsanvändning: 0,2 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 0,1–0,2 l/ha.

Ansökningsperiod:

Applicera när de första skalbaggarerna dyker upp eller när den första skadan upptäcks.

Antal behandlingar:

1. Något komplicerat

Maximal dos för engångsanvändning: 0,2 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 0,1–0,2 l/ha.

Ansökningsdatum: Ansök

omedelbart efter att de första symptomen på skadedjuret uppträtt (vanligtvis 2-4-bladsfasen hos rödbetor).

Antal behandlingar: 1.

Rekommenderad vattenmängd: 300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Vintervete, vårkorn

Bladlöss

Maximal dos för engångsanvändning: 0,125 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 0,1–0,125 l/ha.

Appliceringsperiod:

Applicera efter ax, men senast under spannmålsens mjölkmodnad.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Hästsvansar

Maximal dos för en engångsbehandling: 0,125 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 0,1–0,125 l/ha.

Appliceringsdatum:

Använd från larvernas början av kläckning.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Potatis

Larver och skalbaggar av Coloradopotatisbaggen.

Maximal dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 0,1–0,15 l/ha.

Ansökningsdatum: Ansök

efter skadedjursangrepp. Använd den högre rekommenderade dosen för att bekämpa skalbaggar och vid frodig potatisväxt.

Rekommenderad vattenmängd: 150–400 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 7 dagar.

Vinterraps

Rapsmygg

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Ansökningsdatum: Ansök

efter att unga larver har uppträtt, när det genomsnittliga antalet larver är: 1 larv per planta (på höstraps).

Kålrotsviveln

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum:

Applicera enligt anvisningarna, innan skalbaggar lägger sina ägg.

Rekommenderad vattenmängd: 300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Vinterraps, vårraps

Loppbaggar, rapsloppbaggar.

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Ansökningsdatum:

Använd när skalbaggar dyker upp på unga plantor eller när den första skadan märks.

Rapspollenbagge (behandling mot pollenbagge bekämpar även fyrtandad vivel)

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,1 l/ha.

Ansökningsdatum: Ansök

enligt indikationerna efter skalbaggars uppkomst på växter i den kompakta blomställningsfasen, senast i den lösa blomställningsfasen.

Skadedjur i baljor (kålbladminerare, kåbladminerare)

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Ansökningsperiod:

Utför behandlingen i början av blombladsfallet.

Kålbladlus

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Ansökningsperiod:

Applicera när de första bladlösskolonierna uppträder.

Rekommenderad vattenmängd: 300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

För höstraps, maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 3.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Det rekommenderas att utföra maximalt 3 behandlingar, inklusive 1 behandling på hösten och 2 behandlingar på våren.

För vårraps är det maximala antalet behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

FRUKTVÄXTER

Äppelträd

Äppelblomsmal

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

När ska man använda: Applicera

strax före eller under knoppbrytning på äppelträd. Applicera på soliga dagar, vid temperaturer på minst 120°C.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Äppelbladlus

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum:

Applicera efter att de första bladlösskolonierna uppträtt.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500-750 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Plommon

Bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum:

Applicera efter att de första bladlösskolonierna uppträtt.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500-750 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från resten av etiketten: 2.

Svart vinbär

Bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum:

Applicera efter att de första bladlösskolonierna uppträtt.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500-750 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från resten av etiketten: 2.

Jordgubb

Hallonblomma

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Appliceringsperiod:

Applicera före blomning, under den period då skalbaggar uppträder.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500-750 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från resten av etiketten: 2.

GRÖNSAKSVÄXTER

Tomat odlad i marken

Coloradopotatisbagge

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Användningsperiod: Användning

under perioden med skalbaggnas uppkomst eller larvernas kläckning.

Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Vitkål

Vitkål, vitkål

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Ansökningsperiod:

Använd under larvernas kläckningsperioden.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från resten av etiketten: 2.

Prydnadsväxter

Ros (i marken)

Rosenbladlus

Maximal koncentration för engångsbruk: 0,025 % (25 ml av medlet i 100 l vatten).

Rekommenderad koncentration för engångsbruk: 0,015–0,025 % (15–25 ml av medlet i 100 l vatten).

Appliceringsdatum: Applicera

efter att skadedjuret har upptäckts.

Rosenfärgad tratt

Maximal koncentration för engångsbruk: 0,025 % (25 ml av medlet i 100 l vatten).

Rekommenderad koncentration för engångsbruk: 0,015–0,025 % (15–25 ml av medlet i 100 l vatten).

Appliceringsdatum: Applicera

efter att skadedjurets förekomst har bekräftats.

Rekommenderad mängd arbetsvätska: 1000 l/ha.

Rekommenderad sprayning: medelstora droppar

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14–21 dagar.

ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL I GRÖDOR OCH APPLIKATIONER I SMÅ OMRÅDEN

Användaren är ensam ansvarig för effektiviteten och fytotoxiciteten hos ett växtskyddsmedel
produkt som används i mindre grödor.

FRUKTVÄXTER

Svart vinbär

Rosenrumpad tortrix

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum:

Spraya efter att skadedjuret uppträtt från det stadium då det första bladet är utfällt till slutet av blomningsstadiet (BBC 11-69).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från föregående del av etiketten: 2.

Röda vinbär, vita vinbär, blåbär

Bladlöss, rosenbladrulle

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att skadedjuret uppträtt från det stadium då det första bladet är utfällt till slutet av blomningsstadiet (BBC 11-69).

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Aronia

Bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum:

Spraya efter att de första kolonierna uppträtt, från det stadiet då det första bladet vecklas ut till slutet av blomningsstadiet (BBCH 11-69).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rönnborrare

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Ansökningsdatum: Den

Behandling bör utföras på våren, när skadedjuret livnär sig på blomställningar, det vill säga blomknoppar, i fasen från början av blomställningens utveckling till slutet av blomningsfasen (BBCH 51-69).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Hallon, björnbär

Bladlöss, *Drosophila suzukii* (fläckig vingad drosophila), hallonmygga, hallonröja

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Ansökningsperiod:

Spraya efter att de första bladlösskolonierna uppträtt, från slutet av blomningsfasen till slutet av den avancerade fruktmognadsfasen (BBCH 68-85).

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Jordgubb

Bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att de första bladlösskolonierna uppträtt från slutet av löparskottens utvecklingsfas till början av fruktmognadsfasen (BBCH 49-81).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Drosophila suzukii (fläckig bevingad drosophila), rosenvingad tortrix och andra tortrixmalar, alternativ

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att skadedjuret uppträder från slutet av utlöparskottens utvecklingsfas till början av fruktmognadsfasen (BBCH 49-81).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från föregående del av etiketten: 2.

Plommon

Drosophila suzukii (fläckig vingfluga)

Maximal dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15–0,25 l/ha.

Ansökningsdatum: Den

Behandling bör utföras 3–4 dagar efter fångst med feromoner eller klibbiga fällor, från fruktens knopptillväxtfas till slutet av fasen då frukten är mogen för konsumtion (BBCH 76–89).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Gulhornad fruktkropp, lätt fruktkropp

Ansökningsdatum:

Använd efter att ha fångats med klibbiga fällor, i den sista fasen av blombladsfallet (BBCH 67-69).

Maximal dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15–0,25 l/ha.

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500-750 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från föregående del av etiketten: 2.

Körsbär, sött körsbär

Bladlöss

Maximal dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 0,15–0,25 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att de första bladlösskolonierna uppträtt, från början av den huvudsakliga skotttillväxtfasen till slutet av fasen då frukten är mogen för konsumtion (BBCH 31-89).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Körsbärsfruktfluga, *Drosophila suzukii* (fläckig bevingad fruktfluga)

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 0,25 l/ha.

Ansökningsdatum: Den

Behandling bör utföras 3–4 dagar efter fångst med feromoner eller klibbiga fällor, när frukten når 60–90 % av sin typiska storlek (BBCH 76–79).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500-750 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

GRÖNSAKSVÄXTER

Vitkålsbladlöss

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att de första bladlösskolonierna uppträtt, från början av den tydligt utvecklade första bladfasen till slutet av utvecklingsfasen för de växtdelar som är avsedda för skörd (BBCH 11-49).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen, med hänsyn till användningen av produkten från föregående del av etiketten: 2.

Rödkål, broccoli, blomkål, kinakål, bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att de första bladlösskolonierna uppträtt, från början av den tydligt utvecklade första bladfasen till slutet av utvecklingsfasen för de växtdelar som är avsedda för skörd (BBCH 11-49).

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Morot

Bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum:

Spraya efter att de första bladlösskolonierna uppträtt, från början av fasen med det första tydligt utvecklade bladet till slutet av fasen då roten når sin typiska storlek och form (BBCH 11-49).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Morotsfluga Maximum/

Rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter skörd på klibbiga bräddor, från början av fasen med tydligt utvecklade första blad till slutet av fasen då roten når sin typiska storlek och form (BBCH 11-49).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 500 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Fältärtor odlade för färskt utsäde, fältärtor odlade för torrt utsäde)

Bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för en engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att de första bladlösskolonierna uppträtt, från början av den tydligt utvecklade första bladfasen till början av blomställningens utvecklingsfas (BBCH 11-49).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Ärtkapsel

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsperiod: Spraya efter att skadedjuret uppträtt

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Bönor odlade för färska frön, bönor odlade för torra frön

Bladlöss

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att de första bladlösskolonierna uppträtt, från början av den tydligt utvecklade första bladfasen till början av blomställningens utvecklingsfas (BBCH 11-49).

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Lök odlad från frö, lök odlad från plantor, lök odlad från våren
lök.

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum:

Spraya efter skörd med doft- eller feromonfällor, från början av den tydligt synliga första bladfasen till slutet av utvecklingsfasen för de växtdelar som är avsedda för skörd (BBCH 11-49).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Tripsar

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 0,15 l/ha.

Appliceringsdatum: Spraya

efter att ha fångats på klabbiga fällor, från början av den första tydligt synliga bladfasen till slutet av utvecklingsfasen för de växtdelar som är avsedda för skörd (BBCH 11-49).

Antal behandlingar: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 14 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED VAROR
JORDBRUKSPRAKSIS

1. Om fler behandlingar krävs, använd växelvis rekommenderade insekticider från andra kemiska grupper.
2. Medlet fungerar mest effektivt vid temperaturer under 20 °C. Vid högre temperaturer utföra behandlingar i slutet av dagen.
3. Vid skadedjursbekämpning (särskilt stickande och sugande skadedjur) bör behandlingen utföras noggrant så att alla delar av växten är täckta med arbetsvätskan.
4. Innan produkten används på prydnadsväxter, utför en testbehandling på varje sort som odlas för första gången för att kontrollera om några symtom på växtskador har uppstått inom 7 dagar.
5. Vid sprutning av växter täckta med en vaxartad beläggning (t.ex. kål) i vätskan användning, tillsätt ett vätmedel.
6. Vid applicering av medlet, se till att inte: – appliceringsvätskan rinner ner på angränsande odlingar – appliceringsvätskan överlappar varandra vid korsningarna mellan behandlingsremсор och åkerfält.

TILLAGNING AV ANVÄNDBARA VÄTSKAN

Innan du börjar tillreda den användbara vätskan, fastställ exakt hur mycket som behövs.

Skaka förpackningens innehåll före användning. Håll den uppmätta mängden i sprutbehållaren som är delvis fylld med vatten (med omröraren påslagen).

Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och håll sköljmedlet i sprutans arbetsvätsketank. Fyll sedan på spruttanken med vatten till önskad volym. Spraya med omröraren inkopplad. Efter att produkten hållits i sprutans tank, blanda vätskan i tanken mekaniskt om sprutan inte är utrustad med hydraulisk omrörare. Om sprutningen avbryts, blanda arbetsvätskan i spruttanken noggrant innan arbetet återupptas.

HANTERING AV ANVÄNDBARA VÄTSKERESTER OCH RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rester av arbetsvätskan efter behandlingen bör hanteras på ett sätt som begränsar risken för förorening av yt- och grundvatten i den mening som avses i vattenlagens bestämmelser och markförorening, dvs.: – efter föregående utspädning, användning på den yta där behandlingen utfördes, om möjligt, eller – bortskaffande med tekniska lösningar som säkerställer biologiska

nedbrytning av de aktiva substanserna i växtskyddsmedel, eller – bortskaffa på annat sätt i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Tvätta utrustningen noggrant efter arbetet.

Om utrustningen diskas med rengöringsmedel avsedda för detta ändamål, ska de resulterande sköljningarna hanteras i enlighet med de instruktioner som medföljer rengöringsmedlet.

VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV MEDELET

Innan produkten används bör alla berörda parter som kan komma att exponeras för sprutavdrift och som har begärt sådan information informeras.

Försiktighetsåtgärder för personer som använder produkten och arbetstagare:

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Andas inte in spraydimma.

Använd skyddshandskar och skyddskläder för att skydda mot exponering för växtskyddsmedel.

Miljöskyddsåtgärder:

Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess förpackning.
 Tvätta inte utrustning nära ytvatten.
 Undvik vattenföroreningar genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

Mycket giftigt för bin (vid engångsansvändning under växtsäsongen vid en dos lika med eller högre än 0,2 l/ha eller upprepad användning under växtsäsongen vid en dos lika med eller högre än 0,125 l/ha).

Vid odling av sockerbetor

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en skyddszon mot vattendrag och reservoarer med en bredd av: – 5 m med samtidig användning av

sprayer som minskar vätskedrift

användbar yta under behandlingen med 50 %
 eller

– 10 m från reservoarer och vattendrag.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid engångsbehandling med en dos på 0,2 l/ha: Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomning. Applicera inte i områden där bin söker föda (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan skyddsperioden är slut.

Vid engångsansvändning med en dos under 0,2 l/ha: Farligt för bin. Använd produkten utanför perioder med biaktivitet.

Vid odling av höstvet och vårkorn:

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från reservoarer och vattendrag.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid två appliceringar under växtsäsongen med en dos på 0,125 l/ha: Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomningen. Applicera inte i områden där bin söker föda (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan förebyggande perioden är slut.

Vid användning i en dos under 0,125 l/ha: Farligt för bin.
 Använd produkten utanför perioder med biaktivitet.

Vid potatisodling

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 10 m bred skyddszon från reservoarer och vattendrag.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid applicering två gånger under växtsäsongen med en mängd lika med eller större än 0,125 l/ha: Farligt för bin.

För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomning. Applicera inte i områden där bin söker föda (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan skyddsperioden är slut.

Vid användning av produkten i en dos under 0,125 l/ha:

Farligt för bin. Använd utanför perioder med binaktivitet.

Vid odling av vinterraps och vårraps:

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 10 m bred skyddszon från reservoar och vattendrag.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid upprepad applicering under växtsäsongen med en dos lika med eller högre än 0,125 l/

ha, produkten är farlig för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomning. Applicera inte i områden där bin söker föda (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan skyddsperioden är slut.

Vid användning i en dos under 0,125 l/ha: Farligt för bin.

Använd produkten utanför perioder med biaktivitet.

Vid odling av vitkål, rödkål, kinakål, broccoli, blomkål, morötter, bönor som odlas för färska frön, bönor som odlas för torkade frön, ärtor som odlas för färska frön, ärtor som odlas för torkade frön, lök som odlas från sådd, lök som odlas från plantor, lök som odlas från salladslök: För att skydda vattenlevande organismer är det

nödvändigt att utse en skyddszon som är 5 m bred från reservoar och vattendrag.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid upprepad applicering under växtsäsongen med en dos på 0,15 l/ha: Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomningen. Applicera inte i områden där bin söker föda (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan den förebyggande perioden är slut.

Vid användning i en dos under 0,125 l/ha: Farligt för bin.

Använd produkten utanför perioder med biaktivitet.

Vid odling av äppel-, plommon-, körsbärs- och surkörsbärsträd:

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 50 m bred skyddszon från vattendrag och reservoar.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 30 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomning. Applicera inte i områden där bin får sin nektar (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan den förebyggande perioden är slut.

Vid odling av svarta vinbär, röda vinbär och vita vinbär, blåbär, aronia, hallon och björnbär: För att skydda vattenlevande organismer är

det nödvändigt att utse en 50 m bred skyddszon från vattendrag och reservoar.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 15 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomning. Applicera inte i områden där bin får sin nektar (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan den förebyggande perioden är slut.

När man odlar jordgubbar:

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse: – en 5 m bred skyddszon med samtidig användning av sprutor som minskar avdriften av arbetsvätskan under rening med 50 % eller – en 10 m bred skyddszon från reservoarer och

vattendrag.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomning. Applicera inte i områden där bin får sin nektar (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan den förebyggande perioden är slut.

För tomatodling:

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 10 m bred skyddszon från reservoarer och vattendrag.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid två appliceringar under växtsäsongen: Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomningen. Applicera inte i områden där bin söker föda (honungsdagg). Applicera inte när blommande ogräs förekommer. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan den förebyggande perioden är slut.

När det gäller rosodling

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en 20 m bred skyddszon från vattendrag och reservoarer.

För att skydda leddjur som inte är målarter är det nödvändigt att utse en 15 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

Vid två appliceringar under växtsäsongen i en koncentration på 0,025 %: Farligt för bin. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, applicera inte på grödor under blomningen. Applicera inte i områden där bin söker föda (honungsdagg). Applicera inte när det finns blommande ogräs. Applicera inte på växter som kan börja blomma innan förebyggande perioden är slut.

Perioden från appliceringen av medlet till den dag då människor och djur får vistas i området där medlet applicerades (förebyggande period): vistas inte i växten förrän vätskan har torkat helt på ytan.

Biförebyggande period (period mot förgiftning):

Vid en engångsapplicering av produkten under växtsäsongen med en dos lägre än 0,2 l/ha eller flera appliceringar av produkten under växtsäsongen med en dos lägre än 0,125 l/ha: ej tillämpligt

Vid en engångsapplicering av produkten under växtsäsongen med en dos lika med eller högre än 0,2 l/ha eller flera appliceringar av produkten under växtsäsongen med en dos lika med eller högre än 0,125 l/ha: 24 timmar.

Period från sista appliceringen av medlet till skördagen (karensperioden): Jordgubb, tomat - 3

dagar.

Potatis, äpple, plommon, surkörsbär, sötkörsbär, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, aronia, blåbär, hallon, björnbär, vitkål, rödkål, kinakål, broccoli, blomkål, morot, bönor odlade för färska frön, bönor odlade för torkade frön, ärtor odlade för färska frön, ärtor odlade för torkade frön, lök odlad från sådd, lök odlad från plantor, lök odlad från salladslök – 7 dagar.

Sockerbetor, vintervete, vårkorn - 30 dagar.

Våraps, vinterraps - 45 dagar.

Ros - ej tillämpligt.

Period från sista appliceringen av produkten på växter avsedda som foder till den dag då djur får utfodras med dessa växter (karenstid för foder): Ej tillämpligt.

Period från sista appliceringen av produkten till den dag då följande grödor kan sås eller planteras: Ej tillämpligt.

FÖRHÅLL FÖR FÖRVARING OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV SKYDDSMEDELET VÄXTER OCH FÖRPACKNINGAR

Förvaras utom räckhåll

för barn. Förvara växtskyddsmedlet: γ på platser

eller i anläggningar där lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda mot miljöfaror.

kontaminering och åtkomst av tredje part, γ i originalförpackning, på ett sätt som förhindrar kontakt med mat och dryck.

eller utfodra, i en tät sluten behållare, vid en temperatur på 0°C - 30°C.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar av växtskyddsmedel för andra ändamål.

All oanvänd produkt ska överföras till en enhet som är auktoriserad för insamling av farligt avfall.

Returnera tomma behållare som innehåller farliga växtskyddsmedel till säljaren.

FÖRSTA HJÄLPEN Motgift:

ingen, behandla symptomatisk.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Vid förtäring, framkalla inte kräkning, kontakta omedelbart läkare och visa förpackningen eller etiketten.

Giltighetstid - 3 år

Produktionsdatum -

Nätinnehåll -

Batchnummer - ...