

Bilag til Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters afgørelse nr. R-553/2021d af 01/09/2021
om ændring af tilladelse nr. R-133/2020 af 23/10/2020 fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Tilladelsesindehaver:

Albaugh TKI doo, Grajski trg 21, 2327 Rače, Republiken Slovenien, tlf.: +386 2 60 90 211 Brugervejledning: tlf.: 221 253 452, www.albaugh.eu

FANTASIA 800 EC

Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere.

Aktivt stofindhold: prosulfocarb
(en forbindelse fra carbamatgruppen) – 800 g/l (78,43%)

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R-133/2020 af 23. oktober
2020, senest ændret ved Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter's afgørelse nr. R-553/2021d af 1. september 2021.

	
Fare	
H304 H315 H317 H319 H410	Kan være dødelig ved indtagelse og indtagelse i luftvejene. Irriterer huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Irriterer øjnene. Meget giftig for vandlevende organismer, forårsager langvarige virkninger.
EUH 401 For	at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet skal du gøre følgende: i henhold til brugsanvisningen.
P261 P280 P301+P310	Undgå at indånde støv/røg/gas/tåge/dampe/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313	Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P331 P391	Fremkald IKKE opkastning. Opsaml spild.

VIRKNINGSBESKRIVELSE

HERBICID i form af et koncentrat til fremstilling af en vandig emulsion (EC), der påføres jord og løv, beregnet til selektiv bekæmpelse af visse etårige enkimbladede og tokimbladede ukrudtsplanter.

INDSATS MOD UKRUDS

Midlet optages af ukrudt inden for 1 time efter påføring.

Regn, der falder efter denne dato, reducerer ikke produktets effektivitet. Den optimale anvendelsesperiode er før og kort efter ukrudtets fremkomst, i de tidlige stadier af ukrudtsudviklingen.

Følsomme ukrudt:	almindelig fuglegræs, purpurbrændenælde, hvid gåsefod, korngyvel, vedbend-ærenpris, persisk ærenpris, snerre klæbende.
Moderat følsomt ukrudt:	Markviol, markvalmue, snerle, almindelig kamille, enårig rapgræs.
Resistent ukrudt:	Ensidig ukrudt.

ANVENDELSE AF AGENTET

Midlet er beregnet til brug med selvkørende eller traktormonterede marksprøjter.

Vinterhvede

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Ansøgningsdato:

Brug midlet om efteråret, efter såning af korn, indtil 3-bladsfasen (BBCH 00-13).

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

ANVENDELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER I MINDRE AFGRØDDER OG ANVENDELSER

**Brugeren er eneansvarlig for effektiviteten og fytotoksiciteten af et
plantebeskyttelsesmiddel, der anvendes i mindre afgrøder.**

Vårrug, almindelig hirse

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Ansøgningsdato:

Brug midlet efter såning af afgrøden, op til 3-bladsstadiet (BBCH 00-13).

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Løg fra såning

Ansøgningsdato:

Påfør midlet efter fremspiring, når det første ægte blad er mindst 3 cm højt, senest før det 5. blad er tydeligt synligt (BBCH 11-14).

a) engangsbehandling

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

eller

b) opdelt procedure

1. første behandling

Anvendelsesdato: brug produktet i 1-2 løgbladstadiet (BBCH 11-12).

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 2,0 l/ha.

2. behandling

Anvendelsesdato: brug produktet i løgets 4-bladsfase (BBCH 14).

Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 2,0 l/ha.

Interval mellem behandlinger: mindst 7-10 dage.

OPMÆRKSOMHED:

Den samlede dosis af midlet, der anvendes i to behandlinger, bør ikke overstige 4,0 l/ha.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Løg fra frøplanter, løg fra forårsløg

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Ansøgningsdato:

Påfør midlet i løgbladstadiet 1-4, senest før det 5. blad viser sig (BBCH 11-14), 7 dage efter plantning af kimplanterne eller forårsløgene.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

KOMMENTARER:

1. Brug ikke produktet på løg beregnet til tidlig høst sammen med purløg (sælges i bundter).
2. Midlet kan forårsage midlertidig skade på løgblade.

Porre fra såning

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Ansøgningsdato:

Brug midlet i 2-4-bladsstadiet (BBCH 12-14).

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Porre fra frøplanter

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 5,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 5,0 l/ha

Ansøgningsdato:

Brug midlet i 2-4-bladsstadiet (BBCH 12-14) 7-14 dage efter plantning af kimplanterne.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Hvidløg

Maksimal dosis for en enkelt anvendelse: 4,0 l/ha. Anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Ansøgningsdato:

Brug produktet efter plantning af hvidløgsfed, i 1-2-bladsstadiet (BBCH 11-12).

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.
Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.
Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Gulerødder, persillerod

Påføringsdato: Påfør produktet i 2-4-bladsfasen af afgrødeplanter (BBCH 12-14).

a) engangsbehandling

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.
Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.
Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

eller

b) opdelt procedure:

• første behandling

Anvendelsesdato: i 2-3 gulerodsbladsfasen (BBCH 12-13).
Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.
Anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 2,0-3,0 l/ha.

• anden behandling

Anvendelsesdato: i 4-bladsstadiet af gulerødder (BBCH 14).
Maksimal/anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 2,0 l/ha.

Interval mellem behandlinger: mindst 7 dage.

Den samlede dosis i to behandlinger bør ikke overstige 5,0 l/ha.

I de tidlige stadier af gulerøddernes vækst, og især persille, anbefales det at bruge den laveste af de anbefalede doser.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.
Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Pastinak

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.
Anbefalet dosis til engangsbrug: 2,5 - 3,0 l/ha.
Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.
I de tidlige stadier af pastinakvækst anbefales det at bruge den laveste af de anbefalede doser.
Ansøgningsdato:

Brug produktet i pastinakkernes 2-4-bladsstadium (BBCH 12-14).

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.
Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.
Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Sellerirod, selleristængel

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.
Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.
Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.
Ansøgningsdato:
Brug midlet i 2-4-bladsstadiet (BBCH 12-14) 7-14 dage efter plantning af kimplanterne.
Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.
Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.
Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Peberrod

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.
Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Ansøgningsdato:

Påfør midlet efter plantering og dannelse af kamme.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Markbønner, markærter, smalbladet lupin, gul lupin, hvid lupin, linser

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Ansøgningsdato:

Brug midlet op til 5 dage efter såning (BBCH 00-02).

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Bemærk:

Så hestebønner i en dybde på mindst 7 cm, ærter og lupin i en dybde på 3-5 cm.

Almindelig solsikke, sojabønne, almindelig hør dyrket til fiber, almindelig hør dyrket til frø, ægte hamp dyrket til fiber, ægte hamp dyrket til frø

Maksimal dosis for en enkelt anvendelse: 4,0 l/ha. Anbefalet dosis for en enkelt anvendelse: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Anvendelsesdato: Brug produktet inden for 3 dage efter såning (BBCH 00-02).

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Bemærk: Så frøene i en dybde på mindst 3 cm.

Prydplanter dyrket fra frø, stauder, prydbuske

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3,0 - 4,0 l/ha.

Dosisstørrelsen afhænger af ukrudtets art og udviklingsstadium.

Ansøgningsdato:

Påfør produktet før afgrødernes fremspiring eller tidligt efter fremspiring, og i tilfælde af buske – før bladudviklingsfasen begynder (BBCH 00-09).

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

PLANTESUCCES Midlet

nedbrydes i jorden uden at udgøre en trussel for efterfølgende planter.

FORHOLDSREGLER, TILBAGETRÆKNINGSTIDER OG SÆRLIGE BETINGELSER ANVENDELSER

Periode fra sidste anvendelse af midlet til dagen for høst af afgrøden (tilbageholdelsesperiode):

Løg beregnet til forbrug umiddelbart efter høst, selleri - 75 dage,

Pastinakker, peberrod, rodpersille, gulerødder, porrer - 80 dage.

Sellerirod - 100 dage.

Vinterhvede, vårrug, hirse, hvidløg, løg til høst, fuldt udviklede tørre løg til opbevaring, hestebønner, foderærter, smalbladet lupin, gul lupin, hvid lupin, linser, solsikker, sojabønner, almindelig hør, hamp, prydplanter dyrket fra frø, stauder, prydbuske - ikke påkrævet.

1. For at opnå høj effektivitet af ukrudtsbekæmpelsen er det tilrådeligt at grundigt dæk jorden og ukrudsplanterne med arbejdsvæsken.
2. Produktet er mest effektivt, når det påføres fugtig jord og ukrudt i jorden. tidlige udviklingsstadier (spiring og fremspiring).
3. I tilfælde af mange ukrudtstyper anbefales det at bruge en højere fra de anbefalede doser.
4. Afgrødens fremskredne udviklingsstadier kan gøre det vanskeligt for arbejdsvæsken at nå jorden og bekæmpe ukrudt.
5. For at øge dækningen af den sprøjtede overflade med arbejdsvæsken og dermed øge behandlingens effektivitet samt begrænse afdrift og fordampning af væsken under behandlingen, skal følgende noter overholdes:
 - a) Produktet bør ikke anvendes:
 - ved vindhastigheder over 4 m/s (anbefalet op til 2 m/s),
 - i fuld sol og lav luftfugtighed, • i ekstremt fugtig eller tør jord.
 - b) Sprøjtning bør udføres under optimale forhold, helst:
 - kun ved brug af kalibrerede sprøjter og sprøjtebomme indstillet til højde ikke større end 50 cm over den sprøjtede jordoverflade,
 - med ventilatoren slukket, når der bruges sprøjter med en hjælpeanordning luftstrøm,
 - ved en sprøjtehastighed på højst 8 km/t,
 - ved brug af sprøjtedyser med mellemstore dråber ved reduceret tryk for at opnåelse af en større andel af grove dråber,
 - om aftenen eller tidlig morgen, når lufttemperaturen ikke overstiger 150°C , og sollyset er lavt,
 - med høj luftfugtighed.
6. Brug ikke produktet:
 - på våde afgrøder, • på plantager beskadiget af sygdomme eller skadedyr,
 - under stressende forhold for afgrøder,
 - umiddelbart efter vanding.
7. Undgå at bruge produktet:
 - afdrift af sprøjtevæsken på naboafgrøder,
 - overlappning af arbejdsvæsken ved samlingerne mellem behandlingsstriberne og forageren
8. Efter påføring af Fantasia 800 EC kan der forekomme forbigående symptomer på fytotoksicitet.
9. **Før brug af Fantasia 800 EC anbefales det at udføre en testbehandling på hver dyrket sort for at kontrollere, om der opstår symptomer på planteskade.**

FORBEREDELSE AF BRUGBAR VÆSKE

Før du begynder at forberede arbejdsvæsken, skal du bestemme den nøjagtige mængde, der er nødvendig. Hæld den afmålte mængde væske i sprøjtebeholderen, der er delvist fyldt med vand. (med blanderen tændt), fyld op med vand til den ønskede mængde og bland grundigt. Efter at have hældt midlet i sprøjtetanken uden hydraulisk blander, skal væsken i tanken

blandes mekanisk.

Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og hæld skyllevæsken i tanken.

sprøjte med arbejdsvæske.

Ved afbrydelser i sprøjtningen skal arbejdsvæsken blandes grundigt i sprøjtetanken, inden arbejdet genoptages.

HÅNTERING AF BRUGBARE VÆSKERESTER OG RENGØRING AF UDSKYR

Resterende væske og vand, der bruges til at rengøre udstyret, skal være:

• hvis muligt, efter fortynding, brug på den overflade, hvorpå det skal påføres

proceduren blev udført, hvis det var muligt, eller

• bortskaffes ved hjælp af tekniske løsninger, der sikrer biologisk

nedbrydning af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller

• bortskaffes på anden måde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Vask udstyret grundigt efter arbejdet.

FORHOLDSREGLER FOR PERSONER, DER BRUGER AGENTEN, MEDARBEJDERE OG TILBAGESTE

~~Før produktet tages i brug, skal alle interesserede parter, der kan blive udsat for sprøjteeffekten, og som har anmodet om sådanne oplysninger, informeres.~~

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Brug beskyttelseshandsker og -tøj for at beskytte mod virkningerne af plantebeskyttelsesmidler under tilberedning af arbejdsopløsningen og under behandlingen.

Perioden fra påføring af midlet til den dag, hvor mennesker og dyr må betræde det område, hvor midlet er blevet påført (forebyggelsesperiode):

Gå ikke ind i planten, før væsken er helt tørret på overfladen.

MILJØMÆSSIGE FORHOLDSREGLER

Forurens ikke vand med plantebeskyttelsesmidlet eller dets emballage. Vask ikke udstyr i nærheden af overfladevand. Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter fra landbrug og veje.

Undgå utilsigtet udledning til miljøet.

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en beskyttelseszone mod reservoirer og vandløb med en bredde på:

• 10 m med samtidig brug af teknikker, der reducerer afdriften af arbejdsopløsningen under behandlingen med 75 % i tilfælde af dyrkning af vintersæd, vårrug og hirse

• 10 m med samtidig brug af teknikker, der reducerer afdriften af arbejdsopløsningen under behandlingen med 50 % i tilfælde af dyrkning af løg, porrer, hvidløg, gulerødder, rodpersille, pastinakker, rodselleri, bladselleri, peberrod, hestebønner, foderærter, smalbladet lupin, gul lupin, hvid lupin, linser, solsikker, sojabønner, hør, hamp og pryplanter.

For at beskytte ikke-målplanter og leddyr er det nødvendigt at udpege en 5 m bred beskyttelseszone fra ikke-landbrugsområder.

BETINGELSER FOR OPBEVARING OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF BESKYTTELSESMIDLET PLANTER OG EMBALLAGE

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar plantebeskyttelsesmidlet:

• på steder eller i faciliteter, hvor der anvendes passende løsninger til at beskytte mod miljøforurening og adgang fra tredjeparter,
• i originalemballagen på en måde, der forhindrer kontakt med fødevarer, drikkevarer eller fodring, på et godt ventileret, køligt sted.

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle farligt affald.

Returner den tomme emballage, der indeholder farlige plantebeskyttelsesmidler, til sælgeren.

FØRSTEHJÆLP

Modgift: ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

VED INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning.

Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

Gyldighedsperiode – 2 år.

Produktionsdato -

Netindhold -

Batchnummer -