

Allegato alla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 553/2021d del 01/09/2021
che modifica l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 133/2020 del 23/10/2020.

Titolare del permesso:

Albaugh TKI doo, Grajski trg 21, 2327 Rače, Repubblica di Slovenia, tel.: +386 2 60 90 211 Istruzioni per l'utente: tel.: 221 253 452, www.albaugh.eu

FANTASIA 800 EC

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali

Contenuto di sostanza attiva:

prosulfocarb (un composto del gruppo dei carbammati) – 800 g/l (78,43%)

Autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 133/2020 del 23 ottobre 2020,
modificata da ultimo dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 553/2021d del 1° settembre 2021.

	
Pericolo	
H304 H315 H317 H319 H410	Può essere fatale se ingerito e se penetra nelle vie respiratorie. Irrita la pelle. Può causare una reazione allergica cutanea. Irritante per gli occhi. Molto tossico per gli organismi acquatici, provoca effetti di lunga durata.
EUH 401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, procedere come segue: secondo le istruzioni per l'uso.
Pagina 261 Pagina 280 P301+P310 P333+P313 P331 P391	Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. NON indurre il vomito. Raccogliere la fuoriuscita.

DESCRIZIONE

DELL'AZIONE ERBICIDA sotto forma di concentrato per la preparazione di un'emulsione acquosa (EC), applicato al terreno e al fogliame, destinato al controllo selettivo di alcune infestanti annuali monocotiledoni e dicotiledoni.

AZIONE SULLE ERBACCE

L'agente viene assorbito dalle erbacce entro 1 ora dall'applicazione.

Le precipitazioni successive a questa data non riducono l'efficacia del prodotto. Il periodo di applicazione ottimale è prima e subito dopo l'emergenza delle infestanti, nelle prime fasi di sviluppo.

Erbacce sensibili:	erba stella comune, ortica morta viola, piede d'oca bianco, ginestra dei cereali, veronica persiana, veronica persiana, caglio appiccicoso.
Erbacce moderatamente sensibili:	Viola dei campi, papavero dei campi, convolvolo, camomilla comune, poa annua.
Erbacce resistenti:	Erbaccia unilaterale.

RICHIESTA DELL'AGENTE

L'agente è destinato all'uso con irroratrici semoventi o montate su trattori.

grano invernale

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 3,0 l/ha.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare il prodotto in autunno, dopo la semina dei cereali, fino alla fase delle 3 foglie (BBCH 00-13).

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

APPLICAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI IN COLTURE E APPLICAZIONI MINORI

**L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'efficacia e della fitotossicità di un prodotto fitosanitario
utilizzato in colture minori.**

Segale primaverile, miglio comune

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 3,0 l/ha.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare l'agente dopo la semina della coltura, fino allo stadio di 3 foglie (BBCH 00-13).

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Cipolle da semina

Data di presentazione della domanda:

Applicare l'agente dopo l'emergenza, quando la prima foglia vera è alta almeno 3 cm, al più tardi prima che la quinta foglia sia chiaramente visibile (BBCH 11-14).

a) trattamento una tantum

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

O

b) procedura di divisione

1° primo trattamento

Data di applicazione: utilizzare il prodotto nello stadio di 1-2 foglie di cipolla (BBCH 11-12).

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 2,0 l/ha.

2° secondo trattamento

Data di applicazione: utilizzare il prodotto nella fase quadrifogliare della cipolla (BBCH 14).

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 2,0 l/ha.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 7-10 giorni.

ATTENZIONE:

La dose totale dell'agente utilizzato in due trattamenti non deve superare i 4,0 l/ha.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Cipolla da piantine, cipolla da cipollotti

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di presentazione della domanda:

Applicare il prodotto allo stadio fogliare della cipolla 1-4, al più tardi prima della comparsa della quinta foglia (BBCH 11-14), 7 giorni dopo la semina delle piantine o dei cipollotti.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

COMMENTI:

1. Non utilizzare il prodotto su cipolle destinate alla raccolta precoce con erba cipollina (vendute a mazzi).
2. L'agente può causare danni temporanei alle foglie di cipolla.

Porro da semina

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare l'agente nello stadio di 2-4 foglie (BBCH 12-14).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Porro dalle piantine

Dose massima per singola applicazione: 5,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 5,0 l/ha

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare l'agente nello stadio di 2-4 foglie (BBCH 12-14) 7-14 giorni dopo la semina delle piantine.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Aglione

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha. Dose raccomandata per singola applicazione: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare il prodotto dopo aver piantato gli spicchi d'aglio, allo stadio di 1-2 foglie (BBCH 11-12).

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Carote, prezzemolo a radice

Data di applicazione: applicare il prodotto nella fase fogliare delle piante coltivate (BBCH 12-14).

a) trattamento una tantum

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

O

b) procedura di divisione:

1° primo trattamento

Data di applicazione: nella fase delle 2-3 foglie di carota (BBCH 12-13).

Dose massima per singola applicazione: 3,0 l/ha.

Dose raccomandata per singola applicazione: 2,0-3,0 l/ha.

2° secondo trattamento

Data di applicazione: nello stadio di 4 foglie delle carote (BBCH 14).

Dose massima/consigliata per singola applicazione: 2,0 l/ha.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 7 giorni.

La dose totale in due trattamenti non deve superare i 5,0 l/ha.

Nelle prime fasi di crescita della carota, e in particolar modo del prezzemolo, è consigliabile utilizzare la dose più bassa tra quelle raccomandate.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Pastinaca

Dose massima per singola applicazione: 3,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 2,5 - 3,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Nelle prime fasi di crescita della pastinaca, è consigliabile utilizzare la dose più bassa tra quelle raccomandate.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare il prodotto nella fase di 2-4 foglie della pastinaca (BBCH 12-14).

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Sedano rapa, gambo di sedano

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare l'agente nello stadio di 2-4 foglie (BBCH 12-14) 7-14 giorni dopo la semina delle piantine.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Rafano

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di presentazione della domanda:

Applicare l'agente dopo aver piantato e formato le creste.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Fave, piselli, lupini, lupini gialli, lupini bianchi, lenticchie

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di presentazione della domanda:

Utilizzare l'agente fino a 5 giorni dopo la semina (BBCH 00-02).

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Nota:

seminare le fave a una profondità non inferiore a 7 cm, i piselli e i lupini a una profondità di 3-5 cm.

Girasole comune, soia, lino comune coltivato per la fibra, lino comune coltivato per i semi, vera canapa coltivata per la fibra, vera canapa coltivata per i semi

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha. Dose raccomandata per singola applicazione:

3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di applicazione: Utilizzare il prodotto entro 3 giorni dalla semina (BBCH 00-02).

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Nota: seminare i semi a una profondità non inferiore a 3 cm.

Piante ornamentali coltivate da semi, piante perenni, arbusti ornamentali

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 - 4,0 l/ha.

La dose dipende dalla specie e dallo stadio di sviluppo delle erbe infestanti.

Data di presentazione della domanda:

Applicare il prodotto prima dell'emergenza delle piante coltivate o subito dopo l'emergenza e, nel caso di arbusti, prima che inizi la fase di sviluppo delle foglie (BBCH 00-09).

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

SUCCESSO DELLE PIANTE

L'agente si decompone nel terreno senza rappresentare una minaccia per le piante successive.

PRECAUZIONI, PERIODI DI SOSPENSIONE E CONDIZIONI SPECIALI APPLICAZIONI

Periodo compreso tra l'ultima applicazione dell'agente e il giorno della raccolta della coltura (periodo di sospensione):

Cipolle destinate al consumo immediato dopo la raccolta, sedano - 75 giorni,

Pastinaca, rafano, prezzemolo, carote, porri - 80 giorni.

Sedano rapa - 100 giorni.

Grano invernale, segale primaverile, miglio comune, aglio, cipolle per la raccolta di bulbi secchi completamente sviluppati per la conservazione, fave, piselli da foraggio, lupino a foglia stretta, lupino giallo, lupino bianco, lenticchie, girasoli, soia, lino comune, canapa, piante ornamentali coltivate da semi, piante perenni, arbusti ornamentali - non necessari.

1. Per ottenere un'elevata efficacia nel controllo delle erbe infestanti, è consigliabile effettuare un'accurata ricoprendo il terreno e le piante infestanti con il liquido di lavorazione.
2. Il prodotto è più efficace se applicato su terreno umido e sulle erbacce presenti nel terreno. fasi iniziali dello sviluppo (germinazione ed emergenza).
3. In caso di numerose erbacce, è consigliabile utilizzare una quantità maggiore dalle dosi raccomandate.
4. Gli stadi avanzati di sviluppo della coltura possono rendere difficile il raggiungimento del terreno da parte del fluido di lavoro e erbacce controllate.
5. Per aumentare la copertura della superficie spruzzata con il liquido di lavoro e quindi aumentare l'efficacia del trattamento, nonché limitare la deriva e l'evaporazione del liquido durante il trattamento, è necessario osservare le seguenti note:
 - a) Il prodotto non deve essere utilizzato:
 - a velocità del vento superiori a 4 m/s (consigliata fino a 2 m/s),
 - in pieno sole e con bassa umidità dell'aria, • in terreni eccessivamente umidi o secchi.
 - b) Le procedure di irrorazione devono essere eseguite in condizioni ottimali, preferibilmente:
 - utilizzando solo irroratrici calibrate e barre irroratrici impostate su altezza non superiore a 50 cm sopra la superficie del terreno spruzzato,
 - con la ventola spenta quando si utilizzano spruzzatori con un ausiliario flusso d'aria,
 - ad una velocità dell'irroratrice non superiore a 8 km/h,
 - utilizzando ugelli di spruzzatura a goccia media a pressione ridotta, al fine di ottenendo una frazione maggiore di goccioline grossolane,
 - la sera o la mattina presto, quando la temperatura dell'aria non supera i 150°C e il grado di luce solare è basso,
 - con elevata umidità dell'aria.
6. Non utilizzare il prodotto:
 - su colture umide, • su piantagioni danneggiate da malattie o parassiti,
 - in condizioni di stress per le piante coltivate,
 - subito dopo l'irrigazione.
7. Durante l'uso del prodotto, non consentire:
 - deriva del liquido spruzzato sulle colture vicine,
 - sovrapposizione del liquido di lavoro alle giunzioni delle fasce di trattamento e delle capezzagne
8. Dopo l'applicazione di Fantasia 800 EC, possono verificarsi sintomi transitori di fitotossicità.
9. **Prima di utilizzare Fantasia 800 EC, si consiglia di effettuare un trattamento di prova su ogni varietà coltivata per verificare se si manifestano sintomi di danneggiamento delle piante.**

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO UTILIZZABILE

Prima di iniziare a preparare il liquido di lavoro, determinare esattamente la quantità necessaria. Versare la quantità misurata di agente nel serbatoio dell'irroratore parzialmente riempito d'acqua. (con il miscelatore acceso), aggiungere acqua fino alla quantità necessaria e mescolare accuratamente. Dopo aver versato l'agente nel serbatoio dell'irroratrice senza miscelatore idraulico, il liquido nel serbatoio

mescolare meccanicamente.

Sciacquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e versare il liquido di risciacquo nel serbatoio spruzzatore con liquido di lavoro.

In caso di interruzioni della spruzzatura, miscelare accuratamente il liquido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

GESTIONE DEI RESIDUI LIQUIDI UTILIZZABILI E PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

Il liquido e l'acqua rimanenti utilizzati per pulire l'attrezzatura devono essere:

- se possibile, dopo la diluizione, utilizzare sulla superficie su cui deve essere applicato la procedura è stata eseguita se possibile o
- smaltire utilizzando soluzioni tecniche che garantiscano la compatibilità biologica degradazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, o
- smaltire in altro modo, nel rispetto delle normative sui rifiuti.

Lavare accuratamente l'attrezzatura dopo il lavoro.

PRECAUZIONI PER LE PERSONE CHE UTILIZZANO L'AGENTE, I DIPENDENTI E SPETTATORI

Prima di utilizzare il prodotto, tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva dello spray e che hanno richiesto tali informazioni devono essere informate.

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Indossare guanti e indumenti protettivi per proteggersi dagli effetti dei prodotti fitosanitari durante la preparazione della soluzione di lavoro e durante il trattamento.

Il periodo che intercorre tra l'applicazione dell'agente e il giorno in cui persone e animali possono entrare nell'area in cui l'agente è stato applicato (periodo di prevenzione):

Non entrare finché il liquido non si è completamente asciugato sulla superficie della pianta.

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non contaminare l'acqua con il prodotto fitosanitario o il suo imballaggio. Non lavare le attrezzature in prossimità di acque superficiali. Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i canali di scolo di aziende agricole e strade.

Evitare il rilascio involontario nell'ambiente.

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario designare una zona di protezione dai bacini idrici e dai corsi d'acqua con una larghezza di:

- 10 m con l'impiego simultaneo di tecniche che riducono del 75% la deriva della soluzione di lavoro durante il trattamento nel caso di coltivazione di cereali invernali, segale primaverile, miglio
- comune 10 m con l'impiego simultaneo di tecniche che riducono del 50% la deriva della soluzione di lavoro durante il trattamento nel caso di coltivazione di cipolle, porri, aglio, carote, prezzemolo da radice, pastinaca, sedano da radice, sedano da foglia, rafano, favino, piselli da foraggio, lupino a foglia stretta, lupino giallo, lupino bianco, lenticchie, girasoli, soia, lino, canapa, piante ornamentali.

Per proteggere le piante e gli artropodi non bersaglio, è necessario designare una zona di protezione larga 5 m dalle aree non agricole.

CONDIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO SICURO DELL'AGENTE PROTETTIVO IMPIANTI E IMBALLAGGI

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto fitosanitario:

• in luoghi o strutture in cui vengono utilizzate soluzioni appropriate per proteggersi da contaminazione ambientale e accesso da parte di terzi,
• nella confezione originale, in modo da evitare il contatto con alimenti, bevande o nutrire, in un luogo fresco e ben ventilato.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Restituire al venditore gli imballaggi vuoti contenenti prodotti fitosanitari pericolosi.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, trattamento sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o medico. NON indurre il vomito.

In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico.

Periodo di validità: 2 anni.

Data di produzione -

Contenuto netto -

Numero di lotto -