

Bijlage bij het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 553/2021d van 01/09/2021
tot wijziging van de vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 133/2020 van 23/10/2020.

Vergunninghouder:

Albaugh TKI doo, Grajski trg 21, 2327 Rače, Republiek Slovenië, tel.: +386 2 60 90 211 Gebruiksaanwijzingen: tel.: 221 253 452, www.albaugh.eu

FANTASIA 800 EC

Het product is bedoeld voor gebruik door professionele gebruikers.

Actief gehalte aan stof:

prosulfocarb (een verbinding uit de carbamaatgroep) – 800 g/l (78,43%)

Vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 133/2020 van 23 oktober
2020, laatst gewijzigd bij besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 553/2021d van 1 september 2021.

	
Gevaar	
H304 H315 H317 H319 H410	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Irriteert de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Irriterend voor de ogen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH 401	Om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden, gaat u als volgt te werk: volgens de gebruiksaanwijzing.
P261 P280 P301+P310 P333+P313 P331 P391	Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming. BIJ INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Indien huidirritatie of uitslag optreedt: Raadpleeg een arts/arts. GEEN braken opwekken. Verzamel het gemorste water.

WERKINGSBESCHRIJVING

HERBICIDE in de vorm van een concentraat voor het bereiden van een waterige emulsie (EC), toegepast op de bodem en het loof, bestemd voor de selectieve bestrijding van bepaalde eenjarige eenzaadlobbige en tweezaadlobbige onkruiden.

ACTIE TEGEN ONKRUID

Het middel wordt binnen 1 uur na toepassing door het onkruid opgenomen.

Regenval na deze datum vermindert de effectiviteit van het product niet. De optimale toepassingsperiode is vóór en kort na de opkomst van onkruid, in de beginfase van onkruidontwikkeling.

Gevoelige onkruiden:	gewone vogelmuur, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, graanbrem, klimopereprijs, Perzische ereprijs, walstro windend.
Matig gevoelige onkruiden:	Akkerviooltje, akkerpapaver, winde, gewone kamille, straatgras.
Resistente onkruiden:	Eenzijdig onkruid.

TOEPASSING VAN DE AGENT

Het middel is bedoeld voor gebruik op zelfrijdende veldspuiten of op tractoren gemonteerde veldspuiten.

Wintertarwe

Maximale/aanbevolen dosis voor eenmalige toepassing: 3,0 l/ha.

Aanvraagdatum:

Gebruik het middel in de herfst, na het zaaien van de granen, tot de 3-bladfase (BBCH 00-13).

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

TOEPASSING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN KLEINE GEWASSEN EN TOEPASSINGEN

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de effectiviteit en fytotoxiciteit van een gewasbeschermingsmiddel dat in kleine teelten wordt gebruikt.

Voorjaarsrogge, gewone gierst

Maximale/aanbevolen dosis voor eenmalige toepassing: 3,0 l/ha.

Aanvraagdatum:

Gebruik het middel na het zaaien van het gewas, tot het 3-bladstadium (BBCH 00-13).

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Uien van zaaien

Aanvraagdatum:

Pas het middel toe na opkomst, wanneer het eerste echte blad minimaal 3 cm hoog is, maar uiterlijk voordat het 5e blad duidelijk zichtbaar is (BBCH 11-14).

a) eenmalige behandeling

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

of

b) splitsingsprocedure

1e behandeling

Toepassingsdatum: gebruik het product in het 1-2 uienbladstadium (BBCH 11-12).

Maximale/aanbevolen dosis voor eenmalige toepassing: 2,0 l/ha.

ÿ tweede behandeling

Toepassingsdatum: gebruik het product in de 4-bladfase van uien (BBCH 14).

Maximale/aanbevolen dosis voor eenmalige toepassing: 2,0 l/ha.

Interval tussen de behandelingen: minimaal 7-10 dagen.

AANDACHT:

De totale dosis van het middel in twee behandelingen mag niet meer dan 4,0 l/ha bedragen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Ui van zaailingen, ui van bosuitjes

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

Aanvraagdatum:

Toepassen in de uienbladstadia van 1-4, uiterlijk voordat het 5e blad verschijnt (BBCH 11-14), 7 dagen na het planten van de zaailingen of bosuien.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

OPMERKINGEN:

1. Gebruik het product niet op uien die bestemd zijn voor een vroege oogst met bieslook (verkocht in bosjes).
2. Het middel kan tijdelijke schade aan uienbladeren veroorzaken.

Prei van zaaïen

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

Aanvraagdatum:

Gebruik het middel in het 2-4 bladstadium (BBCH 12-14).

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Prei uit zaailingen

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 5,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 5,0 l/ha

Aanvraagdatum:

Gebruik het middel in het 2-4 bladstadium (BBCH 12-14) 7-14 dagen na het planten van de zaailingen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Knoflook

Maximale dosering voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha. Aanbevolen dosering voor een enkele toepassing: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

Aanvraagdatum:

Gebruik het product na het planten van knoflooktenen, in het 1-2 bladstadium (BBCH 11-12).

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.
Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.
Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Wortelen, wortelpeterselie

Toepassingsdatum: product toepassen in de 2-4 bladfase van landbouwgewassen (BBCH 12-14).

a) eenmalige behandeling

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.
Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.
De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

of

b) splitsingsprocedure:

• eerste behandeling

Toepassingsdatum: in de 2-3 wortelbladfase (BBCH 12-13).
Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.
Aanbevolen dosering voor een enkele toepassing: 2,0-3,0 l/ha.

• tweede behandeling

Toepassingsdatum: in het 4-bladstadium van wortelen (BBCH 14).
Maximale/aanbevolen dosis voor eenmalige toepassing: 2,0 l/ha.

Interval tussen de behandelingen: minimaal 7 dagen.

De totale dosis in twee behandelingen mag niet meer dan 5,0 l/ha bedragen.

In de beginfase van de wortelgroei, en met name bij peterselie, is het raadzaam om de laagste van de aanbevolen doseringen te gebruiken.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.
Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Pastinaak

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.
Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,5 - 3,0 l/ha.
De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.
In de beginfase van de groei van pastinaak is het raadzaam om de laagste van de aanbevolen doseringen te gebruiken.
Aanvraagdatum:

Gebruik het product bij pastinaken in het 2-4 bladstadium (BBCH 12-14).
Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.
Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.
Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Knolselderij, stengel selderij

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.
Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.
De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.
Aanvraagdatum:
Gebruik het middel in het 2-4 bladstadium (BBCH 12-14) 7-14 dagen na het planten van de zaailingen.
Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.
Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.
Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Mierikswortel

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.
Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.
Aanvraagdatum:

Breng het middel aan na het planten en het vormen van de ruggen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Veldbonen, velderwten, smalbladige lupine, gele lupine, witte lupine, linzen

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

Aanvraagdatum:

Gebruik het middel tot 5 dagen na zaai (BBCH 00-02).

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Let op:

Zaai tuinbonen minimaal 7 cm diep, erwten en lupine 3-5 cm diep.

Gewone zonnebloem, sojaboon, gewoon vlas geteeld voor vezels, gewoon vlas geteeld voor zaden, echte hennep geteeld voor vezels, echte hennep geteeld voor zaden

Maximale dosering voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha. Aanbevolen dosering voor een enkele toepassing: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

Toepassingsdatum: Product binnen 3 dagen na zaai gebruiken (BBCH 00-02).

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Let op: Zaai de zaden minimaal 3 cm diep.

Sierplanten gekweekt uit zaad, vaste planten, sierheesters

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 - 4,0 l/ha.

De dosisgrootte hangt af van de soort onkruid en het ontwikkelingsstadium ervan.

Aanvraagdatum:

Breng het product aan vóór de opkomst van de gewassen of kort na opkomst, en bij struiken vóór het begin van de bladontwikkeling (BBCH 00-09).

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

PLANTENSUCCES Het middel

ontleedt in de grond zonder een gevaar te vormen voor de opvolgende planten.

VOORZORGSMaatregelen, wachttijden en bijzondere voorwaarden toepassingen

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst van het gewas (wachttijd):

Uien bestemd voor consumptie direct na de oogst, selderij - 75 dagen,

Pastinaken, mierikswortel, wortelpeterselie, wortelen, prei - 80 dagen.

Knolselderij - 100 dagen.

Wintertarwe, zomerrogge, gierst, knoflook, uien voor de oogst, volledig ontwikkelde droge bollen voor opslag, veldbonen, voedererwten, smalbladige lupine, gele lupine, witte lupine, linzen, zonnebloemen, sojabonen, gewoon vlas, hennep, sierplanten uit zaad, vaste planten, sierheesters - niet vereist.

1. Om een hoge effectiviteit van onkruidbestrijding te bereiken, is het raadzaam om grondig het bedekken van de grond en de onkruidplanten met de werkvloeistof.
2. Het product is het meest effectief als het wordt toegepast op vochtige grond en op onkruid dat zich in de grond bevindt. vroege ontwikkelingsstadia (kieming en opkomst).
3. Bij veel onkruid is het raadzaam om een hogere dosering te gebruiken van de aanbevolen doseringen.
4. Vergevoerde ontwikkelingsstadia van het gewas kunnen het voor de werkvloeistof moeilijk maken om de bodem te bereiken en onkruidbestrijding.
5. Om de dekking van het bespoten oppervlak met de werkvloeistof te vergroten en zo de effectiviteit van de behandeling te vergroten en de drift en verdamping van de vloeistof tijdens de behandeling te beperken, moeten de volgende opmerkingen in acht worden genomen:
 - a) Het product mag niet gebruikt worden:
 - bij windsnelheden van meer dan 4 m/s (aanbevolen tot 2 m/s),
 - in de volle zon en bij een lage luchtvochtigheid, • in te vochtige of te droge grond.
 - b) Spuitprocedures moeten worden uitgevoerd onder optimale omstandigheden, bij voorkeur:
 - alleen gebruik maken van gekalibreerde spuitmachines en spuitbomen die zijn afgesteld op hoogte niet groter dan 50 cm boven het bespoten bodemoppervlak,
 - met de ventilator uitgeschakeld bij gebruik van sproeiers met een hulpstuk luchtstroom,
 - bij een spuitsnelheid van maximaal 8 km/u,
 - met behulp van middelgrote druppelspuitmonden bij verlaagde druk, om het verkrijgen van een groter deel van grove druppels,
 - 's avonds of in de vroege ochtend, wanneer de luchttemperatuur niet hoger is dan 15°C en de hoeveelheid zonlicht laag is,
 - met een hoge luchtvochtigheid.
6. Gebruik het product niet:
 - op natte gewassen, • op plantages die beschadigd zijn door ziekten of plagen,
 - onder stressvolle omstandigheden voor landbouwgewassen,
 - direct na de irrigatie.
7. Bij gebruik van het product mag u het volgende niet toestaan:
 - het afdrijven van de spuitvloeistof op naburige gewassen,
 - overlapping van de werkvloeistof op de kruisingen van de behandelingsstroken en kopakkers
8. Na het aanbrengen van Fantasia 800 EC kunnen er tijdelijke symptomen van fytotoxiciteit optreden.
9. **Voordat u Fantasia 800 EC gebruikt, is het raadzaam om eerst een proefbehandeling uit te voeren op elke gekweekte variëteit, om te controleren of er symptomen van plantenschade optreden.**

BEREIDING VAN BRUIKBARE VLOEISTOF

Voordat u begint met het bereiden van de werkvloeistof, bepaalt u nauwkeurig hoeveel u nodig hebt.

Giet de afgemeten hoeveelheid van het middel in de spuittank die gedeeltelijk met water is gevuld.

(met de mixer aan), vul bij met water tot de gewenste hoeveelheid en meng grondig. Nadat het middel in de spuittank is gegoten zonder hydraulische mixer, wordt de vloeistof in de tank gefilterd.

mechanisch mengen.

Spoel de lege containers drie keer om met water en giet het spoelwater in de tank.

sproeier met werkvloeistof.

Bij onderbrekingen in het spuitwerk, mengt u de werkvloeistof grondig in de spuittank voordat u het werk hervat.

BEHANDELING VAN BRUIKBARE VLOEIBARE RESIDUEN EN REINIGING VAN APPARATUUR

De resterende vloeistof en het water die voor het reinigen van de apparatuur worden gebruikt, moeten:

• indien mogelijk, na verdunning, gebruiken op het oppervlak waarop het moet worden aangebracht
de procedure werd uitgevoerd indien mogelijk of

• afvoeren met behulp van technische oplossingen die biologische
afbraak van werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, of

• op een andere manier afvoeren, in overeenstemming met de afvalvoorschriften.

Maak de apparatuur na het werk grondig schoon.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PERSONEN DIE DE AGENT GEBRUIKEN, MEDEWERKERS EN OMSTANDERS

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk in aanraking komen met de
spuitnevel en die om dergelijke informatie hebben gevraagd, worden geïnformeerd.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Draag beschermende handschoenen en kleding ter bescherming tegen de effecten van
gewasbeschermingsmiddelen tijdens het bereiden van de werkoplossing en tijdens de behandeling.

De periode vanaf het aanbrengen van het middel tot de dag waarop mensen en dieren het gebied mogen
betreden waar het middel is aangebracht (preventieperiode):

Ga pas naar binnen als de vloeistof volledig op het plantenoppervlak is opgedroogd.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of de verpakking. Was apparatuur niet in de
buurt van oppervlaktewater. Voorkom waterverontreiniging via afwateringssloten van landbouwbedrijven en
wegen.

Voorkom onbedoelde lozing in het milieu.

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk om een beschermingszone aan te wijzen voor reservoirs
en waterlopen met een breedte van:

• 10 m met gelijktijdig gebruik van technieken die de drift van de werkoplossing tijdens de behandeling met
75% verminderen bij de teelt van wintergranen, zomerrogge, gewone gierst • 10 m met
gelijktijdig gebruik van technieken die de drift van de werkoplossing tijdens de behandeling met 50%
verminderen bij de teelt van uien, prei, knoflook, wortelen, wortelpeterselie, pastinaken, wortelbleekselderij,
bladselderij, mierikswortel, veldbonen, voedererwten, smalbladige lupine, gele lupine, witte lupine, linzen,
zonnebloemen, sojabonen, vlas, hennep, sierplanten.

Om niet-doelsoorten en geledpotigen te beschermen, is het noodzakelijk om een beschermingszone van 5 m
breed af te bakenen vanaf niet-agrarische gebieden.

VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMENDE MIDDEL PLANTEN EN VERPAKKINGEN

Buiten bereik van kinderen houden.

Bewaar het gewasbeschermingsmiddel:

- op plaatsen of in faciliteiten waar geschikte oplossingen worden gebruikt om te beschermen tegen milieuverontreiniging en toegang door derden,
- in de originele verpakking, op een manier die contact met voedsel, dranken of
Voer op een goed geventileerde, koele plaats.

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Ongebruikte producten moeten worden overgedragen aan een instantie die bevoegd is om gevaarlijk afval te verzamelen.

Lever de lege verpakkingen met gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in bij de verkoper.

E.H.B.O

Tegengif: geen, symptomatisch behandelen.

Indien u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

BIJ INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of
arts. GEEN braken opwekken.

Indien huidirritatie of uitslag optreedt: Raadpleeg een arts/arts.

Geldigheidsduur – 2 jaar.

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -