

Bilaga till beslutet från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-553/2021d av den 01/09/2021
om ändring av tillståndet från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-133/2020 av den 23/10/2020.

Tillståndshavare: Albaugh

TKI doo, Grajski trg 21, 2327 Rače, Slovenien, tel.: +386 2 60 90 211 Användarinstruktioner: tel.: 221 253 452, www.albaugh.eu

FANTASIA 800 EC

Produkten är avsedd för professionella användare.

Aktiv substansinnehåll:
prosulfokarb (en förening från karbamatgruppen) – 800 g/l (78,43 %)

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-133/2020 av den 23 oktober 2020,
senast ändrat genom beslut från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-553/2021d av den 1 september 2021.

	
Fara	
H304 H315 H317 H319 H410	Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar ögonen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, orsakar långvariga effekter.
EUH 401 För	att undvika risker för människors hälsa och miljön, gör följande: enligt bruksanvisningen.
P261 P280 P301+P310 P333+P313 P331 P391	Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarhjälp. Framkalla INTE kräkning. Samla upp spill.

VERKANBESKRIVNING

HERBICIDMEDEL i form av ett koncentrat för framställning av en vattenhaltig emulsion (EC), applicerad på jord och bladverk, avsedd för selektiv bekämpning av vissa ettåriga enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga ogräs.

ÅTGÄRDER MOT OGRÄS

Medlet tas upp av ogräs inom 1 timme efter applicering.

Regn som inträffar efter detta datum minskar inte produktens effektivitet. Den optimala appliceringsperioden är före och strax efter ogräsets uppkomst, i de tidiga stadierna av ogräsets utveckling.

Känsliga ogräs:	vanlig våtmark, lila nässla, vit gåsfot, sådeskvast, murgröna, persisk sängört, sänghalm klångig.
Måttligt känsliga ogräs:	Åkerviol, åkervallmo, åkervinda, vanlig kamomill, ettårig ängsgröe.
Resistenta ogräs:	Ensidigt ogräs.

ANVÄNDNING AV MEDELET

Medlet är avsett för användning med självgående eller traktormonterade fältsprutor.

Vintervete

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Ansökningsdatum:

Använd medlet på hösten, efter sådd av spannmål, fram till 3-bladsfasen (BBCH 00-13).

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL I MINDRE GRÖDOR OCH ANVÄNDNINGAR

Användaren är ensamt ansvarig för effektiviteten och fytotoxiciteten hos ett växtskyddsmedel som används i mindre grödor.

Vårråg, hirs

Maximal/rekommenderad dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Ansökningsdatum:

Använd medlet efter sådd av grödan, upp till 3-bladsstadiet (BBCH 00-13).

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Lök från sådd

Ansökningsdatum:

Applicera medlet efter uppkomst, när det första riktiga bladet är minst 3 cm högt, senast innan det femte bladet är tydligt synligt (BBCH 11-14).

a) engångsbehandling

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

eller

b) delat förfarande

1) första behandlingen

Appliceringsdatum: använd produkten i 1-2 lökbladsstadiet (BBCH 11-12).

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 2,0 l/ha.

Ö andra behandlingen

Appliceringsdatum: använd produkten i lökens 4-bladsfas (BBCH 14).

Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 2,0 l/ha.

Intervall mellan behandlingar: minst 7–10 dagar.

UPPMÄRKSAMHET:

Den totala dosen av medlet som används vid två behandlingar bör inte överstiga 4,0 l/ha.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Lök från plantor, lök från salladslök

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

Ansökningsdatum:

Applicera medlet i lökbladstadiet 1-4, senast innan det 5:e bladet visar sig (BBCH 11-14), 7 dagar efter plantering av plantorna eller salladslöken.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

KOMMENTARER:

1. Använd inte produkten på lök avsedd för tidig skörd tillsammans med gräslök (säljs i knippen).
2. Medlet kan orsaka tillfälliga skador på lökblad.

Purjolök från sådd

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

Ansökningsdatum:

Använd medlet i 2-4-bladsstadiet (BBCH 12-14).

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Purjolök från plantor

Maximal dos för engångsbehandling: 5,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–5,0 l/ha

Ansökningsdatum:

Använd medlet i 2-4-bladsstadiet (BBCH 12-14) 7-14 dagar efter plantering av plantorna.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Vitlök

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha. Rekommenderad dos för engångsbehandling: 3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

Ansökningsdatum:

Använd produkten efter plantering av vitlöksklyftor, i 1-2 bladstadiet (BBCH 11-12).

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.
Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.
Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Morötter, rotpersilja

Appliceringsdatum: applicera produkten i 2-4-bladsfasen hos grödor (BBCH 12-14).

a) engångsbehandling

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.
Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.
Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

eller

b) delat förfarande:

ö första behandlingen

Appliceringsdatum: i 2-3 morotsbladsfasen (BBCH 12-13).
Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.
Rekommenderad dos för engångsbehandling: 2,0–3,0 l/ha.

ö andra behandlingen

Appliceringsdatum: i morötternas 4-bladsstadium (BBCH 14).
Maximal/rekommenderad dos för engångsanvändning: 2,0 l/ha.

Intervall mellan behandlingar: minst 7 dagar.

Den totala dosen vid två behandlingar bör inte överstiga 5,0 l/ha.

I de tidiga stadierna av morotstillväxt, och särskilt hos persilja, är det lämpligt att använda den lägre av de rekommenderade doserna.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.
Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Palsternacka

Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.
Rekommenderad dos för engångsbruk: 2,5–3,0 l/ha.
Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.
I de tidiga stadierna av palsternacks tillväxt är det lämpligt att använda den lägre av de rekommenderade doserna.
Ansökningsdatum:

Använd produkten i palsternackans 2-4-bladsstadium (BBCH 12-14).

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.
Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.
Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Sellerirot, selleristjälk

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.
Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.
Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.
Ansökningsdatum:

Använd medlet i 2-4-bladsstadiet (BBCH 12-14) 7-14 dagar efter plantering av plantorna.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.
Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.
Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Pepparrot

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.
Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.
Ansökningsdatum:

Applicera medlet efter plantering och bildande av åsar.

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Åkerbönor, åkerärtor, smalbladig lupin, gul lupin, vit lupin, linser

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

Ansökningsdatum:

Använd medlet upp till 5 dagar efter sådd (BBCH 00-02).

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Obs: Så

bondbönor till ett djup av minst 7 cm, ärtor och lupin till ett djup av 3-5 cm.

Vanlig solros, sojaböna, vanlig lin odlad för fiber, vanlig lin odlad för frön, äkta hampa odlad för fiber, äkta hampa odlad för frön

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha. Rekommenderad dos för engångsbehandling:

3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

Appliceringsdatum: Använd produkten inom 3 dagar efter sådd (BBCH 00-02).

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Obs: Så fröna till ett djup av minst 3 cm.

Prydnadsväxter odlade från frön, perenner, prydnadsbuskar

Maximal dos för engångsbehandling: 4,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3,0–4,0 l/ha.

Dosstorleken beror på ogräsart och utvecklingsstadium.

Ansökningsdatum:

Applicera produkten före uppkomst av grödor eller tidigt efter uppkomst, och när det gäller buskar – innan bladutvecklingsfasen börjar (BBCH 00-09).

Rekommenderad vattenmängd: 200-300 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

VÄXTFRAMGÅNG Medlet

bryts ner i jorden utan att utgöra ett hot mot efterföljande växter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, KARENSTIDER OCH SÄRSKILDA VILLKOR ANVÄNDNINGAR

Period från sista appliceringen av medlet till skördagen (karensperioden):

Lök avsedd för konsumtion omedelbart efter skörd, selleri - 75 dagar,

Palsternacka, pepparrot, rotpersilja, morötter, purjolök - 80 dagar.

Sellerirot - 100 dagar.

Vintervete, vårråg, hirs, vitlök, lök för skörd fullt utvecklade torra lökar för lagring, åkerbönor, foderärtor, smalbladig lupin, gul lupin, vit lupin, linser, solrosor, sojabönor, vanlig lin, hampa, prydnadsväxter odlade från frön, perenner, prydnadsbuskar - ej obligatoriskt.

1. För att uppnå hög effektivitet i ogräsbekämpningen är det lämpligt att noggrant täcka jorden och ogräsväxterna med arbetsvätskan.
2. Produkten är mest effektiv när den appliceras på fuktig jord och ogräs som finns i jorden. tidiga utvecklingsstadier (groning och uppkomst).
3. Vid många ogräs är det lämpligt att använda en högre
från de rekommenderade doserna.
4. Grödans avancerade utvecklingsstadier kan göra det svårt för arbetsvätskan att nå jorden och kontrollerade ogräs.
5. För att öka täckningen av den sprayade ytan med arbetsvätskan, och därmed öka behandlingens effektivitet samt begränsa avdrift och avdunstning av vätskan under behandlingen, bör följande observeras:
 - a) Produkten bör inte användas:
• vid vindhastigheter över 4 m/s (rekommenderas upp till 2 m/s),
• i full sol och låg luftfuktighet, • i alltför fuktiga eller torra jordar.
 - b) Sprutningsprocedurer bör utföras under optimala förhållanden, helst:
• endast med kalibrerade sprutor och sprutramper inställda på höjd högst 50 cm över den besprutade jordytan,
• med fläkten avstängd när sprutor med hjälp av en hjälpanordning används luftström,
• vid en spruthastighet som inte överstiger 8 km/h,
• med hjälp av sprutmunstycken med medelstora droppar vid reducerat tryck, för att att få en större andel grova droppar,
• på kvällen eller tidigt på morgonen, när lufttemperaturen inte överstiger 150°C och solljuset är lågt,
• med hög luftfuktighet.
6. Använd inte produkten:
• på våta grödor, • på planteringar som skadats av sjukdomar eller skadedjur,
• under stressiga förhållanden för grödor,
• omedelbart efter bevattning.
7. Tillåt inte följande när du använder produkten:
• avdrift av sprutvätskan på angränsande grödor,
• överlappning av arbetsvätskan vid korsningarna mellan behandlingsremsorna och vändtegen
8. Efter applicering av Fantasia 800 EC kan övergående symtom på fytotoxicitet uppstå.
9. **Innan Fantasia 800 EC används rekommenderas det att utföra en testbehandling på varje odlad sort för att kontrollera om några symtom på växtskador uppstår.**

BEREDNING AV ANVÄNDBAR VÄTSKA

Innan du börjar förbereda arbetsvätskan, bestäm exakt hur mycket som behövs.

Håll den uppmätta mängden medlet i sprutbehållaren som är delvis fylld med vatten.

(med mixern på), fyll på med vatten till önskad mängd och blanda noggrant. Efter att ha hållt medlet i spruttanken utan hydraulisk mixer, ska vätskan i tanken

blanda mekaniskt.

Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och håll sköljvätskan i tanken.

spruta med arbetsvätska.

Vid avbrott i sprutningen, blanda arbetsvätskan noggrant i sprutbehållaren innan arbetet återupptas.

HANTERING AV ANVÄNDBARA VÄTSKERESTER OCH RENGÖRING AV UTRUSTNING

Återstående vätska och vatten som används för att rengöra utrustningen bör vara:

• om möjligt, efter utspädning, använd på den yta som det ska appliceras på
ingreppet utfördes om möjligt eller

• avyttra med hjälp av tekniska lösningar som säkerställer biologiska
nedbrytning av aktiva substanser i växtskyddsmedel, eller

• kassera på annat sätt, i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Tvätta utrustningen noggrant efter arbetet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM ANVÄNDER AGENTEN, ANSTÄLLDA OCH ÅSKÅDARE

~~Innan produkten används bör alla berörda parter som kan komma att exponeras för sprutavdrift och som har begärt sådan information informeras.~~

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Använd skyddshandskar och skyddskläder för att skydda mot effekterna av växtskyddsmedel när du beredning av arbetslösningen och under behandlingen.

Perioden från applicering av medlet till den dag då människor och djur får vistas i området där medlet har applicerats (förebyggande period):

Gå inte in i växten förrän vätskan har torkat helt på ytan.

MILJÖFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess förpackning. Tvätta inte utrustning nära ytvatten. Undvik vattenförorening genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

Undvik oavsiktliga utsläpp i miljön.

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en skyddszon mot vattendrag och reservoarar med en bredd av:

• 10 m med samtidig användning av tekniker som minskar avdriften av arbetslösningen under behandlingen med 75 % vid odling av vintersäd, vårråg och hirs. • 10 m med samtidig användning av

tekniker som minskar avdriften av arbetslösningen under behandlingen med 50 % vid odling av lök, purjolök, vitlök, morötter, rotpersilja, palsternackor, rotselleri, bladselleri, pepparrot, åkerbönor, foderärtor, smalbladig lupin, gul lupin, vit lupin, linser, solrosor, sojabönor, lin, hampa och prydnadsväxter.

För att skydda icke-målväxter och leddjur är det nödvändigt att utse en 5 m bred skyddszon från icke-jordbruksområden.

FÖRHÅLL FÖR FÖRVARING OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV SKYDDSMEDELET VÄXTER OCH FÖRPACKNINGAR

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara växtskyddsmedlet:

• i på platser eller i anläggningar där lämpliga lösningar används för att skydda mot miljöföroreningar och åtkomst av tredje part,
• i originalförpackningen, på ett sätt som förhindrar kontakt med mat, dryck eller utfodring, på en välventilerad, sval plats.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar av växtskyddsmedel för andra ändamål.

All oanvänd produkt ska överföras till en enhet som är auktoriserad för insamling av farligt avfall.

Returnera den tomma förpackningen som innehåller farliga växtskyddsmedel till säljaren.

FÖRSTA HJÄLPEN

Motgift: inget, behandla symptomatiskt.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Framkalla INTE kräkning.

Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarhjälp.

Giltighetstid – 2 år.

Produktionsdatum -

Nätinnehåll -

Batchnummer -