

Bilag til Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters afgørelse nr. R-301/2017d af 27.
juni 2017 om ændring af Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikters tilladelse nr. R-129/2016 af 6. maj 2016.

Indehaver af godkendelse:

Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republiken
Irland, Tlf.: +353 1 811 2900, Fax: +353 1 822 46 78, E-mail: info@barclay.ie

GALLUP SPECIAL 360

Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere.

Aktivt stofindhold: glyphosat i form
af isopropylaminsalt (en forbindelse fra aminofosfonatgruppen) - 360 g/l
(30,77%)

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Landdistriktsudvikling nr. R - 129/2016 af
06/05/2016, senest ændret ved Ministeriet for Landbrug og Landdistriktsudviklings afgørelse nr. R - 301/2017d af 27/06/2017.

EUH401 - Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

BESKRIVELSE AF HANDLINGEN

Gallup Special 360 er et herbicid i form af et koncentrat til fremstilling af en vandig opløsning, der anvendes bladvis, i dyrkning af vinterhvede, vinterbyg og vinterraps, efter høst af afgrøder (stub), i æbleplantager og i uudnyttede landbrugsområder.

Ifølge HRAC-klassificeringen er aktivstoffet glyphosat klassificeret i gruppe G. Produktet er beregnet til brug med selvkørende eller traktormonterede marksprøjter og håndsprøjter.

INDSATS MOD UKRUDS

Gallup Special 360 er et bladherbicid med systemisk virkning. Det absorberes af plantens grønne dele (blade, grønne skud og ikke-træagtig bark), spredt sig derefter gennem planten og når de underjordiske dele (rødder, udløbere osv.), hvilket forårsager deres død. De første symptomer på midlets virkning (gulfarvning og visnen) er synlige 7-10 dage efter behandlingen. Fuldstændig plantedød indtræffer efter cirka 3 uger.

Høj temperatur og luftfugtighed samt stærkt sollys fremskynder midlets virkning.

Følsomme ukrudtsorter:

ved en dosis på 3 l/ha: stallgræs, almindelig fuglegræs, spolvækst, almindelig hyrdetaske, enårig engrapgræs, ved en dosis på 4 l/ha:
stedmoderblomst, hvid dødnælde, rosa dødnælde, hvidkløver, hundefod, hybridlucerne, duftløs kamille, kvik, tormentil, stallgræs, timotej, ved en dosis på 5 l/ha: lille storkenæb, krybende ranunkel, purpurdødnælde, almindelig brombær, hvid gåsefod, lille burre, almindelig guleros, almindelig mælkebøtte, marktidse, almindelig nælde, marksyre.

Moderat følsomt ukrudt:
ved en dosis på 5 l/ha: kirtelpileurt.

Resistent ukrudt: padderokke.

ANVENDELSE AF AGENTET

Bemærk: Brug ikke Gallup Special 360 plantebeskyttelsesmiddel i offentlige parker og haver, sports- og rekreative områder, skoler, børnehaver, vuggestuer og sundhedsfaciliteter.

A. Efter høst af afgrøderne, før dyrkning efter høst påbegyndes for at bekæmpelse af kvikgræs og andet ukrudt (stubbe)

Anvendelsesperiode: Påfør produktet fra midten af august til sent efterår på grønt, intensivt voksende ukrudt.

Udfør ikke jordbearbejdning efter høst af afgrøden og før påføring af produktet. På påføringstidspunktet skal kvikgræs nå en højde på 10-25 cm og have udviklet mindst 3-4 fuldt udviklede blade. Enårige enkimbladede ukrudtsplanter skal være mindst 5 cm høje, og tokimbladede ukrudtsplanter skal have udviklet to fuldt udviklede blade.

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 4 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3-4 l/ha.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen – 1.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

B. Æbletræ

Anvendelsesperiode: Påfør produktet fra forår til efterår på grønt ukrudt under dets intensive vækst, i den dosis, der er nødvendig for at ødelægge de eksisterende ukrudtsarter.

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 5 l/ha.

Anbefalet dosis til enkelt anvendelse: 3-5 l/ha.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen – 1.

Anbefalet vandmængde: 200-300 l/ha.

Bemærkninger: 1. Brug en højere dosis af midlet i tørt vejr, især i tilfælde af stærke ukrudtsangreb af kvikgræs.

2. Dyrkningsbehandlinger kan påbegyndes, når der viser sig tydelige tegn på ukrudtsbekæmpelse. symptomer på midlets virkning (visnen og gulfarvning).

3. Sprøjt sikkert, helst med sprøjtepistoler med låg, så dråber af sprøjtevæsken ikke kommer på blade, skud og ikke-træagtig bark på træer på grund af risikoen for at beskadige planterne.

C. Uudnyttet landbrugsjord

Anvendes på intensivt voksende ukrudt.

Behandlingsdato:

- om foråret – i perioden med intensiv plantevækst indtil blomstringsfasen
- om efteråret – hvis efterårsdyrkning er nødvendig og såning.

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 5 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 4-5 l/ha.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen – 1.
Anbefalet vandmængde: 100-300 l/ha.

Bemærk:

Ved brug af vand i en mængde på 100-150 l/ha skal der anvendes dyser, der sikrer sprøjtning med fine dråber, og ved brug af vand i en mængde på 200-300 l/ha skal der anvendes dyser, der sikrer sprøjtning med mellemstore dråber.

D. Marker før kornhøst - bekæmpelse af

kvikgræs og andet ukrudt, der forhindrer høst og udtørring

Opmærksomhed:

Behandlingen kan kun udføres i tilfælde og på steder, hvor der er en høj tæthed af ukrudt, der gør høst umulig, eller når landbrugsmæssige eller vejrmæssige forhold forhindrer kornet i at nå det samtidige modningsstadium til høst på en naturlig måde.

Vinterhvede, vinterbyg

Maksimal dosis til engangsbrug: 4 l/ha

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3 l/ha i 100-150 l vand eller 4 l/ha i 200-300 l vand

Ansøgningsdato:

Midlet bør anvendes i kornets voksagtige modenhedsfase, når dets fugtighedsindhold er 20-30%, dvs. 10-14 dage før den forventede høst.

På behandlingstidspunktet skal ukrudtet være grønt og i en intensiv udviklingsfase.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1

Bemærk

1. For lettere høstning, brug den laveste af de anbefalede doser.
2. I perioder med høje dagtemperaturer bør behandlingen udføres om morgenen eller sidst på eftermiddagen.
3. Høsten skal udføres i en ret vinkel eller i modsat retning af sprøjtens passage.
4. Brug ikke midlet i kornsorter med udsåede bælgplanter. 5. Brug ikke midlet i kornsorter beregnet til såsæd.
6. Halm fra korn bør ikke bruges som substrat eller havedækning; det kan bruges som foder eller strøelse til dyr.

E. Marker før høst af vinterraps

- bekæmpelse af kvikgræs og andet ukrudt, der forhindrer høst og udtørring

Bemærk:

Det er tilladt at bruge vinterraps eller dele heraf på en plantage i tilfælde af et højt ukrudtsangreb, der forhindrer høst, eller når afgrødens tilstand eller vejrforholdene forhindrer rapsen i naturligt at nå det samtidige modningsstadium til høst.

Maksimal dosis til engangsbrug: 4 l/ha

Anbefalet dosis til engangsbrug: 3 l/ha i 100-150 l vand eller 4 l/ha i 200-300 l vand

Ansøgningsdato:

Påfør produktet, når frøets fugtighedsindhold (målt med en fugtighedsmåler) er under 30 %. Ukrudtet skal være grønt og i aktiv vækst på påføringstidspunktet.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1

Bemærk:

Må ikke anvendes på frøafgrøder.

PLANTESUCCE: Alle afgrøder

kan dyrkes på en mark, hvor Gallup Special 360 er blevet anvendt. Dyrkning, såning eller plantering kan begynde, når ukrudtet viser symptomer på stoffets virkning (gulning og visnen), men tidligst efter 5-7 dage.

FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER FOR BRUG I FORBINDELSE MED GOD LANDBRUGSPRAKSIS 1. Produktet må ikke

anvendes: – før ukrudtet er

fremspiret, – på blade, skud og ikke-forvedet bark af træer og buske på grund af risikoen for at beskadige planterne.

– på våde planter, – før forventet regn (nedbør, der forekommer inden for 6 timer efter (sprøjtning kan reducere behandlingens effektivitet). – under blæsende forhold, der kan få væsken til at blæse væk

2. Undgå at bruge produktet: _____

• afdrift af arbejdsvæsken på tilstødende afgrøder, • overlappning af arbejdsvæsken ved krydsninger mellem behandlingsfelter og forager.

TILBEREDNING AF BRUGSBARE VÆSKE

Før du begynder at tilberede den brugbare væske, skal du bestemme den nøjagtige mængde, der er nødvendig. Hæld den afmålte mængde væske i en delvist fyldt sprøjtetank med vand, mens omrøreren er tændt, og fyld derefter op med vand til den ønskede mængde. Skyl den tomme beholder tre gange med vand, og hæld skyllevæsken i sprøjtetanken med arbejdsvæsken. Efter at væsken er hældt i sprøjtetanken, blandes væsken mekanisk i tanken, hvis sprøjten ikke er udstyret med en hydraulisk omrører.

Ved afbrydelser i sprøjtningen skal arbejdsvæsken blandes grundigt i sprøjtetanken, inden arbejdet genoptages.

Anbefalet driftstryk: 2-3 atmosfærer.

Under drift, når der er arbejdsvæske i sprøjtetanken, skal det sikres, at tanken er helt udluftet.

Brug straks den tilberedte arbejdsvæske i sprøjtetanken.

Vær opmærksom på forholdsregler og kontraindikationer under arbejdet.

HÅNTERING AF RESTER AF BRUGBAR VÆSKE OG RENGØRING AF UDSTYR Rester af brugbar

væske efter behandlingen skal håndteres på en måde, der begrænser risikoen for forurening af overflade- og grundvand i henhold til vandlovgivningens bestemmelser og jordforurening, dvs.: - efter fortynding, brug på den overflade, hvor behandlingen

blev udført, hvis det er muligt (men tidligst 6 timer efter behandlingens afslutning) eller - bortskaffes ved hjælp af tekniske løsninger, der sikrer biologisk

nedbrydning af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller

– bortskaffes på anden måde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Vask udstyret grundigt efter arbejdet.

Behandl vandet, der bruges til at rengøre udstyret, på samme måde som den resterende væske, og brug det samme personlige værnemiddel.

BETINGELSER FOR SIKKER BRUG AF AGENTET

Før produktet tages i brug, skal alle interesserede parter, der kan blive udsat for sprøjteeffekten, og som har anmodet om sådanne oplysninger, informeres.

Forholdsregler for personer, der bruger produktet:

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Brug beskyttelseshandsker og -tøj for at beskytte mod eksponering for plantebeskyttelsesmidler under tilberedning af sprøjteopløsningen og under behandlingen. Miljømæssige forholdsregler:

Forurens ikke vand med plantebeskyttelsesmidlet eller dets emballage. Vask ikke udstyr i nærheden af overfladevand. Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter fra landbrug og veje.

For at beskytte vandlevende organismer, der ikke er mål for agensen, er det nødvendigt at udpege en beskyttelseszone på 1 meter i bredden fra reservoirer og vandløb.

For at beskytte planter og leddyr, der ikke er mål for midlet, er det nødvendigt at udpege en beskyttelseszone på 5 meter i bredden fra ikke-landbrugsområder. Perioden fra påføring af

midlet til den dag, hvor mennesker og dyr må betrede det område, hvor midlet blev påført (forebyggelsesperiode): Gå ikke ind, før væsken er helt tørret ind på planternes overflade.

Periode fra sidste anvendelse af midlet til høstdagen (tilbageholdelsesperiode): Vinterhvede, vinterbyg, vinterraps – 14 dage Æbletræ – ikke relevant

Periode fra sidste påføring af produktet på afgrøden indtil den dag, hvor den følgende afgrøde kan sås eller plantes: PLANTESUCCES skal tages i betragtning.

BETINGELSER FOR OPBEVARING OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF BESKYTTELSESMIDLET PLANTER OG EMBALLAGE

Opbevares utilgængeligt

for børn. Opbevar plantebeskyttelsesmidlet:

• på steder eller i faciliteter, hvor der er implementeret passende løsninger
beskyttelse mod miljøforurening og adgang fra tredjeparter,

• i originalemballagen, på en måde der forhindrer kontakt med fødevarer, drikkevarer eller foder, ved en temperatur på 0°C - 30°C.

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle affald.

Det anbefales at returnere tomme beholdere til en forhandler af plantebeskyttelsesmidler eller behandle dem som husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal bortskaffe beholderne, skal du kontakte din forhandler af plantebeskyttelsesmidler.

FØRSTEHJÆLP

Modgift: ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Gyldighedsperiode - 2 år

Produktionsdato -

Netindhold -

Batchnummer -