

Allegato alla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-301/2017d del 27 giugno 2017 che modifica l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R-129/2016 del 6 maggio 2016.

Titolare dell'autorizzazione:

Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublino 15, Repubblica d'Irlanda, Tel: +353 1 811 2900, Fax: +353 1 822 46 78, Email: info@barclay.ie

GALLUP SPECIAL 360

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali.

Contenuto di sostanza attiva:

glifosato sotto forma di sale di isopropilammina (un composto del gruppo degli amminofosfonati) - 360 g/l (30,77%)

Autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 129/2016 del

06/05/2016, modificata da ultimo dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 301/2017d del 27/06/2017.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Gallup Special 360 è un erbicida sotto forma di concentrato per la preparazione di una soluzione acquosa, da utilizzare per via fogliare nella coltivazione di grano invernale, orzo invernale e colza invernale, dopo la raccolta delle colture (stoppie), nei meleti e nelle aree agricole inutilizzate.

Secondo la classificazione HRAC, il principio attivo glifosato è classificato nel gruppo G. Il prodotto è destinato all'uso con irroratrici semoventi o montate su trattore e con irroratrici manuali.

AZIONE SULLE ERBACCE

Gallup Special 360 è un erbicida fogliare ad azione sistemica. Viene assorbito dalle parti verdi della pianta (foglie, germogli verdi e corteccia non legnosa), quindi migra attraverso la pianta e raggiunge le parti sotterranee (radici, stoloni, ecc.), causandone la morte. I primi sintomi dell'azione dell'agente (ingiallimento e avvizzimento) sono visibili 7-10 giorni dopo il trattamento. La morte completa della pianta avviene dopo circa 3 settimane.

L'elevata temperatura e umidità, nonché la forte luce solare, accelerano l'azione dell'agente.

Infestanti sensibili: alla

dose di 3 l/ha: gramigna, stellaria comune, cereali spontanei, borsa del pastore, poa annua, alla dose di 4 l/ha: viola del pensiero, ortica bianca,

ortica rosa, trifoglio bianco, dactylophyllum, erba medica ibrida, echinococco inodore, gramigna, tormentilla comune, bromo comune, fleolo, alla dose di 5 l/ha: geranio piccolo, ranuncolo strisciante, ortica viola, rovo comune, piede d'oca bianco, bardana minore, carota comune, tarassaco comune, cardo campestre, ortica comune, acetosella comune.

Infestanti moderatamente sensibili: alla dose di 5 l/ha: epilobio ghiandolare.

Erbacce resistenti: equisetolo.

RICHIESTA DELL'AGENTE

Nota:

non utilizzare il prodotto fitosanitario Gallup Special 360 in parchi e giardini pubblici, aree sportive e ricreative, scuole, asili nido, vivai e strutture sanitarie.

A. Dopo la raccolta delle colture, prima di iniziare la coltivazione post-raccolta per controllo della gramigna e di altre erbacce (stoppie)

Periodo di applicazione: applicare il prodotto da metà agosto a fine autunno sulle erbe infestanti verdi a crescita intensa.

Non effettuare alcuna lavorazione del terreno dopo la raccolta della coltura e prima dell'applicazione del prodotto. Al momento dell'applicazione, la gramigna dovrebbe raggiungere un'altezza di 10-25 cm e aver sviluppato almeno 3-4 foglie completamente sviluppate. Le infestanti monocotiledoni annuali dovrebbero essere alte almeno 5 cm e le infestanti dicotiledoni dovrebbero aver sviluppato due foglie vere completamente sviluppate.

Dose massima per singola applicazione: 4 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3 - 4 l/ha.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

B. Melo

Periodo di applicazione: applicare il prodotto dalla primavera all'autunno sulle infestanti verdi durante la loro intensa crescita, utilizzando la dose necessaria a distruggere le specie infestanti presenti.

Dose massima per singola applicazione: 5 l/ha.

Dose raccomandata per singola applicazione: 3-5 l/ha.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Note:

1. Utilizzare una dose maggiore dell'agente durante il tempo asciutto, soprattutto in caso di forte infestazione di gramigna.
2. I trattamenti colturali possono essere avviati quando compaiono chiari segni di controllo delle erbacce. sintomi dell'azione dell'agente (avvizzimento e ingiallimento).
3. Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchio, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa degli alberi, con il rischio di danneggiare le piante.

C. Terreni agricoli inutilizzati

Utilizzare su erbacce a crescita intensiva.

Data dei

trattamenti: – in primavera – durante il periodo di crescita intensiva delle piante fino alla fase di fioritura – in autunno – se sono necessari lavori colturali autunnali e semina.

Dose massima per singola applicazione: 5 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 4 -5 l/ha.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 100-300 l/ha.

Nota:

quando si utilizza una quantità di acqua pari a 100-150 l/ha, utilizzare ugelli che garantiscano una nebulizzazione a gocce fini, mentre quando si utilizza una quantità di acqua pari a 200-300 l/ha, utilizzare ugelli che garantiscano una nebulizzazione a gocce medie.

D. Campi coltivati prima della raccolta dei

cereali - controllo della gramigna e di altre erbacce che impediscono la raccolta, la disidratazione

Attenzione:

Il trattamento può essere effettuato solo nel caso e nei luoghi in cui vi sia un'elevata densità di erbe infestanti che rendano impossibile la raccolta o quando le condizioni agrotecniche o meteorologiche impediscano ai chicchi di raggiungere contemporaneamente la fase di maturazione per la raccolta in modo naturale.

Grano invernale, orzo invernale

Dose massima per uso singolo: 4 l/ha

Dose raccomandata per uso singolo: 3 l/ha in 100-150 l di acqua oppure 4 l/ha in 200-300 l di acqua

Data di presentazione della domanda:

L'agente dovrebbe essere utilizzato nella fase di maturazione cerosa del grano, quando il suo contenuto di umidità è del 20-30%, ovvero 10-14 giorni prima della raccolta prevista.

Al momento del trattamento, le erbacce devono essere verdi e in fase di intenso sviluppo.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

Nota 1.

Per una raccolta più facile, utilizzare la dose più bassa tra quelle consigliate.

2. Nei periodi di temperature diurne elevate, il trattamento deve essere eseguito al mattino o nel tardo pomeriggio.

3. La raccolta deve essere effettuata ad angolo retto o nella direzione opposta alla passaggio dell'irroratore.

4. Non utilizzare l'agente nei cereali con colture intercalari di leguminose.

5. Non utilizzare l'agente nei cereali destinati alla semina.

6. La paglia di cereali non deve essere utilizzata come substrato o pacciame da giardino; può essere utilizzata come mangime o lettiera per animali.

E. Campi prima della raccolta invernale della colza

- controllo della gramigna e di altre erbacce che impediscono la raccolta, la disidratazione

Nota: è

consentito l'uso di colza invernale o di parte di essa in una piantagione in caso di forte infestazione di erbe infestanti che impedisce la raccolta o quando le condizioni della coltura o le condizioni meteorologiche impediscono alla colza di raggiungere naturalmente la fase simultanea di maturazione per la raccolta.

Dose massima per uso singolo: 4 l/ha

Dose raccomandata per uso singolo: 3 l/ha in 100-150 l di acqua oppure 4 l/ha in 200-300 l di acqua

Data di presentazione della domanda:

Applicare il prodotto quando il contenuto di umidità dei semi (misurato con un igrometro) è inferiore al 30%. Al momento dell'applicazione, le erbacce devono essere verdi e in fase di crescita attiva.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

Nota:

non utilizzare su colture da seme.

SUCCESSO DELLE PIANTE:

Tutte le colture possono essere coltivate in un campo in cui è stato applicato Gallup Special 360. La coltivazione, la semina o la piantagione possono iniziare quando le erbacce mostrano i sintomi degli effetti dell'agente (ingiallimento e appassimento), ma non prima di 5-7 giorni.

PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI D'USO RELATIVE ALLA BUONA PRATICA AGRICOLA 1. Non applicare il prodotto: –

prima dell'emergenza delle

**erbe infestanti, – su foglie, germogli e
corteccia non lignificata di alberi e arbusti per la possibilità di danneggiare le piante.**

– su piante bagnate, –

**prima della pioggia prevista (pioggia che si verifica entro 6 ore dopo
la nebulizzazione può ridurre l'efficacia del trattamento).**

– in condizioni ventose che possono far volare via il liquido

2. Durante l'utilizzo del prodotto, non consentire:

**• deriva del liquido di lavoro sulle colture adiacenti, • sovrapposizione
del liquido di lavoro nelle giunzioni delle strisce di trattamento e delle capezzagne.**

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO UTILIZZABILE

Prima di iniziare a preparare il liquido utilizzabile, determinare esattamente la quantità necessaria. Versare la quantità misurata di agente in un serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito con acqua, con l'agitatore acceso, quindi rabboccare con acqua fino al volume richiesto. Sciacquare il contenitore vuoto tre volte con acqua e versare il liquido di risciacquo nel serbatoio dell'irroratrice contenente il fluido di lavoro. Dopo aver versato l'agente nel serbatoio dell'irroratrice, mescolare meccanicamente il liquido nel serbatoio se l'irroratrice non è dotata di agitatore idraulico.

In caso di interruzioni della spruzzatura, miscelare accuratamente il liquido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

Pressione di esercizio consigliata: 2-3 atmosfere.

Durante il funzionamento, quando il liquido di lavoro è nel serbatoio dell'irroratrice, assicurarsi che il serbatoio sia completamente sfiato.

Utilizzare immediatamente il liquido di lavoro preparato nel serbatoio dell'irroratrice.

Osservare le precauzioni e le controindicazioni durante il lavoro.

GESTIONE DEI RESIDUI DEL LIQUIDO UTILIZZABILE E PULIZIA DELL'ATTREZZATURA I

resti del liquido utilizzabile dopo il trattamento devono essere gestiti in modo da limitare il rischio di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee ai sensi delle disposizioni della Legge sulle acque e di contaminazione del

suolo, vale a dire: - dopo la diluizione, utilizzare sulla superficie in cui è stato effettuato il trattamento, se possibile (ma non prima di 6 ore dopo la fine del trattamento) o - smaltiti utilizzando soluzioni tecniche che garantiscano l'igiene biologica

degradazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, o

– smaltire in altro modo, nel rispetto delle normative sui rifiuti.

Lavare accuratamente l'attrezzatura dopo il lavoro.

Trattare l'acqua utilizzata per la pulizia dell'attrezzatura nello stesso modo del liquido rimanente, utilizzando gli stessi dispositivi di protezione individuale.

CONDIZIONI PER L'USO SICURO DELL'AGENTE

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario informare tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva dello spray e che hanno richiesto tali informazioni.

Precauzioni per le persone che utilizzano il prodotto:

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Indossare guanti e indumenti protettivi per proteggersi dall'esposizione ai prodotti fitosanitari durante la preparazione della soluzione spray e durante il trattamento. Precauzioni ambientali:

Non contaminare l'acqua con il prodotto fitosanitario o il suo imballaggio. Non lavare le attrezzature in prossimità di acque superficiali. Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i canali di scolo di aziende agricole e strade.

Per proteggere gli organismi acquatici che non sono bersaglio dell'agente, è necessario designare una zona di protezione larga 1 metro dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere le piante e gli artropodi non bersaglio del prodotto, è necessario delimitare una zona di protezione di 5 metri di larghezza dalle aree non agricole. Periodo compreso tra l'applicazione del prodotto e il giorno in cui persone e animali possono accedere all'area in cui è stato applicato il prodotto (periodo di prevenzione): non entrare finché il liquido non si è completamente asciugato sulla superficie delle piante.

Periodo dall'ultima applicazione dell'agente al giorno della raccolta della coltura (periodo di

sospensione): Frumento invernale, orzo invernale, colza invernale - 14 giorni Melo - non applicabile

Periodo compreso tra l'ultima applicazione del prodotto sulla coltura e il giorno in cui è possibile seminare o piantare la coltura successiva:
si deve tenere conto del SUCCESSO DELLA PIANTA.

CONDIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO SICURO DELL'AGENTE PROTETTIVO IMPIANTI E IMBALLAGGI

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto

fitosanitario: ÿ in luoghi o strutture in cui siano state adottate soluzioni idonee.

protezione contro la contaminazione ambientale e l'accesso da parte di terzi,

ÿ nella confezione originale, in modo da evitare il contatto con alimenti, bevande o mangimi, a una temperatura compresa tra 0 °C e 30 °C.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta dei rifiuti.

Si consiglia di restituire i contenitori vuoti a un rivenditore di prodotti fitosanitari o di trattarli come rifiuti urbani. In caso di domande su come smaltire i contenitori, consultare il rivenditore di prodotti fitosanitari.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, trattamento sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

Periodo di validità - 2 anni

Data di produzione -.....

Contenuto netto -

Numero di lotto -