

Bijlage bij het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-301/2017d van 27 juni 2017 tot wijziging van de vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-129/2016 van 6 mei 2016.

Vergunninghouder: Barclay

Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republiek Ierland, Tel: +353 1 811 2900, Fax: +353 1 822 46 78, E-mail: info@barclay.ie

GALLUP SPECIAL 360

Het product is bedoeld voor professioneel gebruik.

Gehalte aan werkzame stof: glyfosaat

in de vorm van isopropylaminezout (een verbinding uit de aminofosfonaatgroep) - 360 g/l (30,77%)

Vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 129/2016

van 06/05/2016, laatst gewijzigd bij besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 301/2017d van 27/06/2017.

EUH401 - Om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden, dient u de gebruiksaanwijzing te volgen.

BESCHRIJVING VAN DE WERKING

Gallup Special 360 is een herbicide in de vorm van een concentraat voor het bereiden van een waterige oplossing, die gebruikt wordt voor bladbespuiting bij de teelt van wintertarwe, wintergerst en winteraapzaad, na de oogst (stoppels), in appelboomgaarden en op ongebruikte landbouwgronden.

Volgens de HRAC-classificatie is de werkzame stof glyfosaat ingedeeld in groep G. Het product is bestemd voor gebruik met zelfrijdende of op een tractor gemonteerde veldsproeiers en handsproeiers.

ACTIE TEGEN ONKRUID

Gallup Special 360 is een herbicide voor bladbespuiting met systemische werking. Het wordt opgenomen door de groene delen van de plant (bladeren, groene scheuten en niet-houtachtige bast), verspreidt zich vervolgens door de plant en bereikt de ondergrondse delen (wortels, uitlopers, enz.), waardoor deze afsterven. De eerste symptomen van de werking van het middel (vergeling en verwelking) zijn 7-10 dagen na de behandeling zichtbaar. De plant sterft na ongeveer 3 weken volledig af.

Hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid, evenals fel zonlicht, versnellen de werking van het middel.

Gevoelige onkruiden:

bij een dosering van 3 l/ha: hanenpootgras, gewone muurpeper, opslaggranen, herderstasje, eenjarig beemdgras;

bij een dosering van 4 l/ha:

akkerviooltje, witte dovenetel, roze dovenetel, witte klaver, kropaar, hybride luzerne, geurloze kamille, kweekgras,

gewone tormentil, hanenpootdraf, timotheegras; bij een dosering van 5 l/ha: kleine

ooievaarsbek, kruipende boterbloem, paarse dovenetel, braam, witte

ganzenvoet, kleine klit, wortel, paardenbloem, akkerdistel, brandnetel, akkerzuring.

Matig gevoelige onkruiden: bij een dosering van 5 l/ha: klierwilgenroosje.

Resistente onkruiden: heermoes.

AANVRAAG VAN DE AGENT

Let op:

Gebruik het gewasbeschermingsmiddel Gallup Special 360 niet in openbare parken en tuinen, sport- en recreatiegebieden, scholen, kleuterscholen, kwekerijen en zorginstellingen.

A. Na de oogst, voordat men begint met de na-oogstbewerking, om bestrijding van kweekgras en ander onkruid (stoppels)

Toepassingsperiode: breng het product van half augustus tot laat in de herfst aan op groene, snelgroeiende onkruiden.

Voer na de oogst en vóór het aanbrengen van het product geen grondbewerking uit. Op het moment van toepassing moet kweekgras een hoogte van 10-25 cm hebben bereikt en ten minste 3-4 volledig ontwikkelde bladeren hebben. Eenjarige eenzaadlobbige onkruiden moeten ten minste 5 cm hoog zijn en tweezaadlobbige onkruiden moeten twee volledig ontwikkelde echte bladeren hebben.

Maximale dosering per toepassing: 4 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3 - 4 l/ha.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

B.

Appelboom Toepassingsperiode: breng het product van de lente tot de herfst aan op groene onkruiden tijdens hun intensieve groei, met de dosering die nodig is om de aanwezige onkruidsoorten te vernietigen.

Maximale dosering per toepassing: 5 l/ha.

Aanbevolen dosering per toepassing: 3-5 l/ha.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Opmerkingen: 1. Gebruik een hogere dosis van het middel bij droog weer, vooral in geval van sterke Onkruidplaag van kweekgras.

2. Met grondbewerking kan worden begonnen zodra er duidelijke tekenen van onkruidbestrijding zichtbaar zijn. Symptomen van de werking van het middel (verwelking en vergeling).

3. Spuit veilig, bij voorkeur met sproeiers met afdekkingen, zodat er geen druppels van de sproeivloeistof op bladeren, scheuten en niet-houtachtige boomschors terecht komen, omdat dit de planten kan beschadigen.

C. Ongebruikte landbouwgrond

Gebruik het middel tegen snelgroeiend onkruid.

Behandelingsdata:

- in het voorjaar – tijdens de periode van intensieve plantengroei tot aan de bloei
- in het najaar – indien er in het najaar grondwerkzaamheden nodig zijn en zaaien.

Maximale dosering per toepassing: 5 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 4-5 l/ha.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 100-300 l/ha.

Let op:

Bij een waterverbruik van 100-150 l/ha, gebruik sproeiers die fijne druppels produceren, terwijl bij een verbruik van 200-300 l/ha sproeiers met middelgrote druppels moeten worden gebruikt.

D. Akkerbouw vóór de graanoogst -

bestrijding van kweekgras en andere onkruiden die de oogst belemmeren, uitdroging

Aandacht:

De behandeling kan alleen worden uitgevoerd in gevallen en op plaatsen waar een hoge onkruidichtheid de oogst onmogelijk maakt, of wanneer agrotechnische of weersomstandigheden voorkomen dat de granen op natuurlijke wijze gelijktijdig de rijpheidsfase voor de oogst bereiken.

Wintertarwe, wintergerst

Maximale dosering per toepassing: 4 l/ha

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3 l/ha in 100-150 l water of 4 l/ha in 200-300 l water

Aanvraagdatum:

Het middel moet worden gebruikt in het stadium van wasachtige rijpheid van het graan, wanneer het vochtgehalte 20-30% bedraagt, d.w.z. 10-14 dagen vóór de verwachte oogst.

Tijdens de behandeling moeten de onkruiden groen zijn en zich in de fase van intensieve ontwikkeling bevinden.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1

Opmerking 1. Gebruik voor een gemakkelijkere oogst de laagste van de aanbevolen doseringen.

2. Bij hoge temperaturen overdag dient de behandeling 's ochtends of laat in de middag te worden uitgevoerd.

3. Het oogsten moet loodrecht of in de tegenovergestelde richting van de richting gebeuren. passage van de sproeier.

4. Gebruik het middel niet in granen met peulvruchten als ondergezaaide

gewassen. 5. Gebruik het middel niet in granen die bestemd zijn voor zaadproductie.

6. Graanstro mag niet als substraat of tuinmulch worden gebruikt; het kan wel worden gebruikt als Voer of strooisel voor dieren.

Velden vóór de oogst van winterkoolzaad

- bestrijding van kweekgras en andere onkruiden die de oogst belemmeren, uitdroging

Let op:

Het is toegestaan om winterraapzaad of een deel daarvan te gebruiken op een plantage in geval van een ernstige onkruidgroei die de oogst verhindert, of wanneer de toestand van het gewas of de weersomstandigheden ervoor zorgen dat het raapzaad niet op natuurlijke wijze tegelijkertijd rijp genoeg is om te oogsten.

Maximale dosering voor eenmalig gebruik: 4 l/ha

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3 l/ha in 100-150 l water of 4 l/ha in 200-300 l water

Aanvraagdatum:

Breng het product aan wanneer het vochtgehalte van het zaad (gemeten met een vochtmeter) lager is dan 30%. Het onkruid moet groen zijn en actief groeien op het moment van aanbrengen.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1

Let op:

niet gebruiken op zaadgewassen.

TEELTSUCCES: Alle gewassen

kunnen worden geteeld op een veld waar Gallup Special 360 is toegepast. Bewerking, zaaien of planten kan beginnen zodra het onkruid symptomen van de werking van het middel vertoont (vergeling en verwelking), maar niet eerder dan na 5-7 dagen.

VOORZORGSMATREGELEN EN GEBRUIKSAANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT GOEDE

LANDBOUWPRAKTIJKEN 1.

Breng het product niet aan: – vóórdat het onkruid opkomt, – op bladeren, scheuten en niet-verhoude schors van bomen en struiken, omdat dit de planten kan beschadigen.

– op natte planten, –

vóór de verwachte regen (regenval binnen 6 uur na

(Spuiten kan de effectiviteit van de behandeling verminderen).

– bij winderige omstandigheden waardoor de vloeistof weg kan waaien.

2. Laat tijdens het gebruik van het product het volgende niet toe:

• afdrijven van de werkzame vloeistof naar aangrenzende gewassen, •

overlappend van de werkzame vloeistof op de overgangen tussen behandelingsstroken en kopakkers.

HET VOORBEREIDEN VAN DE BRUIKBARE

VLOEISTOF Voordat u begint met het voorbereiden van de bruikbare vloeistof, moet u precies bepalen hoeveel u nodig hebt. Giet de afgemeten hoeveelheid van het middel in een gedeeltelijk met water gevulde sproeitank, terwijl de roerder is ingeschakeld, en vul vervolgens aan met water tot het vereiste volume. Spoel de lege container driemaal met water en giet het spoelwater in de sproeitank met de werkzame vloeistof. Nadat u het middel in de sproeitank hebt gegoten, mengt u de vloeistof mechanisch in de tank als de sproeier niet is uitgerust met een hydraulische roerder.

Bij onderbrekingen in het spuitproces dient u de werkzame vloeistof in de spuittank grondig te mengen alvorens het werk te hervatten.

Aanbevolen werkdruk: 2-3 atmosfeer.

Zorg er tijdens het gebruik, wanneer de werkvloeistof zich in de sproeitank bevindt, voor dat de tank volledig ontlucht is.

Gebruik de in de sproeitank klaargemaakte werkzame vloeistof direct.

Neem tijdens het werk de waarschuwingen en contra-indicaties in acht.

VERWERKING VAN DE RESTANTEN VAN DE BRUIKBARE VLOEISTOF EN REINIGING VAN DE

APPARATUUR De restanten van de bruikbare vloeistof na de behandeling moeten zodanig worden behandeld dat het risico op verontreiniging van oppervlakte- en grondwater in de zin van de Waterwet en bodemverontreiniging wordt beperkt, d.w.z.: - na

verdunding, indien mogelijk, gebruiken op het oppervlak waar de behandeling heeft plaatsgevonden (maar niet eerder dan 6 uur na het einde van de behandeling) of - worden afgevoerd met behulp van technische oplossingen die biologische zuivering garanderen

afbraak van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, of

– op een andere manier afvoeren in overeenstemming met de afvalregelgeving.

Reinig de apparatuur grondig na gebruik.

Behandel het water dat gebruikt is om de apparatuur schoon te maken op dezelfde manier als de overige vloeistof, en gebruik daarbij dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen.

VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK VAN HET MIDDEL

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk worden blootgesteld aan de sproeivevel en die om dergelijke informatie hebben verzocht, worden geïnformeerd.

Voorzorgsmaatregelen voor mensen die het product gebruiken:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Draag beschermende handschoenen en kleding ter bescherming tegen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij het bereiden van de spuitoplossing en tijdens de behandeling.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of de verpakking ervan. Reinig apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Voorkom waterverontreiniging door afwateringssloten van landbouwbedrijven en wegen.

Om waterorganismen te beschermen die niet het doelwit van het middel zijn, is het noodzakelijk een beschermingszone van 1 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om planten en geleedpotigen te beschermen die niet het doelwit van het middel zijn, is het noodzakelijk een beschermingszone van 5 meter breed af te bakenen rondom niet-agrarische gebieden. De periode tussen het aanbrengen van het middel en de dag waarop mensen en dieren het gebied waar het middel is aangebracht weer mogen betreden (preventieperiode): Betreed het gebied niet totdat de vloeistof volledig op het oppervlak van de planten is opgedroogd.

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst (wachttijd): Wintertarwe, wintergerst, winteraapzaad – 14 dagen Appelboom – niet van toepassing

De periode tussen de laatste toepassing van het product op het gewas en de dag waarop het volgende gewas kan worden gezaaid of geplant, moet in aanmerking worden genomen. Het succes van de zaai moet hierbij in aanmerking worden genomen.

VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMINGSMIDDEL PLANTEN EN VERPAKKINGEN

Buiten het bereik van

kinderen houden. Bewaar het

gewasbeschermingsmiddel: γ op plaatsen of in faciliteiten waar passende maatregelen zijn getroffen.

bescherming tegen milieuverontreiniging en toegang door derden,

γ in de originele verpakking, op een manier die contact met voedsel, dranken of diervoeder voorkomt, bij een temperatuur van 0°C - 30°C.

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Alle ongebruikte producten moeten worden ingeleverd bij een instantie die bevoegd is om afval in te zamelen.

Het is aan te raden lege verpakkingen in te leveren bij een leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of ze als huishoudelijk afval af te voeren. Neem bij vragen over de juiste afvoer van de verpakkingen contact op met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

E.H.B.O

Tegengif: geen, behandel de symptomen.

Als u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Geldigheidsperiode - 2 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -