

Bilaga till jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriets beslut nr R-301/2017d av den 27 juni 2017 om ändring av jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriets tillstånd nr R-129/2016 av den 6 maj 2016.

Innehavare av godkännande:

Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irland, Tel: +353 1 811 2900, Fax: +353 1 822 46 78, E-post: info@barclay.ie

GALLUP SPECIAL 360

Produkten är avsedd för professionella användare.

Aktiv substanshalt: glyfosat i form
av isopropylaminsalt (en förening från aminofosfonatgruppen) - 360 g/l
(30,77%)

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-129/2016 av den
06/05/2016, senast ändrat genom beslut från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-301/2017d av den 27/06/2017.

EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

BESKRIVNING AV VERKSAMHET

Gallup Special 360 är ett herbicidmedel i form av ett koncentrat för framställning av en vattenlösning, som används bladmässigt, vid odling av höstvet, höstkorn och höstraps, efter skörd av grödor (stubb), i äppelodlingar och i outnyttjade jordbruksområden.

Enligt HRAC-klassificeringen klassificeras det aktiva ämnet glyfosat i grupp G. Produkten är avsedd att användas med självgående eller traktormonterade fältsprutor och handsprutor.

ÅTGÄRDER MOT OGRÄS

Gallup Special 360 är ett bladherbicid med systemisk verkan. Det absorberas av växtens gröna delar (blad, gröna skott och icke-vedartad bark), sprider sig sedan genom växten och når de underjordiska delarna (rötter, utlöpare etc.), vilket orsakar deras död. De första symtomen på medlets verkan (gulning och vissnande) är synliga 7–10 dagar efter behandlingen. Fullständig växtdöd inträffar efter cirka 3 veckor.

Hög temperatur och luftfuktighet samt starkt solljus påskyndar medlets verkan.

Känsliga ogräs: vid en

dos av 3 l/ha: stallgräs, vanlig sparris, spridda spannmål, vanlig herdeväska, ettårig ängsgröe, vid en dos av 4 l/ha: åkerpensé, vit dödnässl, rosa dödnässl, vitklöver, hundklöver, hybridlusern, baldersbrå, kvikgräs, blodrot, stallros, timotejgräs, vid en dos av 5 l/ha: liten näva, krypande smörblomma, purpurdödnässl, björnbär, vit gåsfot, mindre kardborre, vanlig morot, vanlig maskros, åkertistel, nässl, åkersorrel.

**Måttligt känsliga ogräs: vid
en dos av 5 l/ha: körtelört.**

Resistenta ogräs: hästsvans.

ANVÄNDNING AV MEDELET

Obs:

Använd inte Gallup Special 360 växtskyddsmedel i offentliga parker och trädgårdar, idrotts- och rekreationsområden, skolor, förskolor, plantskolor och vårdinrättningar.

**A. Efter skörd av grödorna, innan odling efter skörd påbörjas för att
bekämpning av kvistgräs och annat ogräs (stubb)**

**Appliceringsperiod: applicera produkten från mitten av augusti till sen höst på gröna,
intensivt växande ogräs.**

**Utför inga jordbearbetningar efter skörd och före applicering av produkten. Vid
appliceringstillfället bör kvikgräset nå en höjd av 10–25 cm och ha utvecklat minst 3–4 fullt
utvecklade blad. Ettåriga enhjärtbladiga ogräs bör vara minst 5 cm höga och tvåhjärtbladiga
ogräs bör ha utvecklat två fullt utvecklade riktiga blad.**

Maximal dos för engångsanvändning: 4 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3–4 l/ha.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen – 1.

Rekommenderad vattenmängd: 200–300 l/ha.

B. Äppelträd

**Appliceringsperiod: applicera produkten från vår till höst på gröna ogräs under deras intensiva tillväxt, med den dos som behövs
för att förstöra befintliga ogräsarter.**

Maximal dos för engångsanvändning: 5 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbehandling: 3–5 l/ha.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen – 1.

Rekommenderad vattenmängd: 200–300 l/ha.

**Anmärkningar: 1. Använd en högre dos av medlet under torrt väder, särskilt vid starka
ogräsangrepp av kvistgräs.**

**2. Odlingsbehandlingar kan påbörjas när tydliga tecken på ogräsbekämpning uppträder.
symtom på medlets verkan (vissnande och gulfärgning).**

**3. Spraya säkert, helst med sprutor med lock, så att droppar av sprutvätskan inte hamnar på
löv, skott och trädbark på grund av risken att skada växterna.**

C. Outnyttjad jordbruksmark

Använd på intensivt växande ogräs.

Behandlingsdatum:

**– på våren – under perioden med intensiv växttillväxt fram till
blomningsfasen – på hösten – om höstbearbetning är nödvändig
och sådd.**

Maximal dos för engångsanvändning: 5 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 4–5 l/ha.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen – 1.
Rekommenderad vattenmängd: 100-300 l/ha.

Obs: Vid

användning av vatten i en mängd på 100–150 l/ha, använd munstycken som säkerställer findroppssprutning, medan vid användning av 200–300 l/ha, använd munstycken som säkerställer medelstordroppssprutning.

D. Växtfält före spannmålsskörd - bekämpning

av kvikgräs och andra ogräs som förhindrar skörd och uttorkning

Uppmärksamhet:

Behandlingen kan endast utföras i de fall och på platser där det finns en hög täthet av ogräs som gör skörd omöjlig eller när jordbruks- eller väderförhållanden förhindrar att kornen når samma mognadsstadium för skörd på ett naturligt sätt.

Vintervete, vinterkorn

Maximal dos för engångsbruk: 4 l/ha

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3 l/ha i 100–150 l vatten eller 4 l/ha i 200–300 l vatten

Ansökningsdatum:

Medlet bör användas under spannmålets vaxartade mognadsfas, när dess fukthalt är 20–30 %, dvs. 10–14 dagar före förväntad skörd.

Vid behandlingstillfället bör ogräset vara grönt och i en intensiv utvecklingsfas.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1

Anmärkning 1. För enklare skörd, använd den lägre av de rekommenderade doserna.

2. Under perioder med höga dagtemperaturer bör behandlingen utföras på morgonen eller sen eftermiddag.

3. Skörden bör ske i rät vinkel eller i motsatt riktning mot sprutans passage.

4. Använd inte medlet i spannmål med undersådda baljväxter. 5. Använd inte medlet i spannmål avsedda för utsäde.

6. Halm från spannmål bör inte användas som substrat eller trädgårdskompost; det kan användas som foder eller strö för djur.

E. Fält före höstrapsskörd

- bekämpning av kvikgräs och andra ogräs som förhindrar skörd och uttorkning

Obs: Det

är tillåtet att använda höstraps eller delar därav på en plantage vid hög ogräsangrepp som förhindrar skörd eller när grödans tillstånd eller väderförhållandena förhindrar att rapsen naturligt når samma mognadsstadium för skörd.

Maximal dos för engångsbruk: 4 l/ha

Rekommenderad dos för engångsbruk: 3 l/ha i 100–150 l vatten eller 4 l/ha i 200–300 l vatten

Ansökningsdatum:

Applicera produkten när fröets fukthalt (mätt med en fuktmätare) är under 30 %. Ogräset ska vara grönt och växa aktivt vid appliceringstillfället.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1

Obs:

Använd inte på fröodlingar.

VEXTSUCCESS: Alla grödor kan

odlas på ett fält där Gallup Special 360 har applicerats. Odling, sådd eller plantering kan påbörjas när ogräset visar symptom på medlets effekter (gulning och vissnande), men tidigast efter 5–7 dagar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED GOD JORDBRUKSPRAKSIS 1. Applicera inte produkten:

– innan ogräset har kommit fram, –

på blad, skott och icke-förvedad bark av träd
och buskar på grund av risken att skada växterna.

– på våta växter, – före

förväntat regn (nederbörd som inträffar inom 6 timmar efter
(sprayning kan minska behandlingens effektivitet). – vid
blåsiga förhållanden som kan få vätskan att blåsa bort

2. Tillåt inte följande när du använder produkten:

• avdrift av arbetsvätskan till intilliggande grödor, • överlappning av
arbetsvätskan vid korsningarna mellan behandlingsremsor och åkerfält.

TILLAGNING AV ANVÄNDBARA VÄTSKAN Innan

du börjar tillreda den användbara vätskan, fastställ exakt hur mycket som behövs.

Håll den uppmätta mängden medlet i en delvis fylld sprutbehållare med vatten, med omröraren påslagen, och fyll sedan på med vatten till önskad volym. Skölj den tomma behållaren tre gånger med vatten och håll sköljmedlet i sprutbehållaren som innehåller arbetsvätskan. Efter att medlet har hållits i sprutbehållaren, blanda vätskan mekaniskt i tanken om sprutan inte är utrustad med hydraulisk omrörare.

Vid avbrott i sprutningen, blanda arbetsvätskan noggrant i sprutbehållaren innan arbetet återupptas.

Rekommenderat driftstryck: 2–3 atmosfärer.

Under drift, när arbetsvätskan finns i spruttanken, se till att tanken är helt avluftad.

Använd omedelbart den arbetsvätska som förberetts i spruttanken.

Observera försiktighetsåtgärder och kontraindikationer under arbetet.

HANTERING AV RESTER AV ANVÄNDBARA VÄTSKOR OCH RENGÖRING AV UTRUSTNINGEN Rester

av användbar vätska efter behandlingen bör hanteras på ett sätt som begränsar risken för förorening av yt- och grundvatten i enlighet med vattenlagens bestämmelser och markförorening, dvs.: - efter utspädning, använd på ytan där behandlingen utfördes,
om möjligt (men tidigast 6 timmar efter behandlingens slut) eller - kasseras med tekniska lösningar som säkerställer biologiska

nedbrytning av aktiva substanser i växtskyddsmedel, eller

– kassera på annat sätt i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Tvätta utrustningen noggrant efter arbetet.

Behandla vattnet som används för att rengöra utrustningen på samma sätt som den återstående vätskan, med samma personliga skyddsutrustning.

VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV MEDELET

Innan produkten används måste alla berörda parter som kan komma att exponeras för sprutavdrift och som har begärt sådan information informeras.

Försiktighetsåtgärder för personer som använder produkten:

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Använd skyddshandskar och skyddskläder för att skydda mot exponering för växtskyddsmedel vid beredning av spraylösningen och under behandlingen. Miljöskyddsåtgärder:

Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess förpackning. Tvätta inte utrustning nära ytvatten. Undvik vattenförorening genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

För att skydda vattenlevande organismer som inte är måltavla för agensen är det nödvändigt att utse en skyddszon som är 1 meter bred från reservoarer och vattendrag.

För att skydda växter och leddjur som inte är måltavla för medlet är det nödvändigt att utse en skyddszon som är 5 meter bred från icke-jordbruksområden. Perioden från applicering av medlet till den dag då

människor och djur får beträda området där medlet applicerades (förebyggande period): Beträd inte området förrän vätskan har torkat helt på växternas yta.

Period från sista applicering av medlet till skördedagen (karenstid): Vintervete, vinterkorn, vinterraps – 14 dagar

Äppelträd – ej tillämpligt

Period från sista appliceringen av produkten på grödan till den dag då följande gröda kan sås eller planteras: VÄXTFRAMGÅNG måste beaktas.

FÖRHÅLL FÖR FÖRVARING OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV SKYDDSMEDELET VÄXTER OCH FÖRPACKNINGAR

Förvaras utom räckhåll

för barn. Förvara växtskyddsmedlet: γ på

platser eller i anläggningar där lämpliga lösningar har implementerats

skydd mot miljöföroreningar och åtkomst av tredje part,

γ i originalförpackning, på ett sätt som förhindrar kontakt med livsmedel, drycker eller foder, vid en temperatur på 0–30 ° C.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar av växtskyddsmedel för andra ändamål.

All oanvänd produkt ska lämnas till en enhet som är behörig att samla in avfall.

Det rekommenderas att du returnerar tomma behållare till en återförsäljare av växtskyddsmedel eller hanterar dem som kommunalt avfall. Om du har några frågor om hur du ska göra dig av med behållarna, kontakta din återförsäljare av växtskyddsmedel.

FÖRSTA HJÄLPEN

Motgift: inget, behandla symptomatiskt.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Giltighetstid - 2 år

Produktionsdatum -

Nätinnehåll -

Batchnummer -