

Tilladelsesindehaver:

Monsanto Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tlf.: 22 395 65 00, fax: 22 395 65 01, hotline: 22 395 65 09, www.monsanto.pl

Den enhed, der er ansvarlig for den endelige emballage og mærkning af et plantebeskyttelsesmiddel.....
Den enhed, der er ansvarlig for den endelige mærkning af plantebeskyttelsesmidlet.....

RODEO PLUS

Produktet er beregnet til brug for professionelle brugere.

Indhold af aktivt stof:

glyphosat (en forbindelse fra aminofosfonatgruppen) i form af kaliumsalt - **360 g/l (28,7%)**.

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R - 80/2022 af 12. juli 2022

EUH 066 - Gentagen eksponering kan forårsage tør eller revnet hud.

EUH 401 – Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.

BESKRIVELSE AF HANDLINGEN

Et ikke-selektivt herbicid med systemisk virkning, der påføres bladmæssigt i form af et koncentrat.
til fremstilling af en vandig opløsning (SL).

Ifølge HRAC-klassificeringen er aktivstoffet glyphosat klassificeret i gruppe 9 (tidligere
gruppe G).

INDSATS MOD UKRUDS

Produktet indeholder det aktive stof glyphosat, som hæmmer virkningen af enzymet glyphosatsyntase.
EPSPS, som er et nøgleenzym i shikiminsyrens metaboliske vej
relateret til biosyntesen af aromatiske aminosyrer. I planten forårsager det hæmning
syntese af proteiner, der er essentielle for
plantevækst. Midlet absorberes gennem plantens grønne dele (blade, grønne skud og ikke-træagtig bark)
og bevæger sig derefter gennem planten og når dens underjordiske dele (rødder,
løbere osv.) hvilket får dem til at dø.

De første symptomer på midlets virkning (gulfarvning og visnen) er synlige efter 7-10 dage
efter behandlingen. Planten dør fuldstændigt efter cirka 3 uger.

Høj temperatur og luftfugtighed samt stærkt sollys accelererer
agentens handling.

	Dosis af plantebeskyttelsesmiddel	
	1,5-2,0 l/ha*	3,0 l/ha
Følsomme ukrudt	marksennep, fuglegræs, hvid gåsefod, Pileurt plettet, pung almindelige feltbundter	lille geranium, gårdgræs, fuglegræs, persisk ærenpris, Canadisk adjektiv, knude plettet, gammel mantis, hyrdetaske, enggræs, engrapgræs, etårig engrapgræs
Ukrudt medium følsom	ensidig ukrudt	lilla dødbændenælde, gåsefod hvid, kvikgræs, pileurt, snerle, rævehale

* Ukrudt i frøplantestadiet

ANVENDELSE AF AGENTET

Midlet er beregnet til brug med mark- og frugtplantagesprøjter. med en herbicidbom og håndsprøjter (inklusive rygsprøjter).

Opmærksomhed:

Brug ikke plantebeskyttelsesmidlet i parker og offentlige haver, i områder sport, fritid, skoler, børnehaver, vuggestuer og plejehjem sundhed.

Marker efter såning/plantning, men før afgrøden kommer frem

Kartoffel, sukkerroer

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 1,5 - 3,0 l/ha.

Juster dosis af midlet til den tilstedeværende ukrudtsart og -intensitet.

Frist for brug af produktet:

Påfør produktet efter ukrudtets fremkomst, men senest 3 dage før afgrøden spirer. Det er vigtigt, at de såede frø (plantede knolde) er dækket med jord. beskytter dem mod skader.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Anbefalet vandmængde: 100 - 400 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

OPMÆRKSOMHED

Det anbefales ikke at bruge midlet på såede gulerodsfrø.

Efter høst af afgrøderne, før dyrkning efter høst påbegyndes for at bekæmpelse af kvikgræs og andet ukrudt (stubbe).

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 1,5 - 3,0 l/ha.

Juster dosis af midlet til den tilstedeværende ukrudtsart og -intensitet.

Frist for brug af produktet:

Påfør produktet fra midten af august til sent efterår på kraftigt voksende grønne ukrudtsplanter. Udfør ikke jordbearbejdning efter høst af afgrøden og før påføring af produktet. På påføringstidspunktet skal kvikgræsset have nået en højde på

10-25 cm og producere mindst 3-4 fuldt udviklede blade. Enårige enkimbladede ukrudtsplanter bør være mindst 5 cm høje, og tokimbladede ukrudtsplanter bør producere to fuldt udviklede ægte blade.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Anbefalet vandmængde: 100 - 400 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Æbletræ

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 2,0 - 3,0 l/ha.

Juster dosis af midlet til den tilstedeværende ukrudtsart og -intensitet.

Frist for brug af produktet:

Midlet kan anvendes fra forår til efterår på intensivt voksende ukrudt i en dosis afhængig af arten, der findes på plantager, der er ældre end 2 år.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 3.

Interval mellem behandlinger: mindst 28 dage.

Anbefalet vandmængde: 100-400 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

KOMMENTARER

1. Fjern alle rodskud mekanisk før sprøjtning.

2. Sprøjt sikkert, helst med sprøjtepistoler med beskyttelseskærme, så dråber af arbejdsvæsken kom ikke på blade, skud og ikke-træagtig bark af træer på grund af muligheden for skader på planter.

Vin

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Anbefalet dosis til en enkelt anvendelse: 2,0 - 3,0 l/ha.

Juster dosis af midlet til den tilstedeværende ukrudtsart og -intensitet.

Frist for brug af produktet:

Midlet kan bruges fra forår til efterår, på intensivt voksende ukrudt, i en dosis afhængigt af arten, der findes på plantager, der er ældre end 2 år.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 3.

Pause mellem behandlinger – mindst 28 dage.

Anbefalet vandmængde: 100-400 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Græsarealer – enge, enggange.

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 2,0 - 3,0 l/ha.

Juster dosis af midlet til den tilstedeværende ukrudtsart og -intensitet.

Frist for brug af produktet:

Brug produktet i perioder med intensiv ukrudtsvækst gennem hele vegetationsperioden.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

Anbefalet vandmængde: 100 - 400 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

OPMÆRKSOMHED

Brug kun produktet på græsarealer, der er beregnet til fornyelse.

ANVENDELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER I AFGRØDER OG ANVENDELSER I SMÅ OMRÅDER

Brugeren er eneansvarlig for effektiviteten og fytotoksiciteten af et plantebeskyttelsesmiddel, der anvendes i mindre afgrøder.

Midlet, der anvendes i mindre afgrøder, kan også bekæmpe andre arter ukrudt end angivet i etiketten. **Effekt på ukrudt**, men det er ikke blevet klart bekræftet af forskning. Derfor, for at opnå detaljerede information om spektret af ukrudt, der skal bekæmpes, og deres følsomhed over for den anvendte I småskalaafgrøder anbefales det at kontakte ejeren med plantebeskyttelsesmiddel. tilladelse eller dennes repræsentant.

Pære, kirsebær.

Maksimal dosis ved enkelt anvendelse: 3,0 l/ha.

Anbefalet dosis til engangsbrug: 2,0 - 3,0 l/ha.

Juster dosis af midlet til den tilstedeværende ukrudtsart og -intensitet.

Frist for brug af produktet:

Midlet kan bruges fra forår til efterår, på intensivt voksende ukrudt, i en dosis afhængigt af arten, der findes på plantager, der er ældre end 2 år.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 3.

Interval mellem behandlinger: mindst 28 dage.

Anbefalet vandmængde: 100-400 l/ha.

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

KOMMENTARER

1. Fjern alle rodskud mekanisk før sprøjtning.
 2. Sprøjt sikkert, helst med sprøjtepistoler med låg, så dråber af sprøjtevæsken ikke kommer på blade, skud og ikke-træagtig bark på træer på grund af risikoen for at beskadige planterne.
-

FORHOLDSREGLER OG SÆRLIGE BRUGSBETINGELSER.

1. Strategi for immunitetsstyring

For at minimere risikoen for forekomst og udvikling af ukrudtsresistens over for herbicider, i overensstemmelse med god landbrugspraksis:

- følg nøje anvisningerne på plantebeskyttelsesmidlets etiket, brug produktet i den anbefalede dosis inden for den anbefalede tid for at sikre optimal ukrudtsbekæmpelse,

- tilpasse valget af herbicid og beslutningen om at udføre behandlingen til det eksisterende (eller potentielle) ukrudtsangreb, under hensyntagen til den dominerende art og tærsklerne for skadelighed,
- anvende rotation af herbicider (aktive stoffer) med forskellige virkningsmekanismer,
- brug en blanding af herbicider (aktive stoffer) med forskellige virkningsmekanismer handlinger,
- anvende herbicider i rotation og/eller blandinger, der påvirker flere ukrudtsprocesser (med forskellige virkningsmekanismer),
- brug kun et herbicid med en given virkningsmekanisme én gang pr. sæson vegetationen af afgrøden,
- tilpasse dyrkningsprocedurerne til de herskende forhold på marken, især for at typen og intensiteten af ukrudt,
- brug forskellige ukrudtsbekæmpelsesmetoder, herunder sædskifte osv.
- brug certificeret såsæd,
- rene landbrugsmaskiner for at forhindre overførsel af formeringsmateriale ukrudt til andre positioner,
- informere tilladelsesindehaveren om utilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse,
- For yderligere information, kontakt venligst din rådgiver, tilladelsesindehaver eller tilladelsesindehaverens repræsentant.

2. Anbefalet arbejdsstryk: 2-3 atmosfærer.

3. Under drift, når der er arbejdsvæske i sprøjtetanken, skal det sikres, at tanken er helt udluftet.

4. Brug straks den tilberedte arbejdsvæske i sprøjtetanken.

5. Overhold forholdsregler og kontraindikationer under arbejdet.

6. Brug ikke produktet:

- før ukrudtet kommer frem,
- på blade, skud og ikke-træagtig bark af træer og buske på grund af muligheden for
- planteskader,
- til våde planter,
- før forventet regn (nedbør, der forekommer inden for 1 time efter sprøjtning kan reducere behandlingens effektivitet),
- under vindforhold, der kan få væsken til at drive væk.

7. Undgå at bruge produktet:

– y afdrift af arbejdsvæsken på tilstødende afgrødeplantager,

overlapping af arbejdsvæsken ved samlingerne mellem behandlingsstriberne og forageren.

FRIST

Periode fra sidste anvendelse af midlet til dagen for høst af afgrøden (tilbageholdelsesperiode):

æble, pære, kirsebær – 28,

vinstok – 30.

kartoffel, sukkerroer – ikke påkrævet

Perioden fra den sidste anvendelse af produktet til dagen for den sidste anvendelse af produktet på de afgrøder, der er beregnet til foder

Hvilke dyr kan fodres med disse planter (tilbageholdelsestid for foder):

Enge, græsgrange – 21 dage

PLANTESUCCESSION

På marken, hvor Rodeo Plus blev brugt, kan alle planter dyrkes.

Dyrkning, såning eller plantning kan påbegyndes, når det ukrudt, der skal bekæmpes, viser symptomer på midlets virkning (gulning og visnen), men tidligst efter 3 måneder.
dage.

FORBEREDELSE AF BRUGBAR VÆSKE

Før du begynder at forberede arbejdsvæsken, skal du bestemme den nøjagtige mængde, der er nødvendig. Hæld den afmålte mængde sprøjtemiddel i den delvist fyldte sprøjtetank med omrøreren tændt, og fyld derefter op med vand til den ønskede mængde. Efter at sprøjtemidlet er hældt i sprøjtetanken uden hydraulisk omrører, blandes væsken mekanisk i tanken.

Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og hæld skyllemidlet i beholderen med arbejdsvæsken. Blandingen tilberedes umiddelbart før brug. Ved afbrydelser i sprøjtningen skal arbejdsvæsken blandes grundigt i sprøjtetanken, inden arbejdet genoptages.

HÅNDTERING AF BRUGBARE VÆSKERESTER OG RENGØRING AF UDSKYR

Rester af arbejdsvæsken efter behandling skal håndteres på en måde, der begrænser risikoen for forurening af overfladevand og grundvand i henhold til vandlovgivningens bestemmelser og jordforurening, dvs.:

- efter fortynding, brug på den overflade, hvorpå behandlingen blev udført, hvis det er muligt, eller
- bortskaffes ved hjælp af tekniske løsninger, der sikrer biologisk nedbrydning af de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller
- bortskaffes på anden måde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Vask udstyret grundigt efter arbejdet.

Hvis udstyret vaskes med rengøringsmidler, der er beregnet til dette formål, skal de resulterende skylninger håndteres i overensstemmelse med den medfølgende anvisning til rengøringsmidlet.

FORHOLDSREGLER FOR PERSONER, DER BRUGER AGENTEN, MEDARBEJDERE OG TILBAGESTE

Før produktet tages i brug, skal alle interesserede parter informeres om det.

parter, der kan blive udsat for driften af den brugbare væske, og som har anmodet om en sådan information.

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Brug beskyttelseshandsker og arbejdstøj (overalls) for at beskytte mod virkningen af plantebeskyttelsesmidler og passende fodtøj under forberedelse af arbejdsvæsken og under proceduren.

Perioden fra foranstaltningens anvendelse til den dag, hvor det område, hvor foranstaltningen blev anvendt, er berørt.

Personer kan komme ind, og dyr kan medbringes (forebyggelsesperiode):

• Gå ikke ind, før væsken på overfladen er helt tørret

planter,

• Introducer ikke husdyr på græsarealer og enge i 5 dage.

MILJØMÆSSIGE FORHOLDSREGLER

Forurens ikke vand med plantebeskyttelsesmidler eller deres emballage. Vask ikke udstyr. nær overfladevand. Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter. fra gårde og veje.

Undgå utilsigtet udledning til miljøet.

For at beskytte vandlevende organismer er det nødvendigt at udpege en beskyttelseszone 1 m bred fra reservoirer og vandløb.

For at beskytte planter og leddyr, der ikke er målarter, er det nødvendigt udpegning af en beskyttelseszone med en bredde på:

• 5 m fra ubrugt landbrugsjord eller

• 1 m fra ubrugt landbrugsjord med samtidig brug af teknikker

reducerer driften af arbejdsvæsken under behandlingen med 75%.

BETINGELSER FOR OPBEVARING OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF BESKYTTELSESMIDLET PLANTER OG EMBALLAGE OG FØRSTEHJÆLP

BETINGELSER FOR OPBEVARING OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF BESKYTTELSESMIDLET PLANTER OG EMBALLAGE

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar plantebeskyttelsesmidlet:

- i original emballage,
- på en måde, der forhindrer kontakt med fødevarer, drikkevarer eller foder, kontaminering miljø og adgang fra tredjeparter,
- i en tæt lukket beholder,
- ved en temperatur på 0°C - 30°C.

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.
mål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle affald.

Det anbefales at returnere den tomme emballage til sælgeren af beskyttelsesudstyret.
planter eller kan behandles som kommunalt affald. I tvivlstilfælde vedr.

For rådgivning om håndtering af emballage, kontakt din sælger af plantebeskyttelsesmidler.

FØRSTEHJÆLP

Modgift: ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Gyldighedsperiode - 2 år

Produktionsdato -

Netindhold -

Batchnummer -