

Vergunninghouder:

Monsanto Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warschau,
tel.: 22 395 65 00, fax: 22 395 65 01, hotline: 22 395 65 09, www.monsanto.pl

De entiteit die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke verpakking en etikettering van een gewasbeschermingsmiddel.....
De entiteit die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke etikettering van het gewasbeschermingsmiddel.....

RODEO PLUS

Het product is bedoeld voor gebruik door professionele gebruikers.

Actieve stofgehalte:

glyfosaat (een verbinding uit de aminofosfonaatgroep) in de vorm van kaliumzout - **360 g/l (28,7%)**.

Vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 80/2022 van 12 juli 2022

EUH 066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

EUH 401 – Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden.

BESCHRIJVING VAN DE WERKING

Een niet-selectieve herbicide met systemische werking, die als concentraat op de bladeren wordt aangebracht voor het bereiden van een waterige oplossing (SL).

Volgens de HRAC-classificatie is de werkzame stof glyfosaat ingedeeld in groep 9 (voorheen groep G).

ACTIE TEGEN ONKRUID

Het product bevat de werkzame stof glyfosaat, een remmer van de werking van het enzym glyfosaatsynthase.

EPSPS, een sleutelenzym in de metabole route van shikiminezuur

Gerelateerd aan de biosynthese van aromatische aminozuren. In de plant veroorzaakt het remming.

Synthese van eiwitten die essentieel zijn voor plantengroei.

Het middel wordt opgenomen via de groene delen van planten (bladeren, groene scheuten en niet-houtachtige schors).
en beweegt zich vervolgens door de hele plant en bereikt de ondergrondse delen (wortels, hardlopers etc.) waardoor ze sterven.

De eerste symptomen van de werking van het middel (vergeling en verwelking) zijn na 7–10 dagen zichtbaar

Na de behandeling. De plant sterft volledig af na ongeveer 3 weken.

Hoge temperaturen en vochtigheid, evenals sterk zonlicht, versnellen actie van de agent.

	Dosering gewasbeschermingsmiddel	
	1,5-2,0 l/ha*	3,0 l/ha
Gevoelige onkruiden	veldmosterd, muur, witte ganzenvoet, duizendknoop gevlekt, tas gewone veldbundels	kleine geranium, gierstgras, gewone vogelmuur, Perzische ereprijs, Canadees bijvoeglijk naamwoord, duizendknoop gevlekte, oude bidsprinkhaan, herderstasje, weidegras weidegras, eenjarig weidegras
Onkruid gemiddeld gevoelig	eenzijdig onkruid	paarse dovenetel, ganzenvoet wit, kweekgras, duizendknoop akkerwinde, akkervossenstaart

* Onkruid in het zaailingstadium

TOEPASSING VAN DE AGENT

Het middel is bedoeld voor gebruik met veld- en boomgaardspuiten.
met een onkruidverdelgingsboom en handspuiten (waaronder rugspuiten).

Aandacht:

Gebruik het gewasbeschermingsmiddel niet in parken en openbare tuinen, in gebieden sport-, recreatie-, scholen-, kleuterscholen-, kinderdagverblijven- en zorginstellingen gezondheid.

Landbouvvelden na het zaaien/planten maar voordat het gewas opkomt

Aardappel, suikerbiet

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 1,5 - 3,0 l/ha.

Pas de dosering van het middel aan op basis van de intensiteit en de aanwezige onkruidsoort.

Deadline voor gebruik van het product:

Breng het product aan na opkomst van het onkruid, maar uiterlijk 3 dagen vóór opkomst van het gewas.
Het is belangrijk dat de gezaaide zaden (geplante knollen) bedekt zijn met aarde.
om ze tegen schade te beschermen.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen hoeveelheid water: 100 - 400 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

AANDACHT

Het wordt afgeraden het middel te gebruiken op gezaaide wortelzaden.

Na de oogst van de gewassen, vóór aanvang van de na-oogstteelt om bestrijding van kweekgras en ander onkruid (stoppel).

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 1,5 - 3,0 l/ha.

Pas de dosering van het middel aan op basis van de intensiteit en de aanwezige onkruidsoort.

Deadline voor gebruik van het product:

Breng het product aan van half augustus tot laat in de herfst op krachtig groeiend groen onkruid. Voer geen grondbewerking uit na de oogst en vóór de toepassing van het product. Op het moment van toepassing moet kweekgras een hoogte hebben bereikt van

10-25 cm hoog en produceert minimaal 3-4 volledig ontwikkelde bladeren. Eenjarige eenzaadlobbige onkruiden moeten minimaal 5 cm hoog zijn en tweezaadlobbige onkruiden moeten twee volledig ontwikkelde echte bladeren produceren.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen hoeveelheid water: 100 - 400 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Appelboom

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,0 - 3,0 l/ha.

Pas de dosering van het middel aan op basis van de intensiteit en de aanwezige onkruidsoort.

Deadline voor gebruik van het product:

Het middel kan van het voorjaar tot en met de herfst worden gebruikt op intensief groeiend onkruid, in een dosering die afhankelijk is van de soort die aanwezig is op aanplantingen die ouder zijn dan 2 jaar.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 3.

Interval tussen de behandelingen: minimaal 28 dagen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 100-400 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

OPMERKINGEN

1. Verwijder voor het spuiten alle worteluitlopers mechanisch.

2. Spuit veilig, bij voorkeur met een spuitapparaat met beschermkappen, zodat

druppels van de werkvloeistof kwamen niet op de bladeren, scheuten en niet-houtachtige schors van bomen terecht
vanwege de mogelijkheid van schade aan de planten.

Wijnstok

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor een enkele toepassing: 2,0 - 3,0 l/ha.

Pas de dosering van het middel aan op basis van de intensiteit en de aanwezige onkruidsoort.

Deadline voor gebruik van het product:

Het middel kan van de lente tot de herfst worden gebruikt op intensief groeiende onkruiden, in een dosering afhankelijk van de soort die aanwezig is op aanplantingen ouder dan 2 jaar.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 3.

Pauze tussen de behandelingen – minimaal 28 dagen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 100-400 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Grasland – weilanden, weiden.

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,0 - 3,0 l/ha.

Pas de dosering van het middel aan op basis van de intensiteit en de aanwezige onkruidsoort.

Deadline voor gebruik van het product:

Gebruik het product tijdens periodes van intensieve onkruidgroei en gedurende de gehele vegetatieperiode.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen hoeveelheid water: 100 - 400 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

AANDACHT

Gebruik het product uitsluitend op graslanden die bestemd zijn voor grasvernieuwing.

TOEPASSING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN GEWASSEN EN TOEPASSINGEN OP KLEINE GEBIEDEN

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de effectiviteit en fytotoxiciteit van een gewasbeschermingsmiddel dat in kleine teelten wordt gebruikt.

Het middel dat in kleine gewassen wordt gebruikt, kan ook andere soorten bestrijden onkruid dan aangegeven op het etiket punt **Effect op onkruid**, het is echter niet duidelijk bevestigd door onderzoek. Om gedetailleerde informatie te verkrijgen, informatie over het spectrum van onkruiden die bestreden moeten worden en hun gevoeligheid voor de toegepaste bij kleinschalige teelten wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigenaar van het gewasbeschermingsmiddel vergunning of zijn vertegenwoordiger.

Peer, kers.

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,0 - 3,0 l/ha.

Pas de dosering van het middel aan op basis van de intensiteit en de aanwezige onkruidsoort.

Deadline voor gebruik van het product:

Het middel kan van de lente tot de herfst worden gebruikt op intensief groeiende onkruiden, in een dosering afhankelijk van de soort die aanwezig is op aanplantingen ouder dan 2 jaar.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 3.

Interval tussen de behandelingen: minimaal 28 dagen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 100-400 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

OPMERKINGEN

1. Verwijder voor het spuiten alle worteluitlopers mechanisch.
2. Spuit veilig, bij voorkeur met een spuitbus met deksel, zodat druppels spuitvloeistof niet op de bladeren, scheuten en niet-houtachtige bast van bomen terechtkomen, omdat dit de planten kan beschadigen.

VOORZORGSMATREGELEN EN BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

1. Strategie voor immuniteitsbeheer

Om het risico op het ontstaan en de ontwikkeling van onkruidresistentie tegen herbiciden te minimaliseren, in overeenstemming met Goede Landbouwpraktijken:

- volg strikt de instructies op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel, gebruik het product in de aanbevolen dosering en binnen de aanbevolen tijd om een optimale onkruidbestrijding te garanderen,

- de keuze van het herbicide en de beslissing om de behandeling uit te voeren, afstemmen op de bestaande (of potentiële) onkruidplaag, rekening houdend met de dominante soorten en de schadelijkheidsdrempels,
- gebruik rotatie van herbiciden (werkzame stoffen) met verschillende werkingsmechanismen,
- gebruik een mengsel van herbiciden (werkzame stoffen) met verschillende werkingsmechanismen acties,
- gebruik herbiciden in rotatie en/of mengsels die verschillende levensprocessen van onkruid beïnvloeden (met verschillende werkingsmechanismen),
- gebruik een herbicide met een bepaald werkingsmechanisme slechts één keer per seizoen vegetatie van de landbouwplant,
- de teeltprocedures aanpassen aan de omstandigheden op het veld, met name aan het type en de intensiteit van het onkruid,
- gebruik maken van verschillende methoden voor onkruidbestrijding, waaronder vruchtwisseling, enz.,
- gebruik gecertificeerd zaad,
- schone landbouwmachines om de overdracht van teeltmateriaal te voorkomen onkruid naar andere posities,
- de vergunninghouder informeren over onvoldoende onkruidbestrijding,
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur, vergunninghouder of vertegenwoordiger van de vergunninghouder.

2. Aanbevolen werkdruk: 2-3 atmosfeer.

3. Zorg ervoor dat de tank volledig ontlucht is wanneer de werkvloeistof zich in de spuittank bevindt.

4. Gebruik de in de spuittank bereide werkvloeistof onmiddellijk.

5. Let op de waarschuwingen en contra-indicaties tijdens het werk.

6. Gebruik het product niet:

- voordat het onkruid opkomt,
- op bladeren, scheuten en niet-houtachtige schors van bomen en struiken vanwege de mogelijkheid
- plantenschade,
- voor natte planten,
- vóór verwachte regen (neerslag die binnen 1 uur na de verwachte regen valt)
(spuiten kan de effectiviteit van de behandeling verminderen)
- bij windomstandigheden waarbij de vloeistof kan wegdrijven.

7. Bij gebruik van het product mag u het volgende niet toestaan:

• het afdrijven van de werkvloeistof naar naburige landbouwplantages,

overlapping van de werkvloeistof op de kruispunten van de behandelingsstroken en de kopakkers.

GRATIEPERIODEN

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst van het gewas (wachttijd):

appel, peer, kers – 28,

wijnstok – 30.

aardappel, suikerbiet – niet vereist

De periode vanaf de laatste toepassing van het product tot de dag van de laatste toepassing van het product op de gewassen die bestemd zijn voor veevoer.

welke dieren mogen met deze planten gevoerd worden (wachttijd voer):

Weiden, weilanden – 21 dagen

PLANTENOPVOLGING

Op het veld waar Rodeo Plus is gebruikt, kunnen alle planten worden gekweekt.

Met het cultiveren, zaaien of planten kan worden begonnen zodra de te bestrijden onkruiden symptomen van de werking van het middel vertonen (vergeling en verwelking), maar niet eerder dan na 3 maanden. dagen.

BEREIDING VAN BRUIKBARE VLOEISTOF

Voordat u begint met het bereiden van de werkvloeistof, bepaalt u nauwkeurig hoeveel u nodig hebt.

Giet de afgemeten hoeveelheid van het middel in de gedeeltelijk gevulde spuittank met ingeschakelde roerder en vul vervolgens bij met water tot het gewenste volume. Nadat u het middel in de spuittank hebt gegoten zonder hydraulische roerder, mengt u de vloeistof in de tank mechanisch.

Spoel lege verpakkingen driemaal met water en giet het spoelmiddel in de verpakking met de werkvloeistof. Bereid het mengsel direct voor gebruik.

Bij onderbrekingen in het spuitwerk dient u de werkvloeistof in de spuittank grondig te mengen alvorens u het werk hervat.

BEHANDELING VAN BRUIKBARE VLOEIBARE RESIDUEN EN REINIGING VAN APPARATUUR

Restanten van de werkvloeistof na de behandeling dienen op een wijze te worden behandeld die het risico op verontreiniging van het oppervlaktewater en het grondwater in de zin van de bepalingen van de Waterwet en van bodemverontreiniging beperkt, te weten:

- na verdunning, indien mogelijk, gebruiken op het oppervlak waarop de behandeling is uitgevoerd, of
- worden afgevoerd met behulp van technische oplossingen die de biologische afbraak van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen garanderen, of
- op een andere wijze afvoeren, overeenkomstig de afvalvoorschriften.

Maak de apparatuur na het werk grondig schoon.

Indien de apparatuur wordt gereinigd met reinigingsmiddelen die daarvoor bestemd zijn, dienen de resulterende spoelingen te worden behandeld in overeenstemming met de instructies die bij het reinigingsmiddel zijn geleverd.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PERSONEN DIE DE AGENT GEBRUIKEN, MEDEWERKERS EN OMSTANDERS

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden hierover worden geïnformeerd.

partijen die mogelijk worden blootgesteld aan de drift van de bruikbare vloeistof en die om dergelijke bescherming hebben verzocht informatie.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Gebruik beschermende handschoenen en werkkleding (overalls) om u te beschermen tegen de impact van gewasbeschermingsmiddelen en geschikt schoeisel tijdens voorbereiding van de werkvloeistof en tijdens de procedure.

De periode vanaf de toepassing van de maatregel tot de dag waarop het gebied waar de maatregel is toegepast, wordt beïnvloed.

Mensen mogen binnenkomen en dieren mogen worden binnengebracht (preventieperiode):

- ga niet naar binnen voordat de vloeistof op het oppervlak volledig is opgedroogd
planten,

• laat landbouwhuisdieren gedurende 5 dagen niet op graslanden en weilanden komen.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Verontreinig het water niet met gewasbeschermingsmiddelen of de verpakking ervan. Was de apparatuur niet. Dichtbij oppervlaktewater. Vermijd waterverontreiniging via afwateringsloten. van boerderijen en wegen.

Voorkom onbedoelde lozing in het milieu.

Om waterorganismen te beschermen is het noodzakelijk een beschermingszone aan te wijzen 1 m breed vanaf reservoirs en waterlopen.

Om planten en niet-doelwitgeleedpotigen te beschermen is het noodzakelijk

aanwijzing van een beschermingszone met een breedte van:

- 5 m van ongebruikte landbouwgrond of
- 1 m van ongebruikte landbouwgrond bij gelijktijdig gebruik van technieken
vermindering van de drift van de werkvloeistof tijdens de behandeling met 75%.

VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMENDE MIDDEL PLANTEN EN VERPAKKINGEN EN EHBO

VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMENDE MIDDEL PLANTEN EN VERPAKKINGEN

Buiten bereik van kinderen houden.

Bewaar het gewasbeschermingsmiddel:

- in originele verpakking,
- op een manier die contact met voedsel, drank of veevoer en besmetting voorkomt
omgeving en toegang van derden,
- in een goed gesloten verpakking,
- bij een temperatuur van 0°C - 30°C.

Het is niet toegestaan lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken. doelen.

Ongebruikte producten dienen te worden ingeleverd bij een instantie die bevoegd is om afval te verzamelen.

Het is aan te raden de lege verpakking te retourneren naar de verkoper van de beschermingsmiddelen. planten of kunnen als gemeentelijk afval worden behandeld. In geval van twijfel over

Voor advies over het omgaan met verpakkingen kunt u contact opnemen met de verkoper van uw gewasbeschermingsmiddelen.

E.H.B.O

Tegengif: geen, symptomatisch behandelen.

Indien u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Geldigheidsduur - 2 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -