

Tillståndsinnehavare:

Monsanto Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel.: 22 395 65 00, fax: 22 395 65 01, telefonjour: 22 395 65 09, www.monsanto.pl

Den enhet som ansvarar för slutförpackningen och märkningen av ett växtskyddsmedel.....
Den enhet som ansvarar för den slutliga märkningen av växtskyddsmedlet.....

RODEO PLUS

Produkten är avsedd för professionella användare.

Innehåll av aktiv substans:

glyfosat (en förening från aminofosfonatgruppen) i form av kaliumsalt - **360 g/l (28,7 %)**.

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R - 80/2022 av den 12 juli 2022

EUH 066 - Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller hudsprickor.

EUH 401 – För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

BESKRIVNING AV VERKSAMHET

En icke-selektiv herbicid med systemisk verkan, appliceras bladmässigt, i form av ett koncentrat.

för att framställa en vattenlösning (SL).

Enligt HRAC-klassificeringen klassificeras det aktiva ämnet glyfosat i grupp 9 (tidigare grupp G).

ÅTGÄRDER MOT OGRÄS

Produkten innehåller den aktiva substansen glyfosat, som är en hämmare av enzymet glyfosatsyntas.

EPSPS, vilket är ett viktigt enzym i shikiminsyrans metaboliska väg

relaterad till biosyntesen av aromatiska aminosyror. I växten orsakar det hämning

syntes av proteiner som är viktiga för växttillväxt. Medlet

absorberas genom växternas gröna delar (blad, gröna skott och icke-vedartad bark)

och rör sig sedan genom växten och når dess underjordiska delar (rötter,

löpare etc.) vilket får dem att dö.

De första symtomen på medlets verkan (gulning och vissnande) är synliga efter 7–10 dagar

efter behandlingen. Växten dör fullständigt efter cirka 3 veckor.

Hög temperatur och luftfuktighet samt starkt solljus accelererar agentens handling.

	Dos av växtskyddsmedel	
	1,5–2,0 l/ha*	3,0 l/ha
Känsliga ogräs	åkersenap, kycklingört, vit gåsfot, knölväxt prickig, handväska vanliga fältbuntar	liten pelargon, ladugårdsgräs, vanlig vattenjus, persisk ärepris, kanadensiskt adjektiv, knotweed fläckig, gammal bönsyrsa, herdeväska, ängsgräs ängsgröe, ettårigt ängsgröe
Ogräs medelkänslig	ensidig ogräs	lila dödnässla, gåsfot vit, kvist, knott åkervinda, räsvans

* Ogräs i plantstadiet

ANVÄNDNING AV MEDELET

Medlet är avsett för användning med fält- och fruktträdgårdssprutor.

med en herbicidbom och handsprutor (inklusive ryggsprutor).

Uppmärksamhet:

Använd inte växtskyddsmedlet i parker och offentliga trädgårdar, i områden

idrott, fritid, skolor, förskolor, förskolor och vårdhem

hälsa.

Åkrar efter sådd/plantering men innan grödan kommer fram

Potatis, sockerbeta

Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 1,5–3,0 l/ha.

Anpassa dosen av medlet till intensiteten och arten av ogräs som förekommer.

Sista datum för användning av produkten:

Applicera produkten efter att ogräset har kommit fram, men senast 3 dagar innan grödan kommer fram. Det är viktigt att de sådda fröna (planterade knölar) täcks med jord.

skyddar dem från skador.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Rekommenderad vattenmängd: 100–400 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

UPPMÄRKSAMHET

Det rekommenderas inte att använda medlet på sådda morotsfrön.

Efter skörd av grödorna, innan odling efter skörd påbörjas för att bekämpning av kvikgräs och annat ogräs (stubb).

Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 1,5–3,0 l/ha.

Anpassa dosen av medlet till intensiteten och arten av ogräs som förekommer.

Sista datum för användning av produkten:

Applicera produkten från mitten av augusti till sen höst på kraftigt växande gröna ogräs. Utför ingen jordbearbetning efter skörd av grödan och före applicering av produkten. Vid appliceringstillfället bör kvikgräset ha nått en höjd av

10–25 cm höga och producera minst 3–4 fullt utvecklade blad. Ettåriga enhjärtbladiga ogräs bör vara minst 5 cm höga, och tvåhjärtbladiga ogräs bör producera två fullt utvecklade riktiga blad.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Rekommenderad vattenmängd: 100–400 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Äppelträd

Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 2,0–3,0 l/ha.

Anpassa dosen av medlet till intensiteten och arten av ogräs som förekommer.

Sista datum för användning av produkten:

Medlet kan användas från vår till höst, på intensivt växande ogräs, i en dos beroende på arten som finns på planteringar äldre än 2 år.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 3.

Intervall mellan behandlingar: minst 28 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 100–400 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

KOMMENTARER

1. Avlägsna alla rotskott mekaniskt före sprutning.

2. Spraya säkert, helst med sprutor med skydd så att

droppar av arbetsvätskan kom inte på trädens blad, skott och icke-vedartad bark
på grund av risken för skador på växter.

Vin

Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbehandling: 2,0–3,0 l/ha.

Anpassa dosen av medlet till intensiteten och arten av ogräs som förekommer.

Sista datum för användning av produkten:

Medlet kan användas från vår till höst, på intensivt växande ogräs, i en dos beroende på vilka arter som finns på planteringar äldre än 2 år.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 3.

Uppehåll mellan behandlingarna – minst 28 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 100-400 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Gräsmark – ängar, betesmarker.

Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 2,0–3,0 l/ha.

Anpassa dosen av medlet till intensiteten och arten av ogräs som förekommer.

Sista datum för användning av produkten:

Använd produkten under perioder med intensiv ogrästillväxt under hela vegetationsperioden.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

Rekommenderad vattenmängd: 100–400 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

UPPMÄRKSAMHET

Använd produkten endast på gräsmarker avsedda för förnyelse.

ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL I GRÖDOR OCH APPLIKATIONER PÅ SMÅ OMRÅDEN

Användaren är ensamt ansvarig för effektiviteten och fytotoxiciteten hos ett växtskyddsmedel som används i mindre grödor.

Medlet som används i mindre grödor kan även bekämpa andra arter ogräs än vad som anges i etikettpunkten **Effekt på ogräs**, men det har inte tydligt bekräftad av forskning. För att få detaljerad information, information om spektrumet av ogräs som ska bekämpas och deras känslighet för den applicerade I småskaliga grödor rekommenderas växtskyddsmedel, kontakta ägaren tillstånd eller dennes ombud.

Päron, körsbär.

Maximal dos för engångsbehandling: 3,0 l/ha.

Rekommenderad dos för engångsbruk: 2,0–3,0 l/ha.

Anpassa dosen av medlet till intensiteten och arten av ogräs som förekommer.

Sista datum för användning av produkten:

Medlet kan användas från vår till höst, på intensivt växande ogräs, i en dos beroende på vilka arter som finns på planteringar äldre än 2 år.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 3.

Intervall mellan behandlingar: minst 28 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 100-400 l/ha.

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

KOMMENTARER

1. Avlägsna alla rotskott mekaniskt före sprutning.
 2. Spraya säkert, helst med sprutor med lock, så att droppar av sprutvätskan inte hamnar på löv, skott och trädbark på grund av risken att skada växterna.
-

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄRSKILDA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

1. Strategi för immunitetshantering

För att minimera risken för uppkomst och utveckling av ogräsresistens mot herbicider, i enlighet med god jordbrukspraxis:

- följ noggrant anvisningarna på växtskyddsmedlets etikett, använd produkten i rekommenderad dos och inom den rekommenderade tiden för att säkerställa optimal ogräsbekämpning,

- anpassa valet av herbicid och beslutet att utföra behandlingen till det befintliga (eller potentiella) ogräsangreppet, med hänsyn till den dominerande arten och tröskelvärdena för skadlighet,
- använda rotation av herbicider (aktiva substanser) med olika verkningsmekanismer,
- använda en blandning av herbicider (aktiva substanser) med olika mekanismer handlingar,
- använda herbicider i rotation och/eller blandningar som påverkar flera ogräslivsprocesser (med olika verkningsmekanismer),
- använd ett herbicidmedel med en given verkningsmekanism endast en gång per säsong vegetation av grödan,
- anpassa odlingsförfarandena till de förhållanden som råder på fältet, särskilt för att ogräsens typ och intensitet,
- använda olika metoder för ogräsbekämpning, inklusive växtföljd etc.
- använda certifierat utsäde,
- rena jordbruksmaskiner för att förhindra överföring av förökningsmaterial ogräs till andra positioner,
- informera tillståndshavaren om otillfredsställande ogräsbekämpning,
- För mer information, vänligen kontakta din rådgivare, tillståndshavare eller tillståndshavarens representant.

2. Rekommenderat arbetstryck: 2–3 atmosfärer.

3. Under drift, när arbetsvätskan finns i spruttanken, se till att tanken är helt avluftad.

4. Använd omedelbart den arbetsvätska som förberetts i sprutbehållaren.

5. Observera försiktighetsåtgärder och kontraindikationer under arbetet.

6. Använd inte produkten:

- innan ogräset kommer upp,
- på blad, skott och icke-vedartad bark hos träd och buskar på grund av möjligheten
- växtskador,
- för våta växter,
- före förväntat regn (nederbörd som inträffar inom 1 timme efter sprayning kan minska behandlingens effektivitet),
- vid vindförhållanden som kan få vätskan att driva bort.

7. Tillåt inte följande när du använder produkten:

 • avdrift av arbetsvätskan till angränsande odlingar,

överlappning av arbetsvätskan vid korsningarna mellan behandlingsremsorna och vändtegen.

RESPEKTPERIODER

Period från sista appliceringen av medlet till skörddagen (karensperioden):

äpple, päron, körsbär – 28,

vinstock – 30.

potatis, sockerbeta – ej nödvändigt

Perioden från den sista appliceringen av produkten till dagen för den sista appliceringen av produkten på de grödor som är avsedda som foder vilka djur kan utfodras med dessa växter (karenstid för foder):

Ängar, betesmarker – 21 dagar

VÄXTSUCCESSION

På fältet där Rodeo Plus användes kan alla växter odlas.

Odling, sådd eller plantering kan påbörjas när ogräset som ska bekämpas visar symptom på medlets verkan (gulning och vissnande), men tidigast efter 3 månader.
dagar.

BEREDNING AV ANVÄNDBAR VÄTSKA

Innan du börjar förbereda arbetsvätskan, bestäm exakt hur mycket som behövs.

Häll den uppmätta mängden medlet i den delvis fyllda sprutbehållaren med omröraren påslagen och fyll sedan på med vatten till önskad volym. Efter att medlet har hållits i sprutbehållaren utan hydraulisk omrörare, blanda vätskan i behållaren mekaniskt.

Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och häll sköljmedlet i behållaren med arbetsvätskan. Förbered blandningen omedelbart före användning.

Vid avbrott i sprutningen, blanda arbetsvätskan noggrant i sprutbehållaren innan arbetet återupptas.

HANTERING AV ANVÄNDBARA VÄTSKERESTER OCH RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rester av arbetsvätskan efter behandling bör hanteras på ett sätt som begränsar risken för förorening av yt- och grundvatten i den mening som avses i vattenlagens bestämmelser och markförorening, dvs.:

- efter utspädning, använd på den yta där behandlingen utfördes, om möjligt, eller
- bortskaffas med hjälp av tekniska lösningar som säkerställer biologisk nedbrytning av de aktiva substanserna i växtskyddsmedel, eller
- kassera på annat sätt i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Tvätta utrustningen noggrant efter arbetet.

Om utrustningen diskas med rengöringsmedel avsedda för detta ändamål, ska de resulterande sköljningarna hanteras i enlighet med de instruktioner som medföljer rengöringsmedlet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM ANVÄNDER AGENTEN, ANSTÄLLDA OCH ÅSKÅDARE

Innan produkten används bör alla berörda parter informeras om den.

parter som kan utsättas för driften av den användbara vätskan och som har begärt sådan information.

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Använd skyddshandskar och arbetskläder (overaller) för att skydda mot effekten av växtskyddsmedel och lämpliga skor under beredning av arbetsvätskan och under proceduren.

Perioden från det att åtgärden tillämpas till den dag då det område där åtgärden tillämpades påverkas. Människor kan komma in och djur kan föras in (förebyggande period):

• gå inte in förrän vätskan på ytan har torkat helt
växter,

• Introducera inte lantbruksdjur till gräsmarker och ängar på 5 dagar.

MILJÖFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Förorena inte vatten med växtskyddsmedel eller deras förpackningar. Tvätta inte utrustningen nära ytvatten. Undvik vattenförorening genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

Undvik oavsiktliga utsläpp i miljön.

För att skydda vattenlevande organismer är det nödvändigt att utse en skyddszon 1 m bred från reservoar och vattendrag.

För att skydda växter och leddjur som inte är målarter är det nödvändigt utnämning av en skyddszon med en bredd av:

• 5 m från oanvänd jordbruksmark eller

• 1 m från oanvänd jordbruksmark med samtidig användning av tekniker vilket minskar driften av arbetsvätskan under behandlingen med 75 %.

FÖRHÅLL FÖR FÖRVARING OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV SKYDDSMEDELET VÄXTER OCH FÖRPACKNINGAR OCH FÖRSTA HJÄLPEN

FÖRHÅLL FÖR FÖRVARING OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV SKYDDSMEDELET VÄXTER OCH FÖRPACKNINGAR

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara växtskyddsmedlet:

- i originalförpackning,
- på ett sätt som förhindrar kontakt med livsmedel, drycker eller foder, kontaminering miljö och åtkomst från tredje part,
- i en tätt sluten behållare,
- vid en temperatur på 0°C - 30°C.

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar för växtskyddsmedel för andra ändamål.
mål.

All oanvänd produkt ska lämnas till en enhet som är behörig att samla in avfall.

Det rekommenderas att returnera den tomma förpackningen till säljaren av skyddsutrustningen.
växter eller kan behandlas som kommunalt avfall. Vid tveksamhet angående
För råd om hantering av förpackningar, kontakta din återförsäljare av växtskyddsmedel.

FÖRSTA HJÄLPEN

Motgift: inget, behandla symptomatiskt.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Giltighetstid - 2 år

Produktionsdatum -

Nätinnehåll -

Batchnummer -