

Tilladelsesindehaver:

CIECH Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tlf.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com

Enhed ansvarlig for den endelige emballage og mærkning af plantebeskyttelsesmidlet:

.....

AGROSAR 360 SL

Produktet er beregnet til brug for ikke-professionelle brugere.

Indhold af aktivt stof:

glyphosat (en forbindelse fra aminofosfonatgruppen) - 360 g/l (30,9%).

Tilladelse fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter nr. R-35/2014 af 13. marts 2014.

fornyet ved afgørelse nr. 474/2020d fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter af 23. juli 2020

	
Opmærksomhed	
H317 H412	Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH401 Følg brugsanvisningen for at undgå risici for menneskers sundhed og miljøet.	
P261	Undgå at indånde spray.
P272	Tag ikke forurenede beskyttelsestøj med uden for arbejdspladsen.
P280	Brug beskyttelseshandsker
P302 + P352 Ved KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand	
P333 + P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. søg råd/kontakt en læge.	
P362 + P364 Fjern forurenede tøj og vask det før genbrug.	

BESKRIVELSE AF HANDLINGEN

Ikke-selektivt herbicid med systemisk virkning, til bladpåføring, tilgængelig i form af et koncentrat til fremstilling af en vandig opløsning (SL).

Ifølge HRAC-klassificeringen er aktivstoffet glyphosat klassificeret som gruppe G.

INDSATS MOD UKRUDS

Midlet absorberes gennem plantens grønne dele (blade, grønne skud og ikke-træagtig bark), spredes derefter gennem planten og når dens underjordiske dele (rødder, udløbere osv.), hvilket får dem til at dø. De første symptomer på midlets virkning (gulfarvning og visnen) bliver synlige 7-10 dage efter behandlingen. Fuldstændig plantedød indtræffer efter 2-3 uger. Høj temperatur, fugtighed og stærkt sollys fremskynder midlets virkning.

Dosis af midlet	Følsomme ukrudt
30,0 ml/100 m ² stall	græs, fuglegræs, hvid gåsefod, markvalmue, duftløs kamille, canadisk emmer, snerle (syn. snerle), gammel-græs, hyrdetaske, enårig engrapgræs.
40,0 ml/100 m ² stall	græs, stedmoderblomst, fuglegræs, hvid gåsefod, markvalmue, duftløs kamille, kvikgræs, canadisk emmer, kløverblad, snerle (syn. snerle), bynke-brand, hyrdetaske, enårig engrapgræs.
50,0 ml/100 m ² Ribwort	vejbred, almindelig vejbred, almindelig bynke, kornblomst, gårdgræs, markviol, marksennep, almindelig fuglegræs, almindelig nåleurt, purpurbrændenælde, hvid gåsefod, hvidkløver, hanefod, markvalmue, duftløs kamille, canadisk gyldenris, vildhavre, blodgræs, kvik, grøn blomsterskærm, canadisk emmer, kløverblad, snerle (syn. snerle), almindelig hornurt, almindelig kamille, almindelig bynke, almindelig bynke, grov amarant, stumpskov, almindelig skovsyre, gul skovskov, almindelig hyrdetaske, agerenggræs, enårig engrapgræs, grøn rævehale, vikke fuglefod, smalbladet vikke.
75,0 ml/100 m ² Ribwort	vejbred, almindelig vejbred, almindelig bynke, kornblomst, gårdgræs, markviol, marksennep, almindelig fuglegræs, almindelig nåleurt, purpurbrændenælde, hvid gåsefod, hvidkløver, hundebrod, markvalmue, duftløs kamille, agermælkerups, mælkebøtte, canadisk gyldenris, vildhavre, almindelig krabbegræs, kvikgræs, grøn blomsterskærm, trefløget ærenpris, canadisk emmer, kløverblad, almindelig snerre, almindelig pileurt, snerle (syn. snerle), almindelig hornurt, almindelig kamille, almindelig bynke, almindelig bynke, grov amarant, marksyre, stumpsyre, almindelig skovsyre, gul skovsyre, almindelig hyrdetaske, agerrapgræs, enårig engrapgræs, grøn rævehale, vild vikke, smalbladet vikke.
75,0 ml/100 m ² brugt to gange	Ribwort-vejbred, almindelig vejbred, lille geranium, rød geranium, almindelig bynke, kornblomst, gårdgræs, større celandine, marksennep, almindelig fuglegræs, almindelig nåleurt, krybende ranunkel, purpur-nød, hvid gåsefod, markkløver, almindelig røllike, hundebrod, duftløs kamille, markmælkebøtte, canadisk gyldenris, marktidset, vildhavre, almindelig krabbegræs, kvikgræs, grøn blomsterskærm, jordhyld, almindelig nælde, marksnerle, persisk ærenpris, trefløget ærenpris, canadisk emmer, kløverblade, almindelig pileurt, almindelig hornurt, almindelig kamille, bynke, grov amarant, syreskov, marksyre, almindelig syreskov, gul syreskov, almindelig hyrdetaske, marksækurt, enårig engrapgræs, grøn rævehale, fuglevikke, smalbladet vikke.
80,0 ml/100 m ² Ribwort	vejbred, almindelig vejbred, lille geranium, almindelig bynke, kornblomst, gårdgræs, markviol, marksennep, almindelig fuglegræs, almindelig nåleurt, purpurbrændenælde, hvid gåsefod, hvidkløver, hundebrod, markvalmue, duftløs kamille, agermælkerups, mælkebøtte, canadisk gyldenris, vildhavre, almindelig krabbegræs, kvikgræs, grøn blomsterskærm, trefløget ærenpris, canadisk snerre, kløverblad, almindelig pileurt, snerle (syn. snerle), almindelig hornurt, almindelig kamille, almindelig bynke, almindelig bynke, grov amarant, gul oxalis, marksyre, stumpbladet syreform, almindelig syreform, almindelig hyrdetaske, agerenggræs, enårig engrapgræs, kirtelpileurt, grøn rævehale, fuglevikke, smalbladet vikke.

OPMÆRKSOMHED

Agrosar 360 SL påført to gange med en dosis på 75,0 ml/100 m² forhindrer forekomsten af følgende ukrudtsarter i begyndelsen af den næste vækstsæson: ribwort-vejbred, almindelig vejbred, almindelig bynke, krybende ranunkel, hvidkløver, almindelig røllike,

Canadisk gyldenris, vildhavre, kviste, almindelig nælde, almindelig skovsyre, enårig engrapgræs, grøn rævehale, fuglevikke, smalbladet vikke.

Dosis af midlet	Moderat følsomt ukrudt
30,0 ml/100m ² lille geranium, lilla dødnælde.	
50,0 ml/100 m ² markmælkeurt, brændenælde, persisk ærenpris, pileurt, marksyre, pileurt	
75,0 ml/100m ² almindelig røllike, marktidse, nælde, persisk ærenpris.	

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m ² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m ²	Følsomme ukrudt
	lille geranium, stallgræs, almindelig fuglegræs, purpur-dødnælde, hvid gåsefod, mælkebøtte, kvikgræs, canadisk emmer, almindelig pileurt, almindelig bynke, markpadderokke, almindelig hyrdetaske, enårig engrapgræs, kirtelpilurt.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m ² + Chwastox Professional 750 SL 10,0 ml/100 m ²	Følsomme ukrudt
	lille geranium, stallgræs, markstedmoderblomst, marksennep, almindelig fuglegræs, purpurbrændenælde, hvid gåsefod, almindelig mælkebøtte, duftløs kamille, kvikgræs, persisk ærenpris, mark ærenpris, almindelig pileurt, snerle (syn. snerle), almindelig karse, blød brome, agerpadderokke, almindelig bynke, grov amarant, almindelig hyrdetaske, enårig engrapgræs, kirtelpileurt, småblomstret galurt.

ANVENDELSE AF AGENTET

Midlet er beregnet til brug med en håndsprøjte (inklusive en rygsprøjte).

Opmærksomhed:

Brug ikke plantebeskyttelsesmidlet i offentlige parker og haver, sports- og rekreative områder, skoler, børnehaver, vuggestuer og sundhedsfaciliteter.

Æbletræ

Maksimal dosis til engangsbrug: 80,0 ml/100 m²

Anbefalet dosis til engangsbrug: 30,0 - 80,0 ml/100 m²

Anvendelsesperiode: Påfør produktet fra forår til efterår på grønt ukrudt under dets intensive vækst. Brug den dosis, der er nødvendig for at ødelægge de eksisterende ukrudtsarter.

For at ødelægge flerårigt ukrudt (f.eks. padderokke) kan midlet anvendes i en blanding med herbicidet Chwastox Extra 300 SL eller Chwastox Professional 750 SL i følgende doser:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m²

Agrosar 360 SL smøremiddel 50,0 ml/100 m² + Chwastox Professional 750 SL 10,0 ml/100 m²

Anbefalet vandmængde: 2,0 - 3,0 l/100 m²

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1 (engangsbrug eller i en blanding).

KOMMENTARER:

1. Fjern mekanisk alle rodskud fra æbletræer før sprøjtning.
2. Sprøjt sikkert, helst med sprøjter med afdækning eller net, så dråber af sprøjtevæsken ikke kommer på blade, skud og ikke-træagtig bark på træer på grund af risikoen for at beskadige planterne.

Haver, grunde, områder omkring huset, langs bygningens fundamenter, hegn og andre indhegninger, omkring træer og blomsterbede, under hække og buske, mellem fliser og blokke, i haven og på adgangsveje.

Maksimal dosis til engangsbrug: 75,0 ml/100 m²

Anbefalet dosis til engangsbrug: 50,0 – 75,0 ml/100 m²

Anvendelsesperiode: Brug produktet fra forår til efterår, i varmt vejr, der er gunstigt for ukrudtsvækst.

OPMÆRKSOMHED:

For at bekæmpe kvikgræs, jordhylde, nælde eller andre generende ukrudtsplanter, brug Agrosar 360 SL før anlæggelse af en have eller et stykke jord.

Ved kraftig ukrudtsangreb kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Under behandlingen skal du forsøge at dække de grønne dele af ukrudtet grundigt for at forhindre midlet i at løbe af bladene.

For at undgå afdrift af sprøjtemiddel på tilstødende afgrøder, skal der anvendes afdækninger eller skærme, helst lavet af folie. Efter behandlingen skal den brugte folie foldes, så overfladen med sprøjtedråberne vender indad. Undgå at gå på det sprøjtede område i flere timer efter behandlingen på grund af risikoen for sprøjtemiddeloverførsel på fodtøj. Efter påføring af sprøjtemidlet må der ikke udføres jordbearbejdning i mindst en uge. Denne tid er nødvendig for at herbicidet kan trænge ind i de underjordiske dele af ukrudtet og fuldstændigt ødelægge det. Herefter kan jordbearbejdning, såning eller plantning begynde.

Tidligere dyrkningsbehandlinger kan reducere midlets effektivitet.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 2.

Interval mellem behandlinger: mindst 21 dage.

Anbefalet vandmængde: 2,0 - 3,0 l/100 m².

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

ANVENDELSE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER I AFGRØDER OG ANVENDELSER I SMÅ OMRÅDER

Brugeren er eneansvarlig for effektiviteten og fytotoksiciteten af et plantebeskyttelsesmiddel, der anvendes i mindre afgrøder.

Stikkelsbær, aronia, solbær, røde ribs, hvide ribs, pære, fersken, kirsebær, abrikos, blomme, surkirsebær.

Maksimal dosis til engangsbrug: 80,0 ml/100 m²

Anbefalet dosis til engangsbrug: 30,0 - 80,0 ml/100 m²

Anvendelsesperiode: Påfør produktet fra forår til efterår på grønt ukrudt under dets intensive vækst, i den dosis, der er nødvendig for at ødelægge de eksisterende ukrudtsarter.

Til bekæmpelse af flerårigt ukrudt (f.eks. padderokke) kan midlet anvendes i en blanding med herbicidet Chwastox Extra 300 SL i en dosis på:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m²

Anbefalet vandmængde: 2,0 - 3,0 l/100 m²

Anbefalet sprøjtning: mellemstore dråber.

Maksimalt antal behandlinger i vækstsæsonen: 1.

KOMMENTARER:

1. Fjern mekanisk alle rodskud fra træer og buske før sprøjtning.
frugtagtig.
2. Sprøjt sikkert, helst med sprøjter med afdækning eller net, så dråber af sprøjtevæsken ikke kommer på blade, skud og ikke-træagtig bark af træer og buske på grund af risikoen for at beskadige planterne.

FORHOLDSREGLER, TILBAGETRÆKNINGSTIDER OG SÆRLIGE BETINGELSER ANVENDELSER

Periode fra sidste anvendelse af midlet til dagen for høst af afgrøden (tilbageholdelsesperiode):

Æble, stikkelsbær, aronia, solbær, røde ribs, hvide ribs, pære, fersken, kirsebær, abrikos, blomme, surkirsebær – 7 dage

1. Strategi for immunitetsstyring

For at minimere risikoen for forekomst og udvikling af ukrudtsresistens over for herbicider, i overensstemmelse med god landbrugspraksis:

- følg nøje instruktionerne på plantebeskyttelsesmidlets etiket –
Brug produktet i den anbefalede dosis på det anbefalede tidspunkt for at sikre optimal ukrudtsbekæmpelse,
- tilpasse valget af herbicid og beslutningen om at udføre behandlingen til det eksisterende (eller potentielle) ukrudtsangreb, under hensyntagen til den dominerende art og tærsklerne for skadelighed,
- anvende rotation af herbicider (aktive stoffer) med forskellige virkningsmekanismer,
- bruge en blanding af herbicider (aktive stoffer) med forskellige virkningsmekanismer,
- brug herbicider i rotation og/eller blandinger, der påvirker flere ukrudtsprocesser (med forskellige virkningsmekanismer),
- tilpasse dyrkningsprocedurerne til de herskende forhold på marken, især typen og intensiteten ukrudt,
- brug forskellige ukrudtsbekæmpelsesmetoder, herunder sædskifte osv.
- brug certificeret såsæd,
- rengøre landbrugsmaskiner for at forhindre, at ukrudtsformeringsmateriale overføres til andre stillinger,
- informere tilladelsesindehaveren om utilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse,
- for yderligere information, kontakt venligst din rådgiver eller indehaver tilladelsen eller repræsentant for tilladelsesindehaveren.

2. Brug ikke produktet:

- før ukrudtet kommer frem,
- for syge, udklækkede og beskadigede planter,
- i perioder med kraftig tørke eller kommende regn, – når nattemperaturen er lavere end 5°C,
- i blæsende vejr, hvilket kan få væsken til at drive ned på naboplanter dyrket.

3. Undgå at bruge produktet: _____

- afdrift af arbejdsvæsken på tilstødende afgrødeplantager,

– overlapning af arbejdsvæsken ved samlingerne mellem behandlingsstriberne og forageren.

PLANTESUCCESSION

Alle afgrøder kan dyrkes på en mark, hvor Agrosar 360 SL er blevet påført. Dyrkningsbehandlinger kan påbegyndes, når ukrudtet viser symptomer på stoffets virkning (gulning og visnen), men tidligst 5-7 dage efter påføring.

Følg anbefalingerne for plantesuccession for herbicider, der anvendes sammen med Agrosar 360 SL.

FORBEREDELSE AF BRUGBAR VÆSKE

Forbered arbejdsvæsken umiddelbart før brug.

For at undgå utilsigtet kontaminering med andre plantebeskyttelsesmidler, skal sprøjten vaskes med en 10% opløsning af bagepulver eller aktivt kul, og derefter omhyggeligt bestemmes den nødvendige mængde og produktmængde. Følg sprøjteproducentens anvisninger, når du fylder sprøjten. Hvis der ikke er nogen anvisninger tilgængelige, tilsættes den afmålte mængde produkt til sprøjtetanken, der er delvist fyldt med vand.

Skyl de tomme beholdere tre gange med vand, og hæld skyllemidlet i sprøjtes væsketank. Fyld op med vand til den nødvendige mængde, og bland grundigt. Efter at have hældt midlet i sprøjtes tank, blandes væsken mekanisk.

Rør jævnligt i væsken i tanken under sprøjtning.

Ved afbrydelser i sprøjtningen skal arbejdsvæsken blandes grundigt i sprøjtetanken, inden arbejdet genoptages.

Når midlet anvendes i blandinger med andre midler, skal anbefalingerne for tilberedning af arbejdsvæsken til disse midler nøje følges.

HÅNTERING AF BRUGBARE VÆSKERESTER OG RENGØRING AF UDSKYR

Resterende væske og vand, der bruges til at rengøre udstyret, skal være:

- hvis muligt, efter fortynding, anvendes på den overflade, hvorpå behandlingen blev udført, eller
- bortskaffes ved hjælp af tekniske løsninger, der sikrer biologisk nedbrydning af de aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler, eller
- bortskaffes på anden måde i overensstemmelse med affaldsreglerne.

Vask udstyret grundigt efter arbejdet.

FORHOLDSREGLER FOR PERSONER, DER BRUGER AGENTEN, MEDARBEJDERE OG TILBAGESTE

Før produktet tages i brug, skal alle interesserede parter, der kan blive udsat for sprøjteeffekten, og som har anmodet om sådanne oplysninger, informeres.

Spis, drik eller ryg ikke, mens du bruger produktet.

Brug beskyttelseshandsker (nitril) og sikkerhedsbriller.

Undgå at indånde spray.

Perioden fra påføring af midlet til den dag, hvor mennesker og dyr må betræde det område, hvor midlet er blevet påført (forebyggelsesperiode):

Gå ikke ind i planten, før væsken er helt tørret på overfladen.

MILJØMÆSSIGE FORHOLDSREGLER

Forurens ikke vand med plantebeskyttelsesmidlet eller dets emballage. Vask ikke udstyr i nærheden af overfladevand. Undgå vandforurening gennem dræningsgrøfter fra landbrug og veje.

Undgå utilsigtet udledning til miljøet.

Påfør produktet på et område på op til 500 m².

Det anbefales at bruge produktet uden for perioder med biaktivitet.

Lad ikke sprøjtevæsken drive uden for påføringsområdet. Sprøjt kun med dyser til mellemstore eller grove dråber.

BETINGELSER FOR OPBEVARING OG SIKKER BORTSKAFFELSE AF BESKYTTELSESMIDLET PLANTER OG EMBALLAGE

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar plantebeskyttelsesmidlet:

• i originalemballagen, • på en måde,

der forhindrer kontakt med fødevarer, drikkevarer eller foder, miljøforurening og adgang for tredjeparter,

• ved en temperatur på 0 °C - 30 °C.

Beskyt mod sollys og fugt

Det er forbudt at bruge tomme emballager til plantebeskyttelsesmidler til andre formål.

Ethvert ubrugt produkt skal afleveres til en enhed, der er godkendt til at indsamle farligt affald.

Det anbefales at returnere tomme beholdere til en forhandler af plantebeskyttelsesmidler eller behandle dem som husholdningsaffald. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal bortskaffe beholderne, skal du kontakte din forhandler af plantebeskyttelsesmidler.

FØRSTEHJÆLP

Modgift: ingen, behandl symptomatisk.

Hvis du har brug for at konsultere en læge, skal du vise emballagen eller etiketten.

Ved hudkontakt: Vask med rigeligt vand.

Hvis der opstår hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Gyldighedsperiode - 2 år.

Produktionsdato -

Nettoindhold -

Batchnummer -