

Titolare del permesso:

CIECH Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com

Soggetto responsabile del confezionamento finale e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario:

.....

AGROSAR 360 SL

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti non professionisti.

Contenuto di sostanza attiva:

glifosato (un composto del gruppo degli amminofosfonati) - 360 g/l (30,9%).

Autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R-35/2014 del 13 marzo 2014.

rinnovato con decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. 474/2020d del 23 luglio 2020

	
Attenzione	
H317 H412	Può causare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Pagina 261	Evitare di inalare lo spray.
Pagina 272	Non portare indumenti protettivi contaminati fuori dal luogo di lavoro.
Pagina 280	Indossare guanti protettivi
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua	
P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico. chiedere consiglio/consultare un medico.	
P362 + P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.	

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

ERBICIDA non selettivo ad azione sistemica, per applicazione fogliare, disponibile sotto forma di concentrato per la preparazione di una soluzione acquosa (SL).

Secondo la classificazione HRAC, il principio attivo glifosato rientra nel gruppo G.

AZIONE SULLE ERBACCE

L'agente viene assorbito attraverso le parti verdi della pianta (foglie, germogli verdi e corteccia non legnosa), quindi si diffonde in tutta la pianta e raggiunge le sue parti sotterranee (radici, stoloni, ecc.), causandone la morte. I primi sintomi dell'azione dell'agente (ingiallimento e avvizzimento) diventano visibili 7-10 giorni dopo il trattamento. La morte completa della pianta avviene dopo 2-3 settimane. Temperature elevate, umidità e forte luce solare accelerano l'azione dell'agente.

Dose dell'agente	erbacce sensibili
30,0 ml/100 m ² di	gramigna, stellaria media, piede d'oca bianco, papavero dei campi, biancospino inodore, farro canadese, convolvolo (sin. convolvolo), erba secolare, borsa del pastore, poa annua.
40,0 ml/100 m ² di	gramigna, viola del pensiero, stellaria media, piede d'oca bianco, papavero dei campi, biancospino inodore, gramigna, farro canadese, erba sferzante, convolvolo (sin. convolvolo), senecione, borsa del pastore, poa annua.
50,0 ml/100 m ² p	piantaggine comune, piantaggine comune, artemisia comune, fiordaliso, gramigna, viola dei campi, senape campestre, stellaria comune, ago comune, ortica viola, piede d'oca bianco, trifoglio bianco, dactyloidea, papavero campestre, biancospino inodore, verga d'oro canadese, avena selvatica, gramigna, gramigna, ombrella verde, farro canadese, sferza, convolvolo (sin. convolvolo), ceratofillo comune, camomilla comune, senecione comune, senecione comune, amaranto ruvido, romice ottusa, acetosella comune, romice gialla, borsa del pastore comune, gramigna dei campi, poa annua, coda di volpe verde, vecchia piede d'uccello, vecchia a foglie strette.
75,0 ml/100 m ² p	piantaggine comune, piantaggine comune, artemisia comune, fiordaliso, gramigna, viola dei campi, senape campestre, stellaria comune, ago comune, ortica viola, piede d'oca bianco, trifoglio bianco, dactyloide, papavero campestre, biancospino inodore, asclepiade dei campi, tarassaco, verga d'oro canadese, avena selvatica, gramigna comune, gramigna, ombrella verde, veronica trifogliata, farro canadese, sanguinella comune, caglio comune, poligono comune, convolvolo (sin. convolvolo), ceratofillo comune, camomilla comune, senecione comune, senecione comune, amaranto ruvido, acetosella dei campi, acetosella ottusa, acetosella comune, acetosella gialla, borsa del pastore comune, sambuco dei campi, poa annua, coda di volpe verde, vecchia selvatica, vecchia a foglie strette.
75,0 ml/100m ² usato due volte	Piantaggine lanceolata, piantaggine comune, geranio piccolo, geranio rosso, artemisia comune, fiordaliso, gramigna, celidonia maggiore, senape campestre, stellaria comune, ago comune, ranuncolo strisciante, ortica viola, piede d'oca bianco, trifoglio campestre, millefoglio comune, dactyloidea, biancospino inodore, asclepiade campestre, tarassaco, verga d'oro canadese, cardo campestre, avena selvatica, gramigna comune, gramigna, ombrella verde, sambuco terricolo, ortica comune, convolvolo campestre, veronica persiana, veronica trifogliata, farro canadese, sferzante, poligono comune, ceratofillo comune, camomilla comune, artemisia, amaranto ruvido, acetosa campestre, acetosa comune, acetosa gialla, borsa del pastore comune, poa annua, coda di volpe verde, vecchia comune, vecchia a foglie strette.
80,0 ml/100 m ² p	piantaggine lanceolata, piantaggine comune, geranio piccolo, artemisia comune, fiordaliso, gramigna, viola dei campi, senape campestre, stellaria comune, ago comune, ortica viola, piede d'oca bianco, trifoglio bianco, dactyloide, papavero campestre, biancospino inodore, asclepiade dei campi, tarassaco, verga d'oro canadese, avena selvatica, gramigna comune, gramigna, ombrella verde, veronica trifogliata, caglio canadese, sferza, poligono comune, convolvolo (sin. convolvolo), ceratofillo comune, camomilla comune, senecione comune, senecione comune, amaranto ruvido, ossalide gialla, acetosella dei campi, acetosella a foglie ottuse, acetosella comune, borsa del pastore comune, poa annua, epilobio ghiandolare, coda di volpe verde, vecchia comune, vecchia a foglie strette.

ATTENZIONE

Agrosar 360 SL applicato due volte alla dose di 75,0 ml/100 m² previene la comparsa delle seguenti specie infestanti all'inizio della successiva stagione di crescita: piantaggine lanceolata, piantaggine comune, artemisia comune, ranuncolo strisciante, trifoglio bianco, achillea comune,

Verga d'oro canadese, avena selvatica, sambuco comune, ortica comune, acetosa comune, poa annua, coda di volpe verde, veccia veccia, veccia a foglie strette.

Dose dell'agente	Erbacce moderatamente sensibili
30,0 ml/100 m ²	piccolo geranio, ortica viola.
50,0 ml/100 m ²	di Asclepiade dei campi, Ortica comune, Veronica persiana, Poligono del Canada, Acetosella dei campi, Epilobio
75,0 ml/100 m ²	di millefoglio comune, cardo dei campi, ortica comune, veronica persiana.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 mq + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 mq	erbacce sensibili
	geranio piccolo, gramigna comune, erba stellaria, ortica rossa, piede d'oca bianco, tarassaco, gramigna, farro canadese, poligono comune, senecione comune, equiseti dei campi, borsa del pastore comune, poa annua, epilobio ghiandolare.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m ² + Chwastox Professional 750 SL 10,0 ml/100 m ²	erbacce sensibili
	geranio piccolo, gramigna, viola del pensiero, senape campestre, erba stella comune, ortica rossa, piede d'oca bianco, tarassaco comune, biancospino inodore, gramigna, veronica persiana, veronica dei campi, poligono comune, convolvolo (sin. convolvolo), crescione comune, bromo tenero, equiseti dei campi, senecione comune, amaranto ruvido, borsa del pastore comune, poa annua, epilobio ghiandolare, gallinella a piccoli fiori.

RICHIESTA DELL'AGENTE

L'agente è destinato all'uso con uno spruzzatore manuale (incluso uno spruzzatore a zaino).

Attenzione:

Non utilizzare il prodotto fitosanitario in parchi e giardini pubblici, aree sportive e ricreative, scuole, asili nido, vivai e strutture sanitarie.

Melo

Dose massima per uso singolo: 80,0 ml/100 m²

Dose raccomandata per uso singolo: 30,0 - 80,0 ml/100 m²

Periodo di applicazione: applicare il prodotto dalla primavera all'autunno sulle infestanti verdi durante la loro intensa crescita, utilizzando la dose necessaria a distruggere le specie infestanti presenti.

Per distruggere le erbe infestanti perenni (ad esempio l'equiseto), il prodotto può essere utilizzato in miscela con l'erbicida Chwastox Extra 300 SL o Chwastox Professional 750 SL nelle seguenti dosi:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m²

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Professional 750 SL 10,0 ml/100 m²

Quantità d'acqua consigliata: 2,0 - 3,0 l/100 m²

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1 (monouso o in miscela).

COMMENTI:

1. Prima di spruzzare, rimuovere meccanicamente tutti i polloni radicali dai meli.
2. Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchi o schermi, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa degli alberi, con il rischio di danneggiare le piante.

Giardini, appezzamenti, aree intorno alla casa, lungo le fondamenta dell'edificio, recinzioni e altre recinzioni, intorno ad alberi e aiuole, sotto siepi e arbusti, tra lastre e blocchi di pavimentazione, nella zona del cortile e delle strade di accesso.

Dose massima per uso singolo: 75,0 ml/100 m²

Dose raccomandata per un singolo utilizzo: 50,0 – 75,0 ml/100 m²

Periodo di applicazione: utilizzare il prodotto dalla primavera all'autunno, durante i periodi caldi che favoriscono la crescita delle erbacce.

ATTENZIONE:

Per controllare la gramigna, l'agrifoglio, l'ortica comune o altre erbacce fastidiose, utilizzare Agrosar 360 SL prima di creare un giardino o un appezzamento di terreno.

In caso di forte infestazione da erbe infestanti, potrebbe essere necessario ripetere il trattamento.

Durante il trattamento, cercare di coprire accuratamente le parti verdi delle erbacce, evitando che il prodotto coli via dalle foglie.

Per evitare la dispersione del prodotto sulle colture adiacenti, utilizzare coperture o schermi, preferibilmente in alluminio. Dopo il trattamento, ripiegare l'alluminio usato in modo che la superficie contenente le goccioline sia rivolta verso l'interno. Evitare di camminare sulla zona trattata per diverse ore dopo il trattamento, a causa del rischio di trasferimento del prodotto sulle calzature. Dopo l'applicazione del prodotto, non eseguire alcuna lavorazione del terreno per almeno una settimana. Questo intervallo di tempo è necessario affinché l'erbicida penetri negli strati sotterranei delle infestanti e le distrugga completamente. Trascorso questo periodo, si può iniziare la lavorazione del terreno, la semina o la piantumazione.

I trattamenti di coltivazione precedenti possono ridurre l'efficacia dell'agente.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Intervallo tra i trattamenti: almeno 21 giorni.

Quantità d'acqua consigliata: 2,0 - 3,0 l/100 m².

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

APPLICAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE COLTURE E APPLICAZIONI SU PICCOLE AREE

L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'efficacia e della fitotossicità di un prodotto fitosanitario utilizzato in colture minori.

Uva spina, aronia, ribes nero, ribes rosso, ribes bianco, pera, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, amarena.

Dose massima per uso singolo: 80,0 ml/100 m²

Dose raccomandata per uso singolo: 30,0 - 80,0 ml/100 m² .

Periodo di applicazione: applicare il prodotto dalla primavera all'autunno sulle infestanti verdi durante la loro intensa crescita, utilizzando la dose necessaria a distruggere le specie infestanti presenti.

per la distruzione delle erbe infestanti perenni (ad esempio l'equiseto), l'agente può essere utilizzato in miscela con l'erbicida Chwastox Extra 300 SL alla dose di:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m²

Quantità d'acqua consigliata: 2,0 - 3,0 l/100 m².

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

COMMENTI:

1. Prima di spruzzare, rimuovere meccanicamente tutti i polloni radicali dagli alberi e dagli arbusti fruttati.
2. Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchi o schermi, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa di alberi e arbusti, con il rischio di danneggiare le piante.

PRECAUZIONI, PERIODI DI SOSPENSIONE E CONDIZIONI SPECIALI APPLICAZIONI

Periodo compreso tra l'ultima applicazione dell'agente e il giorno della raccolta della coltura (periodo di sospensione):

Mela, uva spina, aronia, ribes nero, ribes rosso, ribes bianco, pera, pesca, ciliegia, albicocca, prugna, amarena – 7 giorni

1. Strategia di gestione dell'immunità

Per ridurre al minimo il rischio di comparsa e sviluppo di resistenza delle erbe infestanti agli erbicidi, in conformità con le Buone Pratiche Agricole:

- seguire scrupolosamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario – utilizzare il prodotto alla dose consigliata, al momento consigliato per garantire un controllo ottimale delle erbe infestanti,
- adattare la scelta dell'erbicida e la decisione di effettuare il trattamento all'infestazione di erbe infestanti esistente (o potenziale), tenendo conto delle specie dominanti e delle soglie di nocività,
- utilizzare la rotazione di erbicidi (sostanze attive) con diversi meccanismi d'azione,
- utilizzare una miscela di erbicidi (sostanze attive) con diversi meccanismi d'azione,
- utilizzare erbicidi in rotazione e/o miscele che influenzano diversi processi vitali delle erbe infestanti (con diversi meccanismi d'azione),
- adattare le procedure culturali alle condizioni prevalenti nel campo, in particolare al tipo e all'intensità erbacce,
- utilizzare vari metodi di controllo delle erbacce, tra cui la rotazione delle colture, ecc.,
- utilizzare sementi certificate,
- pulire i macchinari agricoli per evitare che il materiale di propagazione delle erbacce venga trasferito ad altre posizioni,
- informare il titolare del permesso in caso di controllo insoddisfacente delle erbacce,
- per informazioni dettagliate, contattare il proprio consulente o titolare permesso o rappresentante del titolare del permesso.

2. Non utilizzare il prodotto:

- prima che emergano le erbacce,
- per piante malate, schiuse e danneggiate,
- in periodi di eccessiva siccità o di imminenti piogge, – quando la temperatura notturna è inferiore a 5°C,
- in caso di tempo ventoso, che potrebbe far sì che il liquido si riversi sulle piante vicine coltivate.

3. Durante l'utilizzo del prodotto, non consentire:

- deriva del liquido di lavoro sulle piantagioni di colture vicine,

– sovrapposizione del liquido di lavoro in corrispondenza delle giunzioni delle fasce di trattamento e delle capezzagne.

SUCCESSIONE DELLE PIANTE

Tutte le colture possono essere coltivate in un campo su cui è stato applicato Agrosar 360 SL. I trattamenti colturali possono iniziare quando le infestanti mostrano i sintomi degli effetti del prodotto (ingiallimento e avvizzimento), ma non prima di 5-7 giorni dall'applicazione.

Seguire le raccomandazioni sulla successione delle piante per gli erbicidi utilizzati in combinazione con Agrosar 360 SL.

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO UTILIZZABILE

Preparare il liquido di lavoro immediatamente prima dell'uso.

Prima di preparare la soluzione di lavoro, per evitare contaminazioni accidentali con altri prodotti fitosanitari, lavare l'irroratrice con una soluzione al 10% di bicarbonato di sodio o carbone attivo, quindi determinare attentamente il volume e la quantità di prodotto necessari. Per il riempimento dell'irroratrice, seguire le istruzioni del produttore. In assenza di istruzioni, aggiungere la quantità di prodotto misurata al serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito con acqua.

Sciacquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e versare il liquido di risciacquo nel serbatoio del liquido dell'irroratrice. Rabboccare con acqua fino alla quantità necessaria e mescolare accuratamente. Dopo aver versato il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mescolare meccanicamente il liquido.

Durante la spruzzatura, mescolare periodicamente il liquido nel serbatoio.

In caso di interruzioni della spruzzatura, miscelare accuratamente il liquido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

Quando si utilizza l'agente in miscele con altri agenti, seguire scrupolosamente le raccomandazioni per la preparazione del liquido di lavoro di questi agenti.

GESTIONE DEI RESIDUI LIQUIDI UTILIZZABILI E PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

Il liquido e l'acqua rimanenti utilizzati per pulire l'attrezzatura devono essere:

- se possibile, dopo la diluizione, utilizzare sulla superficie su cui è stato effettuato il trattamento, oppure
- smaltiti utilizzando soluzioni tecniche che garantiscano la degradazione biologica delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, oppure
- smaltire in altro modo, nel rispetto delle normative sui rifiuti.

Lavare accuratamente l'attrezzatura dopo il lavoro.

PRECAUZIONI PER LE PERSONE CHE UTILIZZANO L'AGENTE, I DIPENDENTI E SPETTATORI

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario informare tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva dello spray e che hanno richiesto tali informazioni.

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Indossare guanti protettivi (nitrile) e occhiali di sicurezza.

Evitare di inalare lo spray.

Il periodo che intercorre tra l'applicazione dell'agente e il giorno in cui persone e animali possono entrare nell'area in cui l'agente è stato applicato (periodo di prevenzione):

Non entrare finché il liquido non si è completamente asciugato sulla superficie della pianta.

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non contaminare l'acqua con il prodotto fitosanitario o il suo imballaggio. Non lavare le attrezzature in prossimità di acque superficiali. Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i canali di scolo di aziende agricole e strade.

Evitare il rilascio involontario nell'ambiente.

Applicare il prodotto su una superficie fino a 500 m².

Si consiglia di utilizzare il prodotto al di fuori dei periodi di attività delle api.

Non lasciare che il liquido spruzzato fuoriesca dall'area di applicazione. Spruzzare solo utilizzando ugelli a goccia media o grossa.

CONDIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO SICURO DELL'AGENTE PROTETTIVO IMPIANTI E IMBALLAGGI

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto fitosanitario:

• nella confezione originale, • in modo

da impedire il contatto con alimenti, bevande o mangimi, la contaminazione ambientale e l'accesso da parte di terzi,

• a una temperatura compresa tra 0 °C e 30 °C.

Proteggere dalla luce solare e dall'umidità

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Si consiglia di restituire i contenitori vuoti a un rivenditore di prodotti fitosanitari o di trattarli come rifiuti urbani. In caso di domande su come smaltire i contenitori, consultare il rivenditore di prodotti fitosanitari.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, trattamento sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua.

In caso di irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico.

Periodo di validità: 2 anni.

Data di produzione -

Contenuto netto -

Numero di lotto -