

Vergunninghouder:

CIECH Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com

Verantwoordelijke instantie voor de uiteindelijke verpakking en etikettering van het gewasbeschermingsmiddel:

.....

AGROSAR 360 SL

Het product is bedoeld voor gebruik door niet-professionele gebruikers.

Actieve stofgehalte:

glyfosaat (een verbinding uit de aminofosfonaatgroep) - 360 g/l (30,9%).

Toestemming van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-35/2014 van 13 maart 2014.

vernieuwd door het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. 474/2020d van 23 juli 2020

	
Aandacht	
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	
P261	Inademing van spray vermijden.
P272	Neem verontreinigde beschermende kleding niet mee buiten de werkplek.
P280	Draag beschermende handschoenen
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen	
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: medische hulp inroepen.	Raadpleeg een arts/raadpleeg een arts.
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.	

BESCHRIJVING VAN DE WERKING

Niet-selectief HERBICIDE met systemische werking, voor toepassing op het blad, verkrijgbaar in de vorm van een concentraat voor het bereiden van een waterige oplossing (SL).

Volgens de HRAC-classificatie behoort de werkzame stof glyfosaat tot groep G.

ACTIE TEGEN ONKRUID

Het middel wordt opgenomen via de groene delen van de plant (bladeren, groene scheuten en niet-houtachtige schors), verspreidt zich vervolgens door de hele plant en bereikt de ondergrondse delen (wortels, uitlopers, enz.), waar ze afsterven. De eerste symptomen van de werking van het middel (vergeling en verwelking) worden 7-10 dagen na behandeling zichtbaar. Volledige plantsterfte treedt op na 2-3 weken. Hoge temperaturen, vochtigheid en fel zonlicht versnellen de werking van het middel.

Dosis van het middel	Gevoelige onkruiden
30,0 ml/100 m ²	gierstgras, vogelmuur, witte ganzenvoet, klapproos, geurloze kamille, Canadese emmer, winde (syn. winde), oerbos, herderstasje, eenjarig straatgras.
40,0 ml/100 m ²	gierstgras, akkerviooltje, vogelmuur, witte ganzenvoet, akkerpapaver, geurloze kamille, kweekgras, Canadese emmer, kleeftkruid, winde (syn. winde), jacobskruiskruid, herderstasje, straatgras.
50,0 ml/100 m ²	smalle weegbree, gewone weegbree, bijvoet, korenbloem, gierstgras, akkerviooltje, akkersla, vogelmuur, gewone naaldruid, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, witte klaver, kropaar, akkerpapaver, geurloze kamille, Canadese guldenroede, wilde haver, bloedgras, kweekgras, groen scherm, Canadese emmer, kleeftkruid, winde (syn. winde), gewone hoornblad, echte kamille, jacobskruiskruid, gewone jacobskruiskruid, ruwe amarant, stompe zuring, veldzuring, gele zuring, herderstasje, akkerbeemdgras, straatgras, groene vossenstaart, wikke, vogelrol, smalbladige wikke.
75,0 ml/100 m ²	smalle weegbree, gewone weegbree, bijvoet, korenbloem, gierstgras, akkerviooltje, akkersla, vogelmuur, gewone naaldruid, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, witte klaver, kropaar, akkerpapaver, geurloze kamille, akkermelkkruid, paardenbloem, Canadese guldenroede, wilde haver, gewoon krabgras, kweekgras, groen scherm, driebladige ereprijs, Canadese emmer, kleeftkruid, gewone walstro, duizendknoop, winde (syn. winde), gewone hoornblad, echte kamille, jacobskruiskruid, jacobskruiskruid, ruwe amarant, akkerzuring, stompe veldzuring, gewone veldzuring, gele klaverzuring, herderstasje, akkerzadel, eenjarig straatgras, groene vossenstaart, wilde wikke, smalbladige wikke.
75,0 ml/100m ² gebruikt tweemaal	Smalle weegbree, gewone weegbree, kleine geranium, rode geranium, bijvoet, korenbloem, gierstgras, stinkende gouwe, mosterd, vogelmuur, gewone naaldruid, kruipboterbloem, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, akkerklaver, duizendblad, kropaar, geurloze kamille, akkermelkkruid, paardenbloem, Canadese guldenroede, akkerdistel, wilde haver, gewoon krabgras, kweekgras, groen scherm, zevenblad, gewone brandnetel, akkerwinde, Perzische ereprijs, driebladige ereprijs, Canadese emmer, kleeftkruid, duizendknoop, gewone hoornblad, echte kamille, salie, ruwe amarant, veldzuring, veldzuring, gewone veldzuring, gele veldzuring, herderstasje, akkerzaden, straatgras, groene vossenstaart, vogelwikke, smalbladige wikke.
80,0 ml/100 m ²	smalle weegbree, gewone weegbree, kleine geranium, bijvoet, korenbloem, gierstgras, akkerviooltje, akkerstruik, muur, gewone naaldruid, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, witte klaver, kropaar, klapproos, geurloze kamille, akkermelkkruid, paardenbloem, Canadese guldenroede, wilde haver, gewoon krabgras, kweekgras, groen scherm, driebladige ereprijs, Canadese walstro, kleeftkruid, duizendknoop, winde (syn. winde), gewone hoornblad, echte kamille, jacobskruiskruid, gewone jacobskruiskruid, ruwe amarant, gele klaverklaver, veldzuring, stompbladige veldzuring, gewone veldzuring, herderstasje, akkerzaden, straatgras, klierwilgenroosje, groene vossenstaart, vogelwikke, smalbladige wikke.

AANDACHT

Agrosar 360 SL wordt bij een dosering van 75,0 ml/100 m² tweemaal toegepast en voorkomt het ontstaan van de volgende onkruidsoorten aan het begin van het volgende groeiseizoen: smalle weegbree, gewone weegbree, bijvoet, kruipboterbloem, witte klaver, duizendblad,

Canadese guldenroede, wilde haver, zevenblad, brandnetel, veldzuring, straatgras, groene vossenstaart, vogelwikke, smalbladige wikke.

Dosis van het middel	Matig gevoelige onkruiden
30,0 ml/100m2 kleine	geranium, paarse dovenetel.
50,0 ml/100 m2 akker	melkdistel, brandnetel, ereprijs, duizendknoop, veldzuring, wilgenroosje
75,0 ml/100m2 gewone	duizendblad, akkerdistel, brandnetel, ereprijs.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2	Gevoelige onkruiden
	kleine geranium, gierstgras, gewone vogelmuur, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, paardenbloem, kweekgras, Canadese emmer, gewone duizendknoop, gewone jakobskruid, heermoes, herderstasje, eenjarig straatgras, klierwilgenroosje.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Professional 750 SL 10,0ml/ 100m2	Gevoelige onkruiden
	kleine geranium, gierstgras, akkerviooltje, akkermosterd, gewone vogelmuur, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, gewone paardenbloem, geurloze kamille, kweekgras, Perzische ereprijs, akkerereprijs, gewone duizendknoop, winde (syn. winde), tuinkers, zachte dravik, akkerpaardenstaart, jakobskruid, ruwe amarant, herderstasje, eenjarig straatgras, klierwilgenroosje, kleinbloemige galkruid.

TOEPASSING VAN DE AGENT

Het middel is bedoeld voor gebruik met een handverstuiver (inclusief een rugverstuiver).

Aandacht:

Gebruik het gewasbeschermingsmiddel niet in openbare parken en tuinen, sport- en recreatiegebieden, scholen, kinderdagverblijven, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

Appelboom

Maximale dosis voor eenmalig gebruik: 80,0 ml/100 m2

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 30,0 - 80,0 ml/100m2

Toepassingsperiode: pas het product van het voorjaar tot en met de herfst toe op groen onkruid tijdens de intensieve groei. Gebruik de juiste dosering om de bestaande onkruidsoorten te vernietigen.

Om overblijvende onkruiden (bijv. paardenstaart) te vernietigen, kan het middel worden gebruikt in een mengsel met het herbicide Chwastox Extra 300 SL of Chwastox Professional 750 SL in de volgende doseringen:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2
lub

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2 + Chwastox Professional 750 SL 10,0 ml/100 m2

Aanbevolen hoeveelheid water: 2,0 - 3,0 l/100 m2

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1 (eenmalig gebruik of in een mengsel).

OPMERKINGEN:

1. Verwijder voor het spuiten alle worteluitlopers van appelbomen mechanisch.
2. Spuit veilig, bij voorkeur met een spuitapparaat met afdekking of scherm, zodat druppels spuitvloeistof niet op de bladeren, scheuten en niet-houtachtige bast van bomen terechtkomen, omdat dit de planten zou kunnen beschadigen.

Tuinen, percelen, terreinen rondom het huis, langs de fundering van het gebouw, schuttingen en andere omheiningen, rond bomen en bloemperken, onder heggen en struiken, tussen stoeptegels en -blokken, in de buurt van het erf en toegangswegen.

Maximale dosis voor eenmalig gebruik: 75,0 ml/100 m²

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 50,0 – 75,0 ml/100 m²

Toepassingsperiode: Gebruik het product van de lente tot en met de herfst, tijdens warm weer waarin onkruidgroei bevorderd wordt.

AANDACHT:

Voor de bestrijding van kweekgras, zevenblad, brandnetel en andere lastige onkruiden kunt u Agrosar 360 SL gebruiken voordat u uw tuin of perceel aanlegt.

Bij een ernstige onkruidplaag kan het nodig zijn de behandeling te herhalen.

Probeer tijdens de behandeling de groene delen van het onkruid goed te bedekken, zodat het middel niet van de bladeren afloopt.

Om te voorkomen dat de spuitnevel op aangrenzende gewassen terechtkomt, gebruikt u afdek materiaal of schermen, bij voorkeur van folie. Vouw de gebruikte folie na de behandeling zo dat het oppervlak met de spuitdruppels zich aan de binnenkant bevindt. Loop gedurende enkele uren na de behandeling niet over het bespoten gebied vanwege de kans op overdracht van de spuitnevel op uw schoenen. Voer na het aanbrengen van de spray minstens een week geen grondbewerking uit. Deze tijd is nodig om het herbicide in de ondergrondse delen van het onkruid te laten doordringen en het volledig te vernietigen. Na deze tijd kunt u beginnen met het bewerken van de grond, zaaien of planten.

Eerdere teeltbehandelingen kunnen de effectiviteit van het middel verminderen.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 2.

Interval tussen de behandelingen: minimaal 21 dagen.

Aanbevolen hoeveelheid water: 2,0 - 3,0 l/100 m²

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

TOEPASSING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN GEWASSEN EN TOEPASSINGEN OP KLEINE GEBIEDEN

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de effectiviteit en fytotoxiciteit van een gewasbeschermingsmiddel dat in kleine teelten wordt gebruikt.

Kruisbes, aronia, zwarte bes, rode bes, witte bes, peer, perzik, kers, abrikoos, pruim, zure kers.

Maximale dosis voor eenmalig gebruik: 80,0 ml/100 m²

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 30,0 - 80,0 ml/100m²

Toepassingsperiode: breng het product van het voorjaar tot en met de herfst aan op groen onkruid tijdens de intensieve groei. Gebruik daarbij de dosering die nodig is om de bestaande onkruidsoorten te vernietigen.

Voor de bestrijding van overblijvende onkruiden (bijv. paardenstaart) kan het middel worden gebruikt in een mengsel met het herbicide Chwastox Extra 300 SL in een dosering van:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m²

Aanbevolen hoeveelheid water: 2,0 - 3,0 l/100 m²

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

OPMERKINGEN:

1. Verwijder voor het spuiten alle worteluitlopers van bomen en struiken mechanisch.
fruitig.
2. Spuit veilig, bij voorkeur met een spuitapparaat met afdekking of scherm, zodat druppels spuitvloeistof niet op de bladeren, scheuten en niet-houtachtige bast van bomen en struiken terechtkomen, omdat dit de planten zou kunnen beschadigen.

VOORZORGSMAATREGELEN, WACHTTIJDEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN TOEPASSINGEN

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst van het gewas (wachttijd):

Appel, kruisbes, aronia, zwarte bes, rode bes, witte bes, peer, perzik, kers, abrikoos, pruim, zure kers – 7 dagen

1. Strategie voor immuniteitsbeheer

Om het risico op het ontstaan en de ontwikkeling van onkruidresistentie tegen herbiciden te minimaliseren, in overeenstemming met Goede Landbouwpraktijken:

- volg strikt de instructies op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel –
Gebruik het product in de aanbevolen dosering en op het aanbevolen tijdstip om een optimale onkruidbestrijding te garanderen,
- de keuze van het herbicide en de beslissing om de behandeling uit te voeren, afstemmen op de bestaande (of potentiële) onkruidplaag, rekening houdend met de dominante soorten en de schadelijkheidsdrempels,
- gebruik rotatie van herbiciden (werkzame stoffen) met verschillende werkingsmechanismen,
- gebruik een mengsel van herbiciden (werkzame stoffen) met verschillende werkingsmechanismen,
- gebruik herbiciden in rotatie en/of mengsels die verschillende levensprocessen van onkruid beïnvloeden (met verschillende werkingsmechanismen),
- de teeltprocedures aanpassen aan de omstandigheden ter plaatse, met name aan het type en de intensiteit onkruid,
- gebruik maken van verschillende methoden voor onkruidbestrijding, waaronder vruchtwisseling, enz.,
- gebruik gecertificeerd zaad,
- landbouwmachines schoon te maken om te voorkomen dat onkruidvermeerderingsmateriaal wordt overgebracht naar andere posities,
- de vergunninghouder informeren over onvoldoende onkruidbestrijding,
- voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur of houder vergunninghouder of vertegenwoordiger van de vergunninghouder.

2. Gebruik het product niet:

- voordat het onkruid opkomt,
- voor zieke, uitgekomen en beschadigde planten,
- in periodes van extreme droogte of naderende regenval, – wanneer de nachttemperatuur lager is dan 5°C,
- bij winderig weer, waardoor de vloeistof op naburige planten kan drijven gecultiveerd.

3. Bij gebruik van het product mag u het volgende niet toestaan:

- het afdrijven van de werkvloeistof naar naburige landbouwplantages,

– overlapping van de werkvloeistof op de kruispunten van de behandelingsstroken en de kopakkers.

PLANTENOPVOLGING

Alle gewassen kunnen worden geteeld op een veld waar Agrosar 360 SL is toegepast. De behandeling kan beginnen wanneer het onkruid symptomen van de werking van het middel vertoont (vergeling en verwelking), maar niet eerder dan 5-7 dagen na toepassing.

Volg de aanbevelingen voor plantenopvolging voor herbiciden die in combinatie met Agrosar 360 SL worden gebruikt.

BEREIDING VAN BRUIKBARE VLOEISTOF

Maak de werkvloeistof vlak voor gebruik klaar.

Om onbedoelde besmetting met andere gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, wast u de spuit vóór het bereiden van de werkoplossing met een 10% oplossing van zuiveringszout of actieve kool en bepaalt u vervolgens zorgvuldig het benodigde volume en de benodigde hoeveelheid product. Volg bij het vullen van de spuit de instructies van de fabrikant. Als er geen instructies beschikbaar zijn, giet u de afgemeten hoeveelheid product in de gedeeltelijk met water gevulde spuittank.

Spoel de lege verpakkingen drie keer om met water en giet het spoelmiddel in de vloeistoftank van de spuit. Vul bij met water tot de gewenste hoeveelheid en meng grondig. Nadat u het middel in de tank van de spuit hebt gegoten, mengt u de vloeistof mechanisch.

Roer tijdens het spuiten de vloeistof in de tank regelmatig door.

Bij onderbrekingen in het spuitwerk dient u de werkvloeistof in de spuittank grondig te mengen alvorens u het werk hervat.

Wanneer u het middel in een mengsel met andere middelen gebruikt, dient u zich strikt te houden aan de aanbevelingen voor het bereiden van de werkvloeistof van deze middelen.

BEHANDELING VAN BRUIKBARE VLOEIBARE RESIDUEN EN REINIGING VAN APPARATUUR

De resterende vloeistof en het water die voor het reinigen van de apparatuur worden gebruikt, moeten:

- indien mogelijk, na verdunning, gebruiken op het oppervlak waarop de behandeling is uitgevoerd, of
- worden afgevoerd met behulp van technische oplossingen die de biologische afbraak van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen garanderen, of
- op een andere wijze afvoeren, overeenkomstig de afvalvoorschriften.

Maak de apparatuur na het werk grondig schoon.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PERSONEN DIE DE AGENT GEBRUIKEN, MEDEWERKERS EN OMSTANDERS

Vóór gebruik van het product moeten alle belanghebbenden die mogelijk in aanraking kunnen komen met de spuitnevel en die om dergelijke informatie hebben gevraagd, worden geïnformeerd.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Draag beschermende handschoenen (nitril) en een veiligheidsbril.

Inademing van spray vermijden.

De periode vanaf het aanbrengen van het middel tot de dag waarop mensen en dieren het gebied mogen betreden waar het middel is aangebracht (preventieperiode):

Ga pas naar binnen als de vloeistof volledig op het plantenoppervlak is opgedroogd.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of de verpakking. Was apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Voorkom waterverontreiniging via afwateringssloten van landbouwbedrijven en wegen.

Voorkom onbedoelde lozing in het milieu.

Breng het product aan op een oppervlakte tot 500 m²..

Het wordt aanbevolen het product te gebruiken buiten de periodes waarin bijen actief zijn.

Laat de spuitvloeistof niet buiten het te behandelen gebied drijven. Spuit alleen met een middelgrote of grove druppelsproeier.

VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMENDE MIDDEL PLANTEN EN VERPAKKINGEN

Buiten bereik van kinderen houden.

Bewaar het gewasbeschermingsmiddel:

• in de originele verpakking, • op een

manier die contact met voedsel, dranken of diervoeders, milieuverontreiniging en toegang door derden voorkomt,

• bij een temperatuur van 0 °C - 30 °C.

Beschermen tegen zonlicht en vocht

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Ongebruikte producten moeten worden overgedragen aan een instantie die bevoegd is om gevaarlijk afval te verzamelen.

Het is raadzaam om lege verpakkingen in te leveren bij een leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of ze te behandelen als gemeentelijk afval. Raadpleeg uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen als u vragen heeft over het afvoeren van de verpakkingen.

E.H.B.O

Tegengif: geen, symptomatisch behandelen.

Indien u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Bij contact met de huid: Spoel met veel water.

Indien huidirritatie of uitslag optreedt: Raadpleeg een arts/arts.

Geldigheidsduur - 2 jaar.

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -