

Tillståndsinnehavare:

CIECH Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122,
e-post: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com

Enhet som ansvarar för slutförpackning och märkning av växtskyddsmedlet:

.....

AGROSAR 360 SL

Produkten är avsedd för användning av icke-professionella användare.

Innehåll av aktiv substans:

glyfosat (en förening från aminofosfonatgruppen) - 360 g/l (30,9 %).

Tillstånd från jordbruks- och landsbygdsutvecklingsministeriet nr R-35/2014 av den 13 mars 2014.

förnyad genom beslut nr 474/2020d av ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling av den 23 juli 2020

	
Uppmärksamhet	
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadligt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter.
EUH401	För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.
P261	Undvik att inandas spray.
P272	Ta inte med dig förorenade skyddskläder utanför arbetsplatsen.
P280	Använd skyddshandskar
P302 + P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
P333 + P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. sök råd/uppsök läkare.
P362 + P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem före återanvändning.

BESKRIVNING AV VERKSAMHET

Icke-selektivt herbicidmedel med systemisk verkan, för bladbeläggning, tillgängligt i form av ett koncentrat för beredning av en vattenlösning (SL).

Enligt HRAC-klassificeringen klassificeras det aktiva ämnet glyfosat som grupp G.

ÅTGÄRDER MOT OGRÄS

Medlet absorberas genom växtens gröna delar (blad, gröna skott och icke-vedartad bark), färdas sedan genom växten och når dess underjordiska delar (rötter, utlöpare etc.), vilket får dem att dö. De första symtomen på medlets verkan (gulning och vissnande) blir synliga 7–10 dagar efter behandlingen. Fullständig växtdöd inträffar efter 2–3 veckor. Hög temperatur, luftfuktighet och starkt solljus påskyndar medlets verkan.

Dos av medlet	Känsliga ogräs
30,0 ml/100 m ²	stallgräs, våtmark, vit gåsfot, åkervallmo, baldersbrå, kanadensisk emmer, åkervinda, gammelväxt, herdeväska, ettårigt ängsgröe.
40,0 ml/100 m ²	stallgräs, åkerpensé, våtmark, vit gåsfot, åkervallmo, baldersbrå, kvikgräs, kanadensisk emmer, klyvhake, åkervinda, korsört, herdeväska, ettårig ängsgröe.
50,0 ml/100 m ²	groblad, vanlig groblad, gråbo, blåklint, stallgräs, åkerviol, åkersenap, vanlig våtmark, vanlig nålört, purpurfärgad nässla, vit gåsfot, vitklöver, hundfågel, åkervallmo, doftlös baldersbrå, kanadensisk gullris, vildhavre, blodgräs, kvik, grön blomklase, kanadensisk emmer, klyvhake, åkervinda, hornört, vanlig kamomill, vanlig korsört, vanlig korsört, grov amarant, trubbslända, vanlig syra, gulslända, vanlig herdeväska, åkerängs, ettårig ängsgröe, grön räsvans, vicker fågelfot, smalbladig vicker.
75,0 ml/100 m ²	groblad, vanlig groblad, gråbo, blåklint, stallgräs, åkerviol, åkersenap, vanlig våtmark, vanlig nålört, purpurfärgad nässla, vit gåsfot, vitklöver, hundfågel, åkervallmo, doftlös baldersbrå, åkermilkweed, maskros, kanadensisk gullris, vildhavre, vanlig nässelfeber, kvist, grön blomklase, trebladig ärena, kanadensisk emmer, köttyxa, vanlig sänghalm, vanlig knottväv, åkervinda, vanlig hornört, vanlig kamomill, vanlig korsört, vanlig korsört, grov amarant, åkersyra, trubbig syra, vanlig syra, gul skogssyra, vanlig herdeväska, åkerängsört, ettårig ängssvans, vildvicker, smalbladig vicker.
75,0 ml/100 m ² begagnad dubbelt	Ribwort-groblad, vanlig groblad, liten pelargon, röd pelargon, vanlig gråbo, blåklint, stallgräs, svalört, åkersenap, vanlig våtmark, vanlig nålört, krypande smörblomma, purpurfärgad nässla, vit gåsfot, åkerklöver, vanlig rölleka, hundfötter, doftlös balsam, åkermilkweed, maskros, kanadensisk gullris, åkertistel, vildhavre, vanlig nässla, kvist, grön blomklase, jordfläder, nässlor, åkeråna, persisk ärebron, trebladig ärebron, kanadensisk emmer, klyvhake, vanlig knottört, vanlig hornört, vanlig kamomill, sagebryst, grov amarant, syrsyra, åkersyra, vanlig syrsyra, gul syrsyra, vanlig herdeväska, åkerpåse, ettårig ängsgröe, grön räsvans, fågelvicker, smalbladig vicker.
80,0 ml/100 m ²	groblad, vanlig groblad, liten pelargon, gråbo, blåklint, stallgräs, åkerviol, åkersenap, vanlig våtmark, vanlig nålört, purpurfärgad nässla, vit gåsfot, vitklöver, hundfågel, åkervallmo, doftlös balsam, åkermilkweed, maskros, kanadensisk gullris, vildhavre, vanlig nässelfeber, kvist, grön blomklase, trebladig ärena, kanadensisk snår, köttyxa, vanlig knottört, åkervinda, hornört, vanlig kamomill, vanlig korsört, vanlig korsört, grov amarant, gul oxalis, åkersyra, trubbig syrsyra, vanlig syrsyra, herdeväska, åkerängsört, ettårig ängsgröe, körtelört, grön räsvans, fågelvicker, smalbladig vicker.

UPPMÄRKSAMHET

Agrosar 360 SL applicerat två gånger med en dos av 75,0 ml/100 m² förhindrar förekomsten av följande ogräsarter i början av nästa växtsäsong: ryggsäcksbanan, vanlig banan, gråbo, krypande smörblomma, vitklöver, vanlig rölleka,

Kanadisk gullris, vildhavre, mald fläder, nässla, syrläktet, ettårig ängsgröe, grön räsvans, fågelvicker, smalbladig vicker.

Dos av medlet	Måttligt känsliga ogräs
30,0 ml/100m ² liten pelargon, lila dödnässla.	
50,0 ml/100 m ² åkermilkweed, nässla, persisk ärepris, knott, åkersyra, pilört	
75,0 ml/100m ² vanlig röleka, åkertistel, nässla, persisk ärepris.	

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m ² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m ²	Känsliga ogräs
	liten pelargon, stallgräs, vanlig våtmark, purpurfärgad nässla, vit gåsfot, maskros, kvist, kanadensisk emmer, vanlig knott, vanlig ragwort, åkerfräken, vanlig herdeväska, ettårig ängsgröe, körtelpil.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m ² + Chwastox Professional 750 SL 10,0 ml/100 m ²	Känsliga ogräs
	liten pelargon, stallgräs, åkerpensé, åkersenap, vanlig våtmark, purpurfärgad nässla, vit gåsfot, vanlig maskros, doftlös baldersbrå, kvist, persisk ärebrunn, åkerärebrunn, vanlig knottväv, åkervinda, vanlig krasse, mjuk brome, åkerfräken, vanlig ragwort, grov amarant, vanlig herdeväska, ettårig ängsgröe, körtelpil, småblommig gallört.

ANVÄNDNING AV MEDELET

Medlet är avsett att användas med handspruta (inklusive ryggspruta).

Uppmärksamhet:

Använd inte växtskyddsmedlet i offentliga parker och trädgårdar, idrotts- och rekreationsområden, skolor, förskolor, plantskolor och vårdinrättningar.

Äppelträd

Maximal dos för engångsbruk: 80,0 ml/100 m²

Rekommenderad dos för engångsbruk: 30,0–80,0 ml/100 m²

Appliceringsperiod: applicera produkten från vår till höst på gröna ogräs under deras intensiva tillväxt, med den dos som behövs för att förstöra befintliga ogräsarter.

För att förstöra fleråriga ogräs (t.ex. hästsvans) kan medlet användas i en blandning med herbiciden Chwastox Extra 300 SL eller Chwastox Professional 750 SL i följande doser:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m²

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Professional 750 SL 10,0 ml/100 m²

Rekommenderad vattenmängd: 2,0–3,0 l/100 m²

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1 (engångsbruk eller i en blandning).

KOMMENTARER:

1. Avlägsna mekaniskt alla rotskott från äppelträden före sprutning.
2. Spraya säkert, helst med sprutor med skydd eller nät, så att droppar av sprutvätskan inte hamnar på löv, skott och trädbark på grund av risken att skada växterna.

Trädgårdar, tomter, områden runt huset, längs byggnadens grund, staket och andra inhägnader, runt träd och rabatter, under häckar och buskar, mellan stenplattor och block, i gårdsområdet och på tillfartsvägar.

Maximal dos för engångsbruk: 75,0 ml/100 m²

Rekommenderad dos för engångsbruk: 50,0–75,0 ml/100 m²

Appliceringsperiod: Använd produkten från vår till höst, under varmt väder som gynnar ogrästillväxt.

UPPMÄRKSAMHET:

För att bekämpa kvikgräs, fläder, nässlor eller andra besvärliga ogräs, använd Agrosar 360 SL innan du anlägger en trädgård eller tomt.

Vid kraftig ogräsangrepp kan det vara nödvändigt att upprepa behandlingen.

Under behandlingen, försök att noggrant täcka de gröna delarna av ogräset, så att medlet inte rinner av från bladen.

För att undvika att sprayen drivs ner på angränsande grödor, använd skydd eller skärmar, helst gjorda av folie. Efter behandlingen, vik den använda folien så att ytan som innehåller spraydropparna är inåt. Undvik att gå på det besprutade området i flera timmar efter behandlingen på grund av risken för sprayöverföring på skor. Utför inget jordbearbetningsarbete på minst en vecka efter att sprayen har applicerats. Denna tid behövs för att herbiciden ska tränga in i ogräsets underjordiska delar och fullständigt förstöra dem. Efter denna tid kan jordbearbetning, sådd eller plantering påbörjas.

Tidigare odlingsbehandlingar kan minska medlets effektivitet.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 2.

Intervall mellan behandlingar: minst 21 dagar.

Rekommenderad vattenmängd: 2,0–3,0 l/100 m².

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL I GRÖDOR OCH APPLIKATIONER PÅ SMÅ OMRÅDEN

Användaren är ensam ansvarig för effektiviteten och fitotoxiciteten hos ett växtskyddsmedel som används i mindre grödor.

Krusbär, aronia, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, päron, persika, körsbär, aprikos, plommon, surkörsbär.

Maximal dos för engångsbruk: 80,0 ml/100 m²

Rekommenderad dos för engångsbruk: 30,0–80,0 ml/100 m²

Appliceringsperiod: applicera produkten från vår till höst på gröna ogräs under deras intensiva tillväxt, med den dos som krävs för att förstöra befintliga ogräsarter.

För bekämpning av fleråriga ogräs (t.ex. hästsvans) kan medlet användas i blandning med herbiciden Chwastox Extra 300 SL i en dos av:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m² + Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m²

Rekommenderad vattenmängd: 2,0–3,0 l/100 m².

Rekommenderad sprutning: medelstora droppar.

Maximalt antal behandlingar under växtsäsongen: 1.

KOMMENTARER:

1. Avlägsna mekaniskt alla rotskott från träd och buskar före sprutning.
fruktig.
2. Spraya säkert, helst med sprutor med skydd eller nät, så att droppar av sprutvätskan inte kommer på blad, skott och icke-vedartad bark på träd och buskar på grund av risken att skada växterna.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, KARENSTIDER OCH SÄRSKILDA VILLKOR ANVÄNDNINGAR

Period från sista appliceringen av medlet till skördagen (karensperioden):

Äpple, krusbär, aronia, svarta vinbär, röda vinbär, vita vinbär, päron, persika, körsbär, aprikos, plummon, surkörsbär – 7 dagar

1. Strategi för immunitetshantering

För att minimera risken för uppkomst och utveckling av ogräsresistens mot herbicider, i enlighet med god jordbrukspraxis:

- följ noggrant anvisningarna på växtskyddsmedlets etikett –
använd produkten i rekommenderad dos, vid rekommenderad tidpunkt för att säkerställa optimal ogräsbekämpning,
- anpassa valet av herbicid och beslutet att utföra behandlingen till det befintliga (eller potentiella) ogräsangreppet, med hänsyn till den dominerande arten och tröskelvärdena för skadlighet,
- använda rotation av herbicider (aktiva substanser) med olika verkningsmekanismer,
- använda en blandning av herbicider (aktiva substanser) med olika verkningsmekanismer,
- använda herbicider i rotation och/eller blandningar som påverkar flera ogräslivsprocesser (med olika verkningsmekanismer),
- anpassa odlingsförfarandena till de förhållanden som råder på fältet, särskilt till typen och intensiteten ogräs,
- använda olika metoder för ogräsbekämpning, inklusive växtföljd etc.
- använda certifierat utsäde,
- rena jordbruksmaskiner för att förhindra att ogräsförökningsmaterial överförs till andra positioner,
- informera tillståndshavaren om otillfredsställande ogräsbekämpning,
- för detaljerad information, vänligen kontakta din rådgivare eller innehavare tillstånd eller representant för tillståndshavaren.

2. Använd inte produkten:

- innan ogräset kommer upp,
- för sjuka, kläckta och skadade växter,
- under perioder med kraftig torka eller annalkande regn, – när nattetemperaturen är lägre än 5 °C,
- vid blåstigt väder, vilket kan få vätskan att driva över på närliggande växter kultiverad.

3. Tillåt inte följande när du använder produkten:

- avdrift av arbetsvätskan till angränsande odlingar,

– överlappning av arbetsvätskan vid korsningarna mellan behandlingsremsorna och vändtegen.

VÄXTSUCCESSION

Alla grödor kan odlas på ett fält där Agrosar 360 SL har applicerats. Odlingsbehandlingar kan påbörjas när ogräset visar symptom på medlets effekter (gulning och vissnande), men tidigast 5–7 dagar efter applicering.

Följ rekommendationerna för växtföljd för herbicider som används tillsammans med Agrosar 360 SL.

BEREDNING AV ANVÄNDBAR VÄTSKA

Förbered arbetsvätskan omedelbart före användning.

För att undvika oavsiktlig kontaminering med andra växtskyddsmedel, tvätta sprutan med en 10 % lösning av bikarbonat eller aktivt kol innan du bereder arbetslösningen. Bestäm sedan noggrant den erforderliga volymen och mängden produkt. Följ sprutans tillverkares anvisningar när du fyller sprutan. Om inga anvisningar finns tillgängliga, tillsätt den uppmätta mängden produkt i sprutbehållaren som är delvis fylld med vatten.

Skölj de tomma behållarna tre gånger med vatten och håll sköljmedlet i sprutans vätskebehållare. Fyll på med vatten till önskad mängd och blanda noggrant. Efter att ha hållt medlet i sprutans behållare, blanda vätskan mekaniskt.

Rör om vätskan i tanken med jämna mellanrum under sprutning.

Vid avbrott i sprutningen, blanda arbetsvätskan noggrant i sprutbehållaren innan arbetet återupptas.

Vid användning av medlet i blandningar med andra medel, följ noggrant rekommendationerna för beredning av arbetsvätskan för dessa medel.

HANTERING AV ANVÄNDBARA VÄTSKERESTER OCH RENGÖRING AV UTRUSTNING

Återstående vätska och vatten som används för att rengöra utrustningen bör vara:

– om möjligt, efter utspädning, använd på den yta där behandlingen utfördes, eller

– bortskaffas med hjälp av tekniska lösningar som säkerställer biologisk nedbrytning av de aktiva substanserna i växtskyddsmedel, eller

– kassera på annat sätt i enlighet med avfallsföreskrifterna.

Tvätta utrustningen noggrant efter arbetet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM ANVÄNDER AGENTEN, ANSTÄLLDA OCH ÅSKÅDARE

Innan produkten används måste alla berörda parter som kan komma att exponeras för sprutavdrift och som har begärt sådan information informeras.

Ät, drick eller rök inte medan du använder produkten.

Använd skyddshandskar (nitril) och skyddsglasögon.

Undvik att inandas spray.

Perioden från applicering av medlet till den dag då människor och djur får vistas i området där medlet har applicerats (förebyggande period):

Gå inte in i växten förrän vätskan har torkat helt på ytan.

MILJÖFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess förpackning. Tvätta inte utrustning nära ytvatten. Undvik vattenförorening genom dräneringsdiken från gårdar och vägar.

Undvik oavsiktliga utsläpp i miljön.

Applicera produkten på ett område på upp till 500 m².

Det rekommenderas att använda produkten utanför perioder med biaktivitet.

Låt inte sprutvätskan driva utanför appliceringsområdet. Spraya endast med munstycken för medelstora eller grova droppar.

FÖRHÅLL FÖR FÖRVARING OCH SÄKER AVFALLSHANTERING AV SKYDDSMEDELET VÄXTER OCH FÖRPACKNINGAR

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara växtskyddsmedlet:

• i originalförpackning, • på ett sätt

som förhindrar kontakt med livsmedel, drycker eller foder, miljökontaminering och åtkomst för tredje part,

• vid en temperatur på 0 °C - 30 °C.

Skydda mot solljus och fukt

Det är förbjudet att använda tomma förpackningar av växtskyddsmedel för andra ändamål.

All oanvänd produkt ska överföras till en enhet som är auktoriserad för insamling av farligt avfall.

Det rekommenderas att du returnerar tomma behållare till en återförsäljare av växtskyddsmedel eller hanterar dem som kommunalt avfall. Om du har några frågor om hur du ska göra dig av med behållarna, kontakta din återförsäljare av växtskyddsmedel.

FÖRSTA HJÄLPEN

Motgift: inget, behandla symptomatiskt.

Om du behöver rådfråga en läkare, visa förpackningen eller etiketten.

Vid hudkontakt: Skölj med rikligt med vatten.

Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkarhjälp.

Giltighetstid - 2 år.

Produktionsdatum -

Nettoinnehåll -

Batchnummer -