

Titolare del permesso:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Repubblica Federale di Germania,

Ente che introduce il prodotto fitosanitario nel territorio della Repubblica di Polonia: Bayer Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Varsavia, Repubblica di Polonia, tel.: 22 572 35 00, www.agro.bayer.com.pl

Soggetto responsabile del confezionamento finale e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario: (...)

ROUNDUP 360 PLUS

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali.

Contenuto di sostanza attiva:

glifosato, un composto del gruppo degli acidi amminofosforici sotto forma di sale di potassio – **360 g/l (28,77%)**.

Autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R - 71/2014 del 14/05/2014

rinnovato con decisione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. R - 32/2022o del 15 novembre 2022.

modificato da ultimo dalla decisione del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale n. R - 1553/2024d del 10/12/2024



Attenzione

H319 – Provoca grave irritazione oculare.

H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

P264 – Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 – Indossare guanti protettivi, proteggere gli occhi, proteggere il viso.

P305+P351+P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337+P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE E DELLE CONDIZIONI D'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO

ERBICIDA non selettivo ad azione sistemica, applicato per via fogliare, sotto forma di concentrato per la preparazione di una soluzione acquosa (SL).

Secondo la classificazione HRAC, il principio attivo glifosato è classificato nel gruppo 9 (in precedenza gruppo G).

AZIONE SULLE ERBACCE

L'agente contiene un principio attivo che inibisce l'azione dell'enzima – 5-enolpiruvato-shikimato-3-fosfato (EPSPS), un enzima chiave nel percorso metabolico dell'acido shikimico, associato alla biosintesi degli amminoacidi aromatici, che di conseguenza porta all'inibizione della sintesi delle proteine necessarie per la crescita e lo sviluppo delle piante.

L'agente viene assorbito attraverso le parti verdi della pianta (foglie, germogli verdi e corteccia non corrosa), quindi migra attraverso la pianta e raggiunge le sue parti sotterranee (radici, stoloni, ecc.). I primi sintomi dell'azione dell'agente (ingiallimento e avvizzimento) diventano visibili 7-10 giorni dopo il trattamento.

La morte completa della pianta avviene dopo circa 3 settimane. L'azione dell'agente patogeno è accelerata da temperature elevate, umidità e forte luce solare.

erbacce sensibili	Dose mezzo	
	1,25 l/ha	erba oca bianca, erba bianca inodore, fasci di fiori. –
	1.875 l/ha	viola del pensiero, erba stella comune, piede d'oca bianco, papavero dei campi, biancospino inodore, ginestra dei cereali, gramigna, sferzante, convolvolo, fasci di fiori. –
	2,5 l/ha	viola del pensiero, erba stella comune, piede d'oca bianco, papavero dei campi, biancospino inodore, ginestra dei cereali, gramigna, sferzante, convolvolo, camomilla dei campi, cereali spontanei, fasci di campi, gallinella a piccoli fiori.
	3,75 l/ha	artemisia comune, viola dei campi, stellaria comune, piede d'oca bianco, millefoglio comune, papavero dei campi, biancospino inodore, ginestra dei cereali, gramigna, sferzante, convolvolo, camomilla dei campi, cereali spontanei, fasci di campi, gallinella a fiori piccoli. –
	4,0 l/ha	artemisia comune, viola dei campi, stellaria comune, piede d'oca bianco, millefoglio comune, papavero dei campi, biancospino inodore, ginestra dei cereali, gramigna, sferzante, convolvolo, camomilla dei campi, cereali spontanei, fasci di campi, gallinella a fiori piccoli. –
	6,0 l/ha	artemisia comune, viola dei campi, stellaria comune, piede d'oca bianco, millefoglio comune, papavero dei campi, biancospino inodore, ginestra dei cereali, gramigna, ganja, convolvolo, campo camomilla, cereali spontanei, fasci di campo, vecchia comune, gallinella a fiore piccolo. –
Erbacce resistenti		equiseto

RICHIESTA DELL'AGENTE

Roundup 360 Plus è progettato per l'uso con irroratrici semoventi o montate su trattore e con irroratrici manuali.

Nota:

Non utilizzare il prodotto fitosanitario in parchi e giardini pubblici, aree sportive e ricreative, scuole, asili nido, vivai e strutture sanitarie.

La dose dell'agente deve essere adattata alla sensibilità della specie di erbaccia dominante in una determinata coltura.

Campi coltivati prima della semina e della messa a dimora della coltura

Dose massima per una singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 2,0 – 4,0 l/ha.

La dose dell'agente e il momento della sua applicazione devono essere adattati alla specie di erba infestante presente.

Periodo di applicazione: utilizzare il prodotto durante il periodo di intensa crescita delle erbe infestanti.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Dopo la semina o la piantagione e prima che il raccolto emerga

a) Mais

Dose massima per singola applicazione: 2,5 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 1,25 – 2,5 l/ha.

Data di applicazione: applicare il prodotto dopo la semina del mais sulle erbacce emergenti, ma non oltre 3 giorni prima dell'emergenza del mais (BBCH 00-09).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Nota:

la dose inferiore consigliata è per il controllo delle piantine infestanti emergenti.

Non utilizzare su terreni molto leggeri e sabbiosi.

Seminare i semi di mais a una profondità non inferiore a 2 cm.

b) Patata

Dose massima per singola applicazione: 2,5 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 1,25 – 2,5 l/ha.

Data di applicazione: applicare il prodotto dopo aver piantato le patate e dopo aver coperto le erbacce emergenti, ma non oltre 3 giorni prima dell'emergenza delle patate (BBCH 00-09).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Attenzione:

Dopo il trattamento non effettuare alcuna lavorazione meccanica.

Utilizzare il prodotto su terreni medio-compatti.

a) Carote, prezzemolo, cipolla, porro (dalla semina)

Dose massima per singola applicazione: 1,8 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 1,25 – 1,8 l/ha.

Data di applicazione: applicare il prodotto dopo l'emergenza delle infestanti, ma non oltre 2-3 giorni prima dell'emergenza della coltura (BBCH 00-09).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Attenzione:

1. Non utilizzare su terreni molto leggeri e sabbiosi.
2. Seminare i semi di carota, cipolla e porro a una profondità non inferiore a 2 cm.

In primavera, prima dell'emergenza della coltura, si ricorre alla cosiddetta tecnologia semplificata, ovvero in autunno si seminano piante pacciamanti (mulch), in primavera si semina direttamente la coltura e poi si effettua un trattamento per controllare le erbe infestanti emergenti.

Barbabietola

da zucchero Dose massima per singola applicazione: 2,5 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 1,25 – 2,5 l/ha.

Data di applicazione: applicare il prodotto dopo l'emergenza delle erbe infestanti, ma non oltre 3 giorni prima dell'emergenza della barbabietola da zucchero (BBCH 00-09).

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Attenzione:

1. La dose più bassa consigliata è per il controllo delle piantine infestanti emergenti.
2. Non utilizzare su terreni molto leggeri e sabbiosi.
3. Seminare i semi di barbabietola da zucchero a una profondità non inferiore a 2 cm.

Dopo la raccolta delle colture, prima di iniziare la coltivazione post-raccolta per controllare la gramigna e altre erbacce (stoppie)

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 2,5 – 4,0 l/ha.

Periodo di applicazione: Applicare il prodotto da metà agosto a fine autunno su infestanti verdi a crescita vigorosa. Al momento dell'irrorazione, la gramigna dovrebbe raggiungere un'altezza di 10-25 cm e aver sviluppato almeno 3-4 foglie completamente sviluppate. Le infestanti monocotiledoni annuali dovrebbero essere alte almeno 5 cm e le infestanti dicotiledoni dovrebbero aver sviluppato due foglie vere completamente sviluppate.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Attenzione:

Dopo la raccolta del raccolto e prima dell'applicazione del prodotto, non effettuare alcuna operazione di coltivazione.

Aree non utilizzate per scopi agricoli (piazze di magazzini, aree industriali, bordi stradali, strade, percorsi pedonali, marciapiedi, marciapiedi, nonché altre strutture permanenti con superfici dure o semipermeabili in cui si verifica una crescita indesiderata di erbacce ed è necessaria la loro completa eliminazione, binari del tram).

Dose massima per singola applicazione: 6,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,75 – 6,0 l/ha.

Quando si utilizzano spruzzatori a spalla, utilizzare il liquido di lavoro in una dose di 0,2 litri di agente ogni 10 litri di acqua.

La dose dell'agente e il momento della sua applicazione devono essere adattati alla specie di erba infestante presente.

Periodo di applicazione: utilizzare il prodotto durante il periodo di crescita intensiva delle piante verdi durante tutto il periodo vegetativo.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Binari ferroviari

Dose raccomandata/massima per singola applicazione: 5,0 l/ha.

Data di

applicazione: Utilizzare il prodotto durante il periodo di crescita intensiva delle piante verdi durante tutto il periodo vegetativo.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Canali di irrigazione, canali di drenaggio (senza acqua al momento dell'applicazione dell'agente)

Dose massima per singola applicazione: 5,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 5,0 l/ha.

Periodo di applicazione: utilizzare il prodotto durante il periodo di crescita intensiva delle piante verdi durante tutto il periodo vegetativo.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Eliminazione dei terreni incolti e incolti.

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,8 – 4,0 l/ha.

Utilizzare la dose più elevata tra quelle raccomandate nel periodo di trattamento autunnale.

Data di applicazione: utilizzare il prodotto:

In primavera – durante il periodo di intensa crescita delle erbacce fino alla fase di fioritura
O

In autunno, se è necessario effettuare lavori di coltivazione e semina autunnali, per la coltivazione intensiva di erbacce al di fuori del periodo di fioritura.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Prati e pascoli: per ripristinare praterie permanenti.

Dose massima per singola applicazione: 4,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 – 4,0 l/ha.

Data di

applicazione: Utilizzare solo per il ripristino di prati permanenti.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 3.

La dose totale dell'agente utilizzata durante la stagione non può superare i 10 l/ha

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Melo

Dose massima per singola applicazione: 5,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 2,0 – 5,0 l/ha.

La dose totale dell'agente utilizzata durante la stagione non può superare gli 8 l/ha

Data di

applicazione: Utilizzare il prodotto durante il periodo di crescita intensiva delle piante verdi durante tutto il periodo vegetativo.

Utilizzare il prodotto in strisce diserbanti o tra le file.

Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchio, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa degli alberi, con il rischio di danneggiare le piante.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

APPLICAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE COLTURE E APPLICAZIONI SU PICCOLE AREE

L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'efficacia e della fitotossicità di un prodotto fitosanitario utilizzato in colture minori.

Pera, prugna, ciliegia, amarena, vite, ribes nero, ribes rosso, uva spina, mirtillo rosso, nocciolo comune, noce

Dose massima per singola applicazione: 5,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 2,0 – 5,0 l/ha.

Maximum total dose per ha per season: 8.0 l/ha

Data di

applicazione: Utilizzare il prodotto durante il periodo di crescita intensiva delle piante verdi durante tutto il periodo vegetativo.

Utilizzare il prodotto in strisce diserbanti o tra le file.

Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchio, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa degli alberi, con il rischio di danneggiare le piante.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 2.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Piante da vivaio forestale

Dose massima per singola applicazione: 5,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 – 5,0 l/ha.

Data di

applicazione: Utilizzare il prodotto durante il periodo di crescita intensiva delle piante verdi durante tutto il periodo vegetativo.

Applicare l'agente in strisce dove crescono le piantine o le piantine di piante o negli spazi interfilari.

Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchio, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa degli alberi, con il rischio di danneggiare le piante.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

Rimboschimento e rigenerazione forestale

Dose massima per singola applicazione: 3,0 l/ha.

Dose raccomandata per uso singolo: 3,0 l/ha.

Data di

applicazione: Utilizzare il prodotto durante il periodo di crescita intensiva delle piante verdi durante tutto il periodo vegetativo.

Applicare l'agente nelle strisce dove crescono le piante o negli spazi tra le file.

Spruzzare in modo sicuro, preferibilmente utilizzando spruzzatori con coperchio, in modo che le gocce del liquido spruzzato non finiscano sulle foglie, sui germogli e sulla corteccia non legnosa degli alberi, con il rischio di danneggiare le piante.

Numero massimo di trattamenti durante la stagione di crescita: 1.

Quantità d'acqua consigliata: 200-300 l/ha.

Nebulizzazione consigliata: gocce medie.

PRECAUZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI UTILIZZO

1. Strategia di gestione dell'immunità Per

ridurre al minimo il rischio di comparsa e sviluppo di resistenza delle erbe infestanti agli erbicidi, in conformità con le buone pratiche agricole: – seguire le istruzioni sull'etichetta del

prodotto fitosanitario – utilizzare il prodotto alla dose raccomandata, al momento
raccomandato per garantire un controllo ottimale delle erbe infestanti,

- adattare la scelta dell'erbicida e la decisione di effettuare il trattamento all'infestazione di erbe infestanti esistente (o potenziale), tenendo conto delle specie dominanti e delle soglie di nocività,
- utilizzare la rotazione di erbicidi (sostanze attive) con diversi meccanismi d'azione, – utilizzare una miscela di erbicidi (sostanze attive) con diversi meccanismi d'azione,
- utilizzare erbicidi in rotazione e/o miscele che influiscono su più processi vitali delle infestanti (con differenti meccanismi d'azione), –
- adattare le procedure di coltivazione alle condizioni prevalenti nel campo, in particolare al tipo e all'intensità delle erbe infestanti, – utilizzare diversi metodi di controllo delle erbe infestanti, – pulire i macchinari agricoli per impedire il trasferimento del materiale di propagazione delle erbe infestanti in altre posizioni, –
- informare il titolare del permesso in caso di controllo insoddisfacente delle erbacce,
- Per ulteriori informazioni, contattare il proprio consulente, il titolare del permesso o il rappresentante del titolare del permesso

2. Non utilizzare il prodotto: _____

- prima che emergano le erbacce, – per piante bagnate, – prima della pioggia prevista (le precipitazioni che si verificano entro 1 ora dalla spruzzatura possono ridurre l'efficacia del trattamento), – in condizioni di vento che possono causare la dispersione del liquido.

3. Durante l'uso del prodotto, evitare: la deriva del _____

- liquido di lavoro sulle colture adiacenti, la sovrapposizione del liquido di lavoro
- alle giunzioni delle strisce di trattamento e delle capezzagne.

PREPARAZIONE DEL LIQUIDO UTILIZZABILE

Preparare il liquido di lavoro immediatamente prima dell'uso.

Prima di iniziare a preparare il liquido di lavoro, determinare esattamente la quantità necessaria.

Versare la quantità misurata di agente nel serbatoio dell'irroratore parzialmente riempito con acqua (con l'agitatore acceso), quindi rabboccare con acqua fino alla quantità necessaria.

Dopo aver versato l'agente nel serbatoio dell'irroratrice non dotato di miscelatore idraulico, miscelare meccanicamente il liquido nel serbatoio.

Sciagquare i contenitori vuoti tre volte con acqua e versare il liquido di risciacquo nel serbatoio con il liquido utilizzabile.

In caso di interruzioni della spruzzatura, miscelare accuratamente il liquido di lavoro nel serbatoio dell'irroratrice prima di riprendere il lavoro.

Pressione di esercizio consigliata: 2-3 atmosfere.

Durante il funzionamento, quando il liquido di lavoro è nel serbatoio dell'irroratrice, assicurarsi che il serbatoio sia completamente sfiatato.

GESTIONE DEI RESIDUI LIQUIDI UTILIZZABILI

Il liquido e l'acqua rimanenti utilizzati per la pulizia dell'attrezzatura devono

essere: – se possibile, dopo la diluizione, utilizzati sulla superficie su cui è stato effettuato il trattamento, oppure

- smaltiti utilizzando soluzioni tecniche che garantiscano la degradazione biologica delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, oppure –
- smaltiti in altro modo conformemente alle normative sui rifiuti.

Dopo il lavoro, lavare accuratamente l'attrezzatura e sciacquarla con acqua almeno tre volte.

Quando si lava l'attrezzatura utilizzando detergenti destinati a questo scopo, i risciacqui risultanti devono essere gestiti secondo le istruzioni allegate al detergente.

PERIODI DI ATTESA E SUCCESSO DELL'IMPIANTO

Periodo compreso tra l'ultima applicazione dell'agente e il giorno della raccolta della coltura (periodo di sospensione):

Mela, pera, prugna, ciliegia, amarena, vite, ribes nero, ribes rosso, uva spina, mirtillo rosso, nocciolo comune, noce

– 28 giorni

Vite – 14 giorni

Periodo compreso tra l'ultima applicazione del prodotto alle piante destinate all'alimentazione animale e il giorno in cui gli animali possono essere nutriti con tali piante (periodo di sospensione dell'alimentazione):

Pascoli – 21 giorni

SUCCESSIONE DELLE PIANTE

Tutte le colture possono essere coltivate in un campo in cui è stato applicato Roundup 360 Plus.

La coltivazione, la semina o la piantagione possono iniziare dopo 2 giorni se si controllano le erbacce annuali e dopo 5 giorni se si controllano le erbacce perenni.

Il periodo che intercorre dall'ultima applicazione del prodotto al giorno in cui è possibile seminare o piantare le seguenti colture: 2 - 5 giorni.

PRECAUZIONI PER LE PERSONE CHE UTILIZZANO L'AGENTE, I DIPENDENTI E SPETTATORI

Prima di utilizzare il prodotto, tutte le parti interessate che potrebbero essere esposte alla deriva dello spray e che hanno richiesto tali informazioni devono essere informate

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

Indossare guanti protettivi, protezioni per gli occhi o il viso e indumenti protettivi per proteggersi dagli effetti dei prodotti fitosanitari durante la preparazione della soluzione di lavoro e durante il trattamento.

Il periodo che intercorre tra l'applicazione dell'agente e il giorno in cui persone e animali possono entrare nell'area in cui l'agente è stato applicato (periodo di prevenzione):

Non entrare finché il liquido non si è completamente asciugato sulla superficie della pianta.

nel caso di pascoli – non introdurre bestiame per 21 giorni

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non contaminare l'acqua con il prodotto fitosanitario o il suo imballaggio. Non lavare le attrezzature in prossimità di acque superficiali. Evitare l'inquinamento delle acque attraverso i canali di scolo di aziende agricole e strade.

Evitare il rilascio involontario nell'ambiente.

Durante la fioritura delle colture e delle erbe infestanti, si consiglia di utilizzare il prodotto al di fuori dei periodi di attività delle api.

Per proteggere gli organismi acquatici è necessario delimitare una zona di protezione larga 1 m dai bacini idrici e dai corsi d'acqua.

Per proteggere le piante e gli artropodi che non sono bersaglio dell'agente, è necessario designare una zona di protezione della seguente larghezza dalle aree non agricole:

5 metri o 5

1 m con l'uso simultaneo di tecniche che riducono la deriva del liquido di lavoro durante il trattamento del 75%.

CONDIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO SICURO DELL'AGENTE PROTETTIVO IMPIANTI E IMBALLAGGI E PRIMO SOCCORSO

CONDIZIONI PER LA CONSERVAZIONE E LO SMALTIMENTO SICURO DELL'AGENTE PROTETTIVO IMPIANTI E IMBALLAGGI

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto fitosanitario: 5 nella

confezione originale, 5 in modo da impedire il

contatto con alimenti, bevande o mangimi, la contaminazione ambientale e l'accesso da parte di

terzi, 5 ad una

temperatura di 0°C - 30°C.

È vietato utilizzare gli imballaggi vuoti dei prodotti fitosanitari per altri scopi.

Ogni prodotto non utilizzato deve essere consegnato a un ente autorizzato alla raccolta di rifiuti pericolosi.

Restituire al venditore i contenitori vuoti contenenti prodotti fitosanitari pericolosi.

PRIMO SOCCORSO

Antidoto: nessuno, trattamento sintomatico.

Se hai bisogno di consultare un medico, mostra la confezione o l'etichetta.

In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

Periodo di validità: 2 anni

Data di produzione -

Contenuto netto -

Numero di lotto -