

Vergunninghouder:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Bondsrepubliek Duitsland,

Entiteit die het gewasbeschermingsmiddel in de Republiek Polen introduceert: Bayer Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 158, 02-326
Warschau, Republiek Polen, tel.: +22 572 35 00, www.agro.bayer.com.pl

Entiteit verantwoordelijk voor de uiteindelijke verpakking en etikettering van het gewasbeschermingsmiddel: (...)

ROUNDUP 360 PLUS

Het product is bedoeld voor professioneel gebruik.

Gehalte aan werkzame stof:

glyfosaat, een verbinding uit de groep aminofosforzuren in de vorm van kaliumzout – **360 g/l (28,77%)**.

Toestemming van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R - 71/2014 van 14/05/2014
verlengd bij besluit nr. R - 32/2022o van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van 15 november 2022.

laatst gewijzigd bij besluit nr. R - 1553/2024d van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van 10/12/2024



Aandacht

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 – Giftig voor waterorganismen met langdurige gevolgen.

EUH 401 – Om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden, dient u de gebruiksaanwijzing te volgen.

P264 – Was uw handen grondig na gebruik.

P280 – Draag beschermende handschoenen, oogbescherming en gezichtsbescherming.

P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.

P337+P313 – Als de oogirritatie aanhoudt: Raadpleeg een arts.

P391 – Verzamel gemorste vloeistof.

BESCHRIJVING VAN DE WERKING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PLANTAARDIG BESCHERMINGSMIDDEL

Niet-selectief herbicide met systemische werking, dat via het blad wordt toegediend, in de vorm van een concentraat voor het bereiden van een waterige oplossing (SL).

Volgens de HRAC-classificatie is de werkzame stof glyfosaat ingedeeld in groep 9 (voorheen groep G).

ACTIE TEGEN ONKRUID

Het middel bevat een werkzame stof die de werking van het enzym remt – 5-enolpyruvaat-shikimaat-3-fosfaat (EPSPS), een sleutelenzym in de shikiminezure metabolische route, geassocieerd met de biosynthese van aromatische aminozuren, wat vervolgens leidt tot de remming van de synthese van eiwitten die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van planten.

Het middel wordt opgenomen via de groene delen van de plant (bladeren, groene scheuten en niet-aangetaste bast), verspreidt zich vervolgens door de plant en bereikt de ondergrondse delen (wortels, uitlopers, enz.). De eerste symptomen van de werking van het middel (vergeling en verwelking) worden 7-10 dagen na de behandeling zichtbaar.

Na ongeveer 3 weken sterft de plant volledig af. Hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en fel zonlicht versnellen de werking van het middel.

Gevoelige onkruiden	Dosis midden	
	1,25 l/ha	Witte ganzenvoet, geurloze kamille, veldbundels. –
	1.875 l/ha	veldviooltje, gewone muurpeper, witte ganzenvoet, klapproos, geurloze kamille, graanbezem, kweekgras, kleeftkruid, winde, veldbundels. –
	2,5 l/ha	veldviooltje, gewone muurpeper, witte ganzenvoet, klapproos, geurloze kamille, graanbezem, kweekgras, kleeftkruid, winde, veldkamille, opschietende graanplanten, veldbundels, kleinbloemige galplant.
	3,75 l/ha	gewone bijvoet, veldviooltje, gewone muurpeper, witte ganzenvoet, gewone duizendblad, veldklapproos, geurloze kamille, graanbezem, kweekgras, kleeftkruid, winde, veldkamille, opschietende graanplanten, veldbundels, kleinbloemige galplant. –
	4,0 l/ha	gewone bijvoet, veldviooltje, gewone muurpeper, witte ganzenvoet, gewone duizendblad, veldklapproos, geurloze kamille, graanbezem, kweekgras, kleeftkruid, winde, veldkamille, opschietende graanplanten, veldbundels, kleinbloemige galplant. –
	6,0 l/ha	gewone bijvoet, veldviooltje, gewone muurpeper, witte ganzenvoet, gewone duizendblad, veldklapproos, geurloze kamille, graanbezem, kweekgras, kleeftkruid, winde, veldkamille, opschietende granen, veldbundels, vogelwikke, kleinbloemige galkruid. –
Resistente onkruiden		paardestaart

AANVRAAG VAN DE AGENT

Roundup 360 Plus is ontworpen voor gebruik met zelfrijdende of op een tractor gemonteerde veldspuiten en handspuiten.

Opmerking:

Gebruik het gewasbeschermingsmiddel niet in openbare parken en tuinen, sport- en recreatiegebieden, scholen, kleuterscholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

De dosering van het middel moet worden aangepast aan de gevoeligheid van de dominante onkruidsoort in het betreffende gewas.

Akkerland vóór het zaaien en planten van het gewas. Maximale dosering per

toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,0 – 4,0 l/ha.

De dosering van het middel en het tijdstip van toepassing moeten worden aangepast aan de aanwezige onkruidsoorten.

Toepassingsperiode: gebruik het product tijdens de periode van intense onkruidgroei.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Na het zaaien of planten en voordat het gewas opkomt.

a) Maïs

Maximale dosering per toepassing: 2,5 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 1,25 – 2,5 l/ha.

Toepassingsdatum: breng het product aan na het zaaien van maïs op opkomend onkruid, maar niet later dan 3 dagen vóór de opkomst van de maïs (BBCH 00-09).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Let op:

de lagere aanbevolen dosis is bedoeld voor het bestrijden van opkomende onkruidzaailingen.

Niet gebruiken op zeer lichte en zanderige grondsoorten.

Zaai maïszaadjes op een diepte van minimaal 2 cm.

b) Aardappel

Maximale dosering per toepassing: 2,5 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 1,25 – 2,5 l/ha.

Toepassingsdatum: breng het product aan na het planten van de aardappelen en nadat het opkomende onkruid is bedekt, maar niet later dan 3 dagen vóór de opkomst van de aardappelen (BBCH 00-09).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Let op: Voer

na de behandeling geen mechanische grondbewerking uit.

Gebruik het product op middelmatig compacte grond.

a) Wortelen, peterselie, ui, prei (van het zaaien)

Maximale dosering per toepassing: 1,8 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 1,25 – 1,8 l/ha.

Toepassingsdatum: breng het product aan na opkomst van het onkruid, maar niet later dan 2-3 dagen vóór opkomst van het gewas (BBCH 00-09).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Let op: 1. 2.

Niet gebruiken op zeer lichte, zanderige grond.

Zaai wortel-, ui- en preizaden op een diepte van minimaal 2 cm.

In het voorjaar, vóór de opkomst van het gewas, wordt de zogenaamde vereenvoudigde technologie gebruikt, dat wil zeggen: in de herfst worden mulchplanten gezaaid, in het voorjaar wordt het gewas direct gezaaid en vervolgens wordt een behandeling uitgevoerd om opkomend onkruid te bestrijden.

Suikerbiet.

Maximale dosering per toepassing: 2,5 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 1,25 – 2,5 l/ha.

Toepassingsdatum: breng het product aan na opkomst van het onkruid, maar niet later dan 3 dagen vóór opkomst van de suikerbieten (BBCH 00-09).

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Let op: 1.

De lagere aanbevolen dosis is bedoeld voor het bestrijden van opkomende onkruidzaailingen.

2. Niet gebruiken op zeer lichte en zanderige grondsoorten.

3. Zaai suikerbietzaden op een diepte van minimaal 2 cm.

Na de oogst, voordat men begint met de nabewerking om kweekgras en ander onkruid te bestrijden (stoppels).

Maximale dosering per toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,5 – 4,0 l/ha.

Toepassingsperiode: Breng het product van half augustus tot laat in de herfst aan op groene, krachtig groeiende onkruiden.

Op het moment van bespuiten moet kweekgras een hoogte van 10-25 cm hebben bereikt en ten minste 3-4 volledig ontwikkelde bladeren hebben. Eenjarige eenzaadlobbige onkruiden moeten ten minste 5 cm hoog zijn en tweezaadlobbige onkruiden moeten twee volledig ontwikkelde echte bladeren hebben.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoefveelheid: middelgrote druppels.

Aandacht:

Voer na de oogst en vóór het aanbrengen van het product geen grondbewerkingswerkzaamheden uit.

Gebieden die niet voor agrarische doeleinden worden gebruikt (opslagterreinen, industrieterreinen, bermen, wegen, voetpaden, trottoirs, bestratingen, evenals andere permanente constructies met harde of halfdoorlatende oppervlakken waar ongewenste onkruidgroei voorkomt en die volledig moet worden verwijderd, tramrails).

Maximale dosering per toepassing: 6,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,75 – 6,0 l/ha.

Bij gebruik van rugsproeiers dient u de werkzame vloeistof te doseren in een verhouding van 0,2 liter middel per 10 liter water.

De dosering van het middel en het tijdstip van toepassing moeten worden aangepast aan de aanwezige onkruidsoorten.

Toepassingsperiode: gebruik het product tijdens de periode van intensieve groei van groene planten gedurende de gehele vegetatieperiode.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoefveelheid: middelgrote druppels.

Spoorwegen

Aanbevolen/maximale dosis per toepassing: 5,0 l/ha.

Toepassingsdatum:

Gebruik het product tijdens de periode van intensieve groei van groene planten gedurende de gehele vegetatieperiode.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoefveelheid: middelgrote druppels.

Irrigatiekanalen, afwateringskanalen (zonder water op het moment van toepassing van het middel)

Maximale dosering per toepassing: 5,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 5,0 l/ha.

Toepassingsperiode: gebruik het product tijdens de periode van intensieve groei van groene planten gedurende de gehele vegetatieperiode.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoefveelheid: middelgrote druppels.

Het elimineren van braakliggende en onbewerkte grond.

Maximale dosering per toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,8 – 4,0 l/ha.

Gebruik de hoogste van de aanbevolen doseringen tijdens de behandelingsperiode in de herfst.

Toepassingsdatum: gebruik het product:

In het voorjaar – tijdens de periode van intense onkruidgroei tot aan de bloeiperiode of

In de herfst – als het nodig is om in de herfst grondbewerking en zaaiwerkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld om onkruid intensief te bestrijden buiten de bloeiperiode.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Weiden en graslanden – voor het herstel van permanente graslanden.

Maximale dosering per toepassing: 4,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 – 4,0 l/ha.

Toepassingsdatum:

Uitsluitend gebruiken bij het herstellen van permanent grasland.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 3.

De totale dosis van het middel die gedurende het seizoen wordt gebruikt, mag niet meer dan 10 l/ha bedragen.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

Appelboom

Maximale dosering per toepassing: 5,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,0 – 5,0 l/ha.

De totale dosis van het middel die gedurende het seizoen wordt gebruikt, mag niet meer dan 8 l/ha bedragen.

Toepassingsdatum:

Gebruik het product tijdens de periode van intensieve groei van groene planten gedurende de gehele vegetatieperiode.

Gebruik het product in stroken met herbicide of tussen de rijen.

Spuit voorzichtig, bij voorkeur met sproeiers met een deksel, zodat er geen druppels van de sproeivloeistof op bladeren, scheuten en niet-houtachtige boomschors terecht komen, omdat dit de planten kan beschadigen.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeveelheid: middelgrote druppels.

TOEPASSING VAN PLANTAARDIGE BESCHERMINGSMIDDELEN IN GEWASSEN EN TOEPASSINGEN VOOR KLEINE OPPERVLAGKEN

De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de effectiviteit en fytotoxiciteit van een gewasbeschermingsmiddel dat wordt gebruikt in minder gangbare gewassen.

Peer, pruim, kers, zure kers, wijnstok, zwarte bes, rode bes, kruisbes, hoogstam bosbes, gewone hazelaar, walnoot

Maximale dosering per toepassing: 5,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 2,0 – 5,0 l/ha.

Maximale totale dosering per ha per seizoen: 8,0 l/ha

Toepassingsdatum:

Gebruik het product tijdens de periode van intensieve groei van groene planten gedurende de gehele vegetatieperiode.

Gebruik het product in stroken met herbicide of tussen de rijen.

Spuit voorzichtig, bij voorkeur met sproeiers met een deksel, zodat er geen druppels van de sproeivloeistof op bladeren, scheuten en niet-houtachtige boomschors terechtkomen, omdat dit de planten kan beschadigen.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 2.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeverheid: middelgrote druppels.

Planten uit boskwekerijen

Maximale dosering per toepassing: 5,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 – 5,0 l/ha.

Toepassingsdatum:

Gebruik het product tijdens de periode van intensieve groei van groene planten gedurende de gehele vegetatieperiode.

Breng het middel aan in stroken waar zaailingen of plantjes groeien, of in de tussenruimtes tussen de rijen.

Spuit voorzichtig, bij voorkeur met sproeiers met een deksel, zodat er geen druppels van de sproeivloeistof op bladeren, scheuten en niet-houtachtige boomschors terechtkomen, omdat dit de planten kan beschadigen.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeverheid: middelgrote druppels.

Herbebossing en bosregeneratie

Maximale dosering per toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor eenmalig gebruik: 3,0 l/ha.

Toepassingsdatum:

Gebruik het product tijdens de periode van intensieve groei van groene planten gedurende de gehele vegetatieperiode.

Breng het middel aan in stroken waar planten groeien of in de tussenruimtes tussen de rijen.

Spuit voorzichtig, bij voorkeur met sproeiers met een deksel, zodat er geen druppels van de sproeivloeistof op bladeren, scheuten en niet-houtachtige boomschors terechtkomen, omdat dit de planten kan beschadigen.

Maximaal aantal behandelingen gedurende het groeiseizoen: 1.

Aanbevolen waterhoeveelheid: 200-300 l/ha.

Aanbevolen sproeihoeverheid: middelgrote druppels.

VOORZORGSMATREGELEN EN SPECIALE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Strategie voor immunitetsbeheer Om het risico op het ontstaan en de ontwikkeling van onkruidresistentie tegen herbiciden te minimaliseren, dient u, in overeenstemming met de goede landbouwpraktijken: – de aanwijzingen op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel op te volgen – het product in de aanbevolen dosering en op het aanbevolen tijdstip te gebruiken voor optimale onkruidbestrijding.

– pas de keuze van het herbicide en de beslissing om de behandeling uit te voeren aan de bestaande (of potentiële) onkruidbesmetting aan, rekening houdend met de dominante soorten en schadelijkheidsdrempels.

– gebruik een rotatiesysteem voor herbiciden (actieve stoffen) met verschillende werkingsmechanismen, – gebruik een mengsel van herbiciden (actieve stoffen) met verschillende werkingsmechanismen acties,

– gebruik herbiciden in rotatie en/of mengsels die verschillende levensprocessen van onkruid beïnvloeden (met verschillende werkingsmechanismen), – pas

de teeltprocedures aan de omstandigheden op het veld aan, met name aan het type en de intensiteit van het onkruid, – gebruik verschillende

onkruidbestrijdingsmethoden, – reinig

landbouwmachines om de overdracht van plantmateriaal te voorkomen.

Verplaats onkruid naar andere

locaties; informeer de vergunninghouder over de onvoldoende onkruidbestrijding.

– Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur, vergunninghouder of vertegenwoordiger van de vergunninghouder.

2. Gebruik het product niet:

– voordat onkruid opkomt, – bij

natte planten, – vóór

verwachte regen (neerslag binnen 1 uur na het spuiten kan de effectiviteit van de behandeling

verminderen), – bij winderige omstandigheden waardoor de vloeistof kan

wegwaaien.

3. Bij gebruik van het product dient u het volgende te

– voorkomen: dat de werkzame vloeistof op aangrenzende gewassen terechtkomt, en

– dat de werkzame vloeistof zich ophoopt op de overgangen tussen behandelingsstroken en kopakkers.

BEREIDING VAN DE BRUIKBARE VLOEISTOF

Bereid de werkzame vloeistof direct voor gebruik.

Bepaal voordat u begint met het voorbereiden van de werkzame vloeistof precies hoeveel u nodig hebt.

Giet de afgemeten hoeveelheid van het middel in de sproeitank die gedeeltelijk met water is gevuld (met de roerder aan) en vul vervolgens aan met water tot het vereiste niveau.

Nadat u het middel in de sproeitank van een spuitmachine zonder hydraulische menger hebt gegoten, moet u de vloeistof in de tank mechanisch mengen.

Spoel de lege containers driemaal met water en giet het spoelwater in de tank met de bruikbare vloeistof.

Bij onderbrekingen in het spuitproces dient u de werkzame vloeistof in de spuittank grondig te mengen alvorens het werk te hervatten.

Aanbevolen werkdruk: 2-3 atmosfeer.

Zorg er tijdens het gebruik, wanneer de werkvloeistof zich in de sproeitank bevindt, voor dat de tank volledig ontluicht is.

VERWERKING VAN BRUIKBARE VLOEIBARE RESIDUEN

De resterende vloeistof en het water die gebruikt zijn om de apparatuur te reinigen,

dienen – indien mogelijk – na verdunning te worden gebruikt op het oppervlak waarop de behandeling is uitgevoerd, of

– afgevoerd met behulp van technische oplossingen die de biologische afbraak van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen garanderen,

of – op een andere manier afgevoerd in overeenstemming met de afvalregelgeving.

Na gebruik dient u de apparatuur grondig te reinigen en minstens drie keer met water af te spoelen.

Bij het reinigen van de apparatuur met daarvoor bestemde reinigingsmiddelen, dient het spoelwater te worden behandeld volgens de instructies die bij het reinigingsmiddel zijn meegeleverd.

WACHTTIJDEN EN PLANTENSUCCES

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst (wachttijd):

Appel, peer, pruim, kers, zure kers, wijnstok, zwarte bes, rode bes, kruisbes, hoogstam bosbes, gewone hazelaar,

walnoot – 28 dagen

Wijnrank – 14 dagen

De periode vanaf de laatste toepassing van het product op planten bestemd voor veevoer tot de dag waarop dieren met deze planten gevoerd mogen worden (wachttijd voor het voeren):

Weiden – 21 dagen

PLANTENOPVOLGING

Alle gewassen kunnen worden verbouwd op een veld waar Roundup 360 Plus is toegepast.

Het bewerken van de grond, zaaien of planten kan na 2 dagen beginnen bij de bestrijding van eenjarige onkruiden en na 5 dagen bij de bestrijding van meerjarige onkruiden.

De periode tussen de laatste toepassing van het product en de dag waarop de volgende gewassen gezaaid of geplant kunnen worden, bedraagt 2 tot 5 dagen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR PERSONEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET MIDDEL, WERKNEMERS EN OMSTANDERS

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk worden blootgesteld aan de sproeivevel en die om dergelijke informatie hebben verzocht, worden geïnformeerd.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Draag beschermende handschoenen, oog- of gezichtsbescherming en beschermende kleding ter bescherming tegen de effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij het bereiden van de werkzame oplossing en tijdens de behandeling.

De periode vanaf het moment van toepassing van het middel tot de dag waarop mensen en dieren het gebied waar het middel is toegepast weer mogen betreden (preventieperiode):

Betreed het oppervlak van de plant pas als de vloeistof volledig is opgedroogd.

In het geval van weilanden: breng gedurende 21 dagen geen vee in het gebied.

MILIEUVOORZORGEN

Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of de verpakking ervan. Reinig apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Voorkom waterverontreiniging door afwateringssloten van landbouwbedrijven en wegen.

Voorkom onbedoelde lozing in het milieu.

Tijdens de bloei van gewassen en onkruid wordt aangeraden het product buiten de periodes van bijenactiviteit te gebruiken.

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone van 1 meter breed rondom reservoirs en waterlopen aan te wijzen.

Om planten en geleedpotigen te beschermen die niet het doelwit van het bestrijdingsmiddel zijn, is het noodzakelijk een beschermingszone met de volgende afmetingen af te bakenen ten opzichte van niet-agrarische gebieden:

5 meter of

1 m met gelijktijdig gebruik van technieken die de drift van de werkzame vloeistof verminderen tijdens de behandeling met 75%.

VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMINGSMIDDEL PLANTEN, VERPAKKING EN EHBO

VOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG EN VEILIGE VERWIJDERING VAN HET BESCHERMINGSMIDDEL PLANTEN EN VERPAKKINGEN

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bewaar het gewasbeschermingsmiddel: 5 in de originele verpakking, 5 op een manier die contact met levensmiddelen, dranken of diervoeder, milieuverontreiniging en toegang door dieren voorkomt. derden, bij een temperatuur van 0°C - 30°C.

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Alle ongebruikte producten moeten worden overgedragen aan een instantie die bevoegd is om gevaarlijk afval in te zamelen.

Lever lege verpakkingen met gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in bij de verkoper.

E.H.B.O

Tegengif: geen, behandel de symptomen.

Als u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Raadpleeg onmiddellijk een arts indien dit product is ingeslikt en toon de verpakking of het etiket.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.

Als de oogirritatie aanhoudt: raadpleeg een arts.

Geldigheidsperiode: 2 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -